



SERIE
NUEVAS
MIRADAS



NES

Biología

1



Débora Demarchi (Coordinadores)

Maria Cecilia Coral de Dios ➔ Mariana Rogolino ➔ Silvana Rosa



NES

Biología

1

Gerente general
Claudio De Simony

Directora editorial
Alina Baruj

Coordinación autoral
Débora Demarchi

Autoras
Cecilia de Dios
Mariana Rogolino
Silvina Rosa

Editores
Gabriela Avagnina
Alexis Tellchea

Correctores
Diego Kochmann
Laura Palomino

Jefa de arte
Eugenio Escamez
 Coordinadora de arte y
 diseño de maqueta
Lorena Morales
 Diseño de tapa
Héctor Horacio Chivih Steinig

Ilustraciones
Nelson Castro
Federico Combi
Fabián Slongo
Daniel Zilberberg
Carla Mariel Barcic Zupan

Jefa de prensa y fotografía

Andrea Balbi
 Selección de imágenes
Leandro Ramírez

Fotografías
Archivo Clarín
Roberto Cinti
Martín Katz
Pablo Picca

Asistente editorial
Carolina Pizze

Producción editorial
Ricardo de las Barreras
Gustavo Melgarejo

Marketing editorial
Mariela Inés Gomez

© Tinta fresca ediciones S. A.

Corrientes 534, 1^{er} piso
(C1043AAS)
Ciudad de Buenos Aires

Hecho el depósito que establece
la ley 11.723.
Libro de edición argentina.
Impreso en la Argentina.
Printed in Argentina.

ISBN 978-987-576-804-8

Coral de Dios, María Cecilia
 Biología 1 : NES / María Cecilia
 Coral de Dios ; Mariana Andrea
 Rogolino ; Silvana Marina Rosa. - 1a
 edición para el alumno - Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires : Tinta
 Fresca, 2016.
132 p. ; 28 x 21 cm.

ISBN 978-987-576-804-8

1. Biología para Niños. I. Rogolino,
 Mariana Andrea II. Rosa, Silvana
 Marina. III. Título
 CDD 570

Este libro se terminó de imprimir
en el mes de noviembre de 2015
en Arte Gráfica NesDan S.R.L.,
Virrey Cevallos 1975, CABA.
La tirada consta de 2.000
ejemplares.



Este logo alerta al lector sobre
la amenaza que fotocopiar libros
representa para el futuro de la
escritura. En efecto, la fotocopia de
libros provoca una disminución tan
importante de la venta de libros que
atasta contra la posibilidad de los
autores de crear nuevas obras y de las
editoriales de publicarlas.

La reproducción total o parcial de
este libro en cualquier forma que sea,
idéntica o modificada, y por cualquier
medio o procedimiento, sea mecánico,
electrónico, informático o magnético
y sobre cualquier tipo de soporte,
no autorizada por los editores, viola
derechos reservados, es ilegal y
constituye un delito.

En español, el género masculino
en singular y plural incluye ambos
géneros. Esta forma propia de la
lengua oculta la mención de lo
femenino. Pero, como el uso explícito
de ambos géneros dificulta la lectura,
los responsables de esta publicación
emplean el masculino inclusor en todos
los casos.

► Índice

Parte I: Los seres vivos, unidad y diversidad

Capítulo 1

Características de los seres vivos	7
Niveles de organización de la materia y los seres vivos	8
Niveles de organización de la materia.....	8
Niveles de organización de los seres vivos	8
Niveles de organización superiores	9
Propiedades de la vida	10
Composición química particular.....	10
Organización interna	11
Estructura común.....	12
Unidad estructural	12
Unidad funcional	12
Relación con el medio interno y el medio externo.....	14
Estabilidad del medio interno	15
Ciclo vital	16
El conjunto de seres vivos evoluciona	17
Orden en la diversidad	18
Las clasificaciones antiguas	18
La clasificación filogenética	19
La biodiversidad	20
¿Por qué es importante cuidar y preservar la biodiversidad de nuestro planeta?	20
Ciencia y arte: La música, el humor y la clasificación de las ovejas	21
Actividades finales.....	22

Capítulo 2

Origen de la vida	23
Diferencia entre lo vivo y lo no vivo	24
Estructura de los seres vivos	26
Las biomoléculas.....	28
Divulgación de la ciencia: Virus: entre la vida y la muerte	29
Explicaciones sobre el origen de la vida	30
El creacionismo y la teoría de la generación espontánea	30
Refutación de la teoría de la generación espontánea	31
Las explicaciones más aceptadas en la actualidad	32
El diseño experimental	33
Esto decía: Louis Pasteur	34
Las condiciones prebióticas	35
La Tierra primitiva	35
La teoría quimiosintética	36
Origen de las primeras moléculas orgánicas	36
Formación de los protobiontes o coacervados	37
Experiencia de Miller y Urey	39
Origen de las primeras células	40
Evolución de las formas de nutrición de los primeros seres vivos	41
De las primeras células a los organismos complejos	42
Ciencia y arte: La amenaza de Andrómeda	43
Actividades finales	44

Parte II: La diversidad de los seres vivos

Capítulo 3

Origen de la biodiversidad	45
La diversidad biológica	46
El fijismo de las especies	47
Las primeras ideas transformistas de las especies	48
Las contribuciones del conde de Buffon, Hutton y Lyell	48
La teoría de Lamarck	49
El gran adversario de Lamarck: George Cuvier	50
El viaje de Darwin a bordo del <i>Beagle</i>	51
Esto decía: Charles Darwin	52
La teoría del ancestro común	53
Observaciones que se explican por la teoría del ancestro común	54
Existencia de los fósiles	54
Distribución geográfica de las especies actuales	54
Homologías anatómicas entre organismos	55
Semejanzas embriológicas entre organismos	55
La clasificación linneana	56
Predicciones de la teoría del ancestro común	57
Divulgación de la ciencia: Dinosaurios con plumas	58
Los árboles filogenéticos	59
Teoría de la selección natural	60
Conceptos clave para comprender la selección natural	62
Las características ventajosas deben ser heredables	63
Esto decía: Alfred Wallace	64
Las adaptaciones como consecuencia de la selección natural	65

Las adaptaciones según Lamarck y

según Darwin	66
--------------------	----

¿Qué es la evolución?	66
-----------------------------	----

Ciencia y arte: Evolución tecnológica:

<i>Yo, robot</i>	67
------------------------	----

Actividades finales	68
----------------------------------	-----------

Capítulo 4

Clasificación de los seres vivos

69

Las clasificaciones

70

El desafío de clasificar la biodiversidad	71
---	----

La clasificación de los seres vivos

72

La taxonomía	72
--------------------	----

La nomenclatura binomial	73
--------------------------------	----

Las clasificaciones después de Darwin

74

Árboles para representar la filogenia	74
---	----

Los principales grupos en que se clasifica la biodiversidad

76

Esto decía: Carl Woese y los tres dominios	77
--	----

Adquisiciones evolutivas de las eubacterias

78

Adquisiciones evolutivas de las arqueobacterias

78

Adquisiciones evolutivas de las eucariotas

79

Adquisiciones evolutivas de las plantas

80

Adquisiciones evolutivas de los hongos

82

Grandes adquisiciones evolutivas de los animales

83

Los phyla de animales más simples: Porífera, Cnidaria, Platyhelminthes y Nematoda	84
---	----

Los phyla de animales con sus cuerpos divididos en segmentos: Mollusca, Annelida y Arthropoda	85
---	----

Los phyla de animales deuterostomados	85
---	----



Conseruación de la biodiversidad	86
¿Por qué la biodiversidad se está reduciendo?	86
Ciencia y arte: Wilkins, Borges y las clasificaciones	87
Actividades finales.....	88

Parte III: Panorama general de la reproducción

Capítulo 5	
Reproducción	89
Importancia de la reproducción	90
La continuidad de las especies y sus ciclos de vida.....	91
Tipos de reproducción	91
La reproducción asexual	92
La reproducción asexual en procariotas	92
La reproducción asexual en microorganismos eucariotas.....	92
La reproducción asexual en animales	92
La reproducción asexual en plantas.....	93
La esporulación	93
La reproducción sexual.....	94
El origen de las diferencias entre progenitores y descendientes	94
Diferencias en las gametas y en la fecundación	95
Diferencias en el desarrollo de la cigota	95
El significado evolutivo de las diferencias en la reproducción sexual	95
La reproducción sexual en las plantas con flor	96
La flor: el órgano reproductivo de las plantas angiospermas	96
La polinización.....	97
La formación de las semillas y los frutos.....	99
Dispersión y germinación de la semilla	100

Divulgación de la ciencia: La falta de abejas afectará la producción de alimentos a nivel mundial	101
Reproducción sexual en animales	102
Encuentro de gametas: fecundación interna y externa.....	102
Cortejo y apareamiento	102
Dimorfismo sexual y selección sexual	103
Protección y nutrición del embrión: huevos y placenta	103
Desarrollos directo e indirecto	104
Cuidado de las crías	104
Divulgación de la ciencia: Por primera vez nacen tres llamas de embriones refrigerados	106
Las ventajas adaptativas de cada tipo de reproducción	107
Estrategias reproductivas r y K	108
Ciencia y arte: Orquídeas pintadas en óleo y en láminas giclée	109
Actividades finales.....	110

Capítulo 6	
Reproducción humana	111
Pubertad y adolescencia	112
Sistema reproductor femenino	113
Sistema reproductor masculino	114
La higiene y la prevención de enfermedades	115
Esto decía: George Nicholas Papanicolaou	116
Ciclo menstrual	117
Fecundación	118
Embarazo	119
Divulgación de la ciencia: Sumate a la campaña para prevenir el embarazo adolescente “Hablar es prevenir”	120
Tecnología reproductiva	121




Divulgación de la ciencia: “El éxito de un trasplante de útero es que la mujer consiga dar a luz”	122
Ciencia y arte: Escultura en la prehistoria. Venus paleolíticas	123
Elegir ser padres	124
Métodos permanentes	124
Métodos temporales	124
Enfermedades de transmisión sexual.....	126
Gonorrea o blenorragia	126
Sífilis	126
Papiloma humano.....	126
Divulgación de la ciencia: La sífilis viajó de América a Europa en los barcos de Colón.....	127
VIH/sida	128
Salud reproductiva en los adolescentes.....	129
Actividades finales.....	130
Índice alfabético	131



Características de los seres vivos

1



Contenidos

- > Características de los seres vivos
- > Niveles de organización de la materia y de los seres vivos
- > Diversidad en los seres vivos
- > Clasificación de los seres vivos
- > Importancia de la conservación de la biodiversidad

Si observan un paisaje, seguramente podrán identificar plantas, animales, rocas, suelo, cielo, nubes, montañas... ¿Cómo se dan cuenta de cuáles de esos elementos del paisaje tienen vida? ¿Qué hace a los seres vivos diferentes de aquello que no tiene vida?

A su vez, en el mismo paisaje podrán notar que hay plantas de distinta forma y tamaño, y lo mismo sucede con los animales. ¿En qué se parecen y se diferencian las plantas entre sí? ¿Y los animales entre sí? ¿Por qué son seres vivos pero forman distintos grupos? ¿Qué otros seres vivos conocen además de las plantas y de los animales? ¿Cómo podemos agrupar a los seres vivos?

EN ESTE CAPÍTULO...

Se analiza cómo la materia inerte y los seres vivos están formados por los mismos componentes. Además, se describen las características que tienen en común todos los seres vivos, así como la gran variedad de seres vivos que existen, y cómo se los clasifica para facilitar su estudio.

También se fundamenta la importancia de conservar y proteger la biodiversidad a través del análisis y estudio de los organismos.

Contenido digital adicional

www.tintaf.com.ar/


NBIO1C1



Niveles de organización de la materia y los seres vivos



Molécula de ADN.



La membrana plasmática está formada por moléculas de fosfolípidos dispuestos en una doble capa y moléculas de proteínas intercaladas.



Los paramecios son organismos unicelulares.

Los ejemplos

Identificar los ejemplos que proporciona el texto y buscar otros diferentes los ayudará a comprobar si entendieron la explicación.

Toda la materia que compone la Tierra se reúne y organiza formando distintas estructuras, algunas más sencillas y pequeñas, y otras más grandes y complejas. Por ejemplo, los átomos se reúnen y forman moléculas: dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno se combinan químicamente para producir una molécula de agua.

Para facilitar su estudio y comprensión, estas estructuras se dividen en niveles que se van complejizando: cada nivel de organización incluye a los niveles inferiores.

Cada nivel posee características o propiedades específicas propias que no existen en el nivel anterior: las propiedades emergentes.

Las **propiedades emergentes** son propias de cada nivel y surgen de la interacción de sus elementos, no aparecen cuando los elementos individuales actúan solos. Por ejemplo, la célula tiene propiedades diferentes de las de las biomoléculas que la componen, y la más importante es la vida. La célula es la mínima unidad de vida, ninguna de sus macromoléculas componentes (lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, hidratos de carbono) posee la propiedad de estar viva.

Niveles de organización de la materia

► **Átomos**: son partículas muy pequeñas que constituyen las moléculas orgánicas e inorgánicas.

► **Moléculas**: son los componentes de todos los tipos de células. Todas las moléculas orgánicas contienen átomos de carbono. La polaridad química, es decir, la separación de cargas eléctricas dentro de una misma molécula, es una propiedad emergente propia de este nivel.

► **Macromoléculas**: son moléculas de gran tamaño, constituidas por moléculas diferentes o semejantes. Las macromoléculas fundamentales de los seres vivos son los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos y los hidratos de carbono. Un ejemplo de propiedad emergente en este nivel es la capacidad del ADN de transmitir la información genética de una generación a la siguiente. Esta propiedad no la poseen las moléculas constituyentes de este ácido nucleico.

► **Complejos de macromoléculas**: las macromoléculas se asocian formando estructuras complejas, como las membranas celular y nuclear, y las organelas de las células eucariotas. Un ejemplo de propiedad emergente en este nivel lo constituye la permeabilidad selectiva de las membranas celular y nuclear.

Niveles de organización de los seres vivos

► **Célula**: es la unidad estructural y funcional de todos los seres vivos. Los organismos unicelulares están compuestos por una sola célula, mientras que los pluricelulares lo están por miles y hasta millones.

En las células procariotas el material hereditario está en el citoplasma y, en las células eucariotas, el material genético está en el núcleo. La propiedad más importante que emerge de este nivel es la vida.

► **Tejidos:** están formados por células individuales que trabajan de manera coordinada. Los tejidos que constituyen el cuerpo de un animal son cuatro: epitelial, conectivo, nervioso y muscular. La sangre es un ejemplo de tejido conectivo que contiene células y transporta gases, nutrientes y sustancias de desecho. Un ejemplo de propiedad emergente en este nivel lo constituye la **contractilidad*** del tejido muscular.

► **Órganos:** los órganos están formados por tejidos de distintos tipos que trabajan de manera coordinada. La piel es el órgano más extenso del cuerpo de un animal vertebrado. Las hojas, los tallos, las raíces y las flores son los órganos que constituyen el cuerpo de las plantas. Un ejemplo de propiedad emergente en este nivel lo constituye la función de bomba del corazón de los vertebrados, lo que permite la llegada de la sangre a todo el cuerpo. Esta función no puede ser llevada a cabo en forma individual por los tejidos muscular, nervioso y conectivo que componen este órgano.

► **Sistema de órganos:** formado por un conjunto de órganos que trabajan de manera coordinada, integrada y controlada. En la mayoría de los animales, las funciones de integración y control la realizan el sistema nervioso y el endocrino. Un ejemplo de propiedad emergente en este nivel lo constituye la función del sistema digestivo de procesamiento y transformación de los alimentos en sustancias más sencillas. Esta función no puede ser llevada a cabo en forma completa solo por el estómago, el intestino o la boca.


► **Individuo:** existen individuos unicelulares y pluricelulares. Por ejemplo, las bacterias son individuos unicelulares. Los individuos pluricelulares pueden alcanzar el nivel de organización de tejidos, órganos o sistemas de órganos.

Niveles de organización superiores

Existen otros niveles de organización superiores, objeto de estudio de la Ecología: población, comunidad, ecosistema y ecósfera. Los ecólogos analizan las interacciones entre los individuos de **poblaciones** y **comunidades**, así como las interacciones entre comunidades y el ambiente incluidas en el nivel **ecosistema**. El conjunto de ecosistemas y sus interacciones se denomina **ecósfera**.

Actividades


1. ¿Cuál es la propiedad emergente más importante propia del nivel célula? ¿Qué límite determina esta propiedad entre los niveles inferiores y superiores de organización?
2. ¿Qué nivel de organización alcanzan los seres humanos?
3. ¿Qué sistemas de órganos poseen los seres humanos y cuál es la función de cada uno?
4. Busquen y escriban ejemplos de organismos pluricelulares que alcancen el nivel tejidos y órganos, pero que no alcancen el nivel sistema de órganos. Propongan una propiedad emergente propia de cada organismo de cada nivel investigado en este punto.



Tejido nervioso.

Glosario

contractilidad: capacidad de contraerse.



Corazón.



Las plantas vasculares son individuos pluricelulares que alcanzan el nivel de órganos.

Propiedades de la vida

Los seres vivos, desde los más pequeños hasta los de mayor tamaño, poseen características comunes que nos permiten diferenciarlos de la materia inerte.

- ▶ Presentan una composición química particular.
- ▶ Poseen una organización interna.
- ▶ Se relacionan con el medio externo.
- ▶ Son capaces de mantener la estabilidad de su medio interno.
- ▶ Poseen un ciclo vital.
- ▶ El conjunto de seres vivos evoluciona.


Composición química particular

Todos los seres vivos y lo que no está vivo, es decir la materia inerte, como los minerales, los glaciares, las nubes y las montañas, están formados por materia. La **materia** es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. Tanto la materia inerte como los seres vivos están constituidos por los mismos átomos*: carbono (C), hidrógeno (H), oxígeno (O), nitrógeno (N), fósforo (P), azufre (S), sodio (Na), potasio (K), hierro (Fe), cloro (Cl), magnesio (Mg), calcio (Ca), iodo (I).


Además, tanto en la materia inanimada como en la materia animada, encontramos agua y algunos de los átomos mencionados en forma de iones* inorgánicos: Na^+ , K^+ , Cl^- , Ca^{2+} , etcétera.

Pero en los seres vivos, los átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre se unen químicamente y forman moléculas orgánicas. Las **moléculas orgánicas** son aquellas que contienen carbono en su composición como átomo principal, y forman enlaces covalentes carbono-carbono y carbono-hidrógeno. Por el contrario, las **moléculas inorgánicas**, como el agua, no tienen carbono como componente principal ni enlaces carbono-hidrógeno, y están formadas por la mayoría de los elementos químicos conocidos.

A su vez, en los seres vivos, las moléculas orgánicas se reúnen formando moléculas más complejas: las **moléculas biológicas** o **biomoléculas**.



Estructura química del almidón (biomolécula).



Estructura química del colesterol (biomolécula).

Glosario

átomo: partícula más pequeña en la que puede ser dividido un elemento sin que pierda sus propiedades químicas.

ión: partícula con carga eléctrica adquirida por pérdida o ganancia de uno o más electrones.


Organización interna

Todos los seres vivos poseen una estructura interna formada por unidades muy pequeñas, invisibles a simple vista: las células. Las **células** están constituidas por los mismos átomos que la materia inerte. Estos forman las biomoléculas presentes en todos los organismos. Cuando las biomoléculas se organizan, pueden originar una célula.

Las células son tridimensionales y presentan gran diversidad de tamaños y formas según el organismo al que pertenezcan, aunque presentan ciertos elementos en común: todas poseen membrana plasmática, citoplasma y material genético.

El tamaño de las células se mide en **micrones** (μm); las de los organismos procariotas son más pequeñas que las células eucariotas. Las células procariotas tienen el material genético suelto en el citoplasma mientras que en las células eucariotas, el material genético está en el núcleo, rodeado de una membrana.

Los seres vivos más simples están formados por una sola célula, es decir, son **unicelulares**. Por su parte, los más complejos están formados por cientos, miles o millones de células organizadas, es decir, son **pluricelulares**.



Las células eucariotas pueden tener hasta 10 veces el tamaño de una célula procariota.

Los seres vivos unicelulares

Los seres vivos unicelulares están formados por una única célula individual, encargada de llevar a cabo todas las funciones: nutrición, reproducción, etc. Pueden ser procariotas, como las bacterias, o eucariotas, como las levaduras.

Los seres vivos pluricelulares

Los seres vivos pluricelulares están constituidos por muchas células. Los más sencillos forman **colonias**. Todas las células de una colonia son semejantes y, por lo tanto, están poco especializadas. Entonces, a pesar de vivir agrupadas, rodeadas por una envoltura o no, son capaces de vivir en forma independiente unas de otras.


Los organismos pluricelulares más complejos poseen células especializadas en alguna función, que se agrupan y forman estructuras complejas como tejidos, órganos y sistemas de órganos.

Actividades

1. ¿Qué tienen en común, en cuanto a la composición química, la materia inerte y los seres vivos? Expliquen.
2. ¿Qué semejanzas y diferencias tienen las células de los seres vivos?



La bacteria *Lactobacillus bulgaricus* (procariota) es responsable del proceso de fermentación de la leche para la producción de yogur.



La levadura *Saccharomyces cerevisiae* (eucariota) es un hongo unicelular empleado en la elaboración de pan, pizza, cerveza y vino.




Las esponjas son animales acuáticos pluricelulares que presentan una organización colonial.

Estructura común

Los seres vivos del planeta, desde los más pequeños, como las bacterias, hasta los mamíferos de mayor tamaño, como las ballenas, poseen diversas formas. Sin embargo, comparten una misma organización y ciertas funciones.

Todos los seres vivos están formados por células. En 1665, el científico inglés Robert Hooke observó cortes de células de corcho al microscopio y las describió como pequeñas cavidades similares a las celdas de un panal de abejas; por eso las llamó “células”, del latín *cellula*, “celdita”.

Posteriormente, en 1855, el anatomista alemán Rudolf Virchow concluyó que todas las células provienen de otra célula preexistente.



Células de corcho dibujadas por Robert Hooke en su libro *Micrografía*, en 1665.

Unidad estructural

- ▶ Las células son las unidades estructurales que constituyen el cuerpo de los seres vivos.
- ▶ Las células presentan diferentes tamaños: las células bacterianas son más pequeñas que las células de un mamífero.
- ▶ Las células presentan diferentes formas: por ejemplo, las neuronas tienen numerosas prolongaciones que semejan una estrella. Las células de elodea son muy regulares, similares a rectángulos. Las células musculares son fibras alargadas.
- ▶ Las células presentan una estructura interna diferente: las células procariotas no tienen núcleo, el material genético (ADN) se encuentra en el citoplasma, mientras que en las células eucariotas el material genético está contenido en el núcleo. Además, estas últimas tienen organelas que cumplen diferentes funciones (digestión, respiración, síntesis de moléculas, eliminación de desechos celulares).

Unidad funcional

Todos los seres vivos llevan a cabo las siguientes funciones:


- ▶ **Nutrición:** intercambian materia y energía con el ambiente. Obtienen de él la materia necesaria para mantener su estructura y la energía para realizar sus funciones vitales. A su vez, eliminan al ambiente sus desechos y energía en forma de calor.
- ▶ **Reproducción:** dejan descendencia, lo que asegura la continuidad de la especie a lo largo del tiempo.
- ▶ **Relación:** perciben los estímulos del ambiente, de otros seres vivos y de sus propios cambios internos; los procesan y generan respuestas ante ellos.



Neuronas.



Células de elodea.



Células musculares.

Diversidad de funciones: nutrición

La nutrición incluye varios procesos: ingestión y digestión de nutrientes, su transformación en materiales propios de la célula, la extracción de energía de ellos y la eliminación de sus desechos. La principal fuente de energía es la glucosa.

Según cómo obtienen la glucosa, los organismos se clasifican en:

► **Organismos de nutrición autótrofa:** producen sus propios nutrientes a través del proceso de **fotosíntesis**. Para realizar la fotosíntesis, estos organismos utilizan dióxido de carbono, agua y energía de la luz solar captada por la clorofila. Como resultado, producen glucosa y liberan oxígeno a la atmósfera. El oxígeno es utilizado por todos los organismos aeróbicos*.

Glosario

aeróbico: que necesita oxígeno para subsistir.



Cianobacteria procariota
Nostoc sp.



Alga unicelular eucariota
Chlorella.



Planta de amancay.

Organismos autótrofos.

► **Organismos de nutrición heterótrofa:** obtienen la glucosa, las sales minerales y las vitaminas alimentándose de otros seres vivos. Según el estado de la materia de la que se alimentan, se clasifican en:

► **Absorbotróficos:** se alimentan de materia orgánica vegetal o animal en descomposición. Por ejemplo, los hongos y las bacterias.


► **Parásitos:** se alimentan a expensas de organismos vivos. Pueden encontrarse dentro del organismo que parasitan o fuera de él. Por ejemplo, los piojos y la lombriz solitaria (*Taenia saginata*).

► **Holotróficos:** se alimentan de materia orgánica en estado sólido. Es el caso de la mayoría de los animales. Los herbívoros comen plantas o partes de ellas (semillas, frutos, hojas, tallos), los carnívoros comen otros animales (vivos o muertos), y los omnívoros comen vegetales y otros animales.

Actividades

1. ¿Qué características y funciones comparten todos los seres vivos y en cuáles se diferencian?

2. Realicen un cuadro comparativo sobre los tipos de nutrición. Busquen ejemplos de organismos autótrofos y heterótrofos.



El hongo *Chaetomium globosum* ataca y se alimenta de la madera en contacto con el suelo.



Los piojos, parásitos de los humanos y otros animales, se alimentan de restos de piel, sangre y secreciones sebáceas.



Los buitres son aves carroñeras, es decir, se alimentan de animales muertos.

Relación con el medio interno y el medio externo

Los seres vivos tienen la capacidad de percibir cambios que se producen en el medio externo, es decir, en el ambiente que habitan, así como aquellos que ocurren dentro de sí mismos, y responder a ellos. Esta característica se denomina **sensibilidad**, y todo cambio que genera una respuesta constituye un **estímulo**. Por lo tanto, los organismos no viven aislados sino que se vinculan con su entorno externo y su medio interno.

Relación con el medio externo

En los vertebrados, los cambios en el medio externo se perciben a través de los sentidos.

- ▶ Con el sentido de la vista perciben cambios en la intensidad de luz, colores y formas.
- ▶ Con el sentido del olfato perciben distintos aromas y su intensidad.
- ▶ Con el sentido del gusto perciben distintos sabores.
- ▶ Con el sentido del oído perciben los sonidos y sus cualidades: intensidad, tono y timbre.
- ▶ Con el sentido del tacto perciben las características de la superficie de los objetos, la temperatura y el viento.

Por ejemplo, si una persona se encuentra dentro de una habitación sin luz y sale al exterior en un día soleado, entornará o cerrará los ojos hasta acostumbrarse a la luz solar. En este caso, el estímulo es el paso de la oscuridad a la luz, y la respuesta es entornar o cerrar los ojos. Si el mismo individuo prende la radio y la música empieza a sonar muy fuerte, reaccionará bajando el volumen. Aquí, el estímulo es el pasaje del silencio al ruido, y la respuesta es la acción de bajar el volumen de la radio.

Los animales invertebrados, las plantas y las bacterias también son capaces de percibir estímulos y responder ante ellos. Por ejemplo, las lombrices, si bien no tienen ojos, son sensibles a la luz y se alejan de ella. También perciben la humedad y se dirigen en dirección a ella. Los girasoles tienen células sensibles a la luz solar que permiten que las flores se dirijan hacia donde está el Sol. Las bacterias tienen en su membrana elementos que funcionan como si fueran sensores que detectan las sustancias químicas en el medio.

Relación con el medio interno


Los cambios en el medio interno se perciben a través del **sistema nervioso** y, en los organismos más sencillos, por medio de **células nerviosas**. En la respuesta a los cambios internos están involucrados tanto el sistema nervioso como el sistema endocrino. Un organismo es capaz de sentir su propia temperatura corporal, la cantidad de agua y sales en sus fluidos, y la presión sanguínea, entre otros aspectos, y de responder ante un cambio en estos parámetros. Por ejemplo, cuando una persona tiene calor, transpira. En este caso, el estímulo interno es el aumento de la temperatura corporal y la respuesta es transpirar.

Títulos y subtítulos

Para destacar la organización de un texto, pueden subrayar con un color el título que expresa el tema central y, con otro, los subtítulos que anuncian los subtemas o aspectos que se tratan.

Actividades

1. Observen la ilustración y respondan las preguntas.



- ¿Qué está haciendo el caballo? Con esa acción, ¿está respondiendo a un estímulo interno o uno externo?
- ¿Qué estímulos percibe el caballo de su hábitat? ¿Son internos o externos? ¿Con qué sentidos percibe cada uno?
- ¿Qué posibles respuestas podría llevar a cabo para responder ante los estímulos del punto anterior?

Estabilidad del medio interno

La **homeostasis** es la capacidad que tienen los seres vivos de mantener el interior de su organismo en equilibrio, a pesar de las variaciones que se producen en el medio exterior.

Los parámetros corporales que deben estar en equilibrio para que un organismo se mantenga con vida son:

- ▶ la temperatura corporal,
- ▶ el volumen de agua y el pH de sus fluidos, como la sangre, la saliva, la orina y los jugos gástricos,
- ▶ la presión sanguínea,
- ▶ la frecuencia cardíaca,
- ▶ la concentración de glucosa y electrolitos (sodio, potasio) en sangre,
- ▶ la eliminación en forma eficiente de los desechos metabólicos transportados por la sangre.

En los vertebrados, el sistema nervioso y el sistema endocrino son los responsables de mantener la homeostasis del organismo y, para ello, trabajan en forma coordinada.

Si tomamos la temperatura corporal de un mamífero, como un cerdo o un caballo, durante un día caluroso, y lo hacemos nuevamente durante un día frío, veremos que su temperatura corporal se mantiene constante, alrededor de los 36,5 °C, a pesar de la variación de la temperatura ambiental. En este caso, el parámetro a mantener en valores estables es la temperatura corporal y el cambio en el medio externo es la variación en la temperatura ambiental.

Si la temperatura corporal aumenta momentáneamente en un día caluroso, esta información llega al cerebro, el cual manda una “orden” a las glándulas sudoríparas de la piel (pertenecientes al sistema endocrino) para que liberen agua y sales en forma de sudor. El sudor enfriá la superficie del cuerpo y la temperatura corporal se acerca de nuevo a 36,5 °C.

Cuando la temperatura corporal desciende, el cerebro manda la orden a los músculos para que se contraigan, lo que origina escalofríos y hace que tiritemos; ambos mecanismos son generadores de calor.

Los animales más sencillos, que no poseen sistemas de órganos, las plantas y las bacterias también deben mantener su equilibrio interno. Por ejemplo, los paramecios tienen un tipo de vacuola especial, llamada vacuola pulsátil o contráctil, que expulsa el exceso de agua de su interior y así mantienen su cantidad dentro de los límites estables.



Actividades

1. Se coloca agua a 40 °C dentro de un recipiente abierto. La temperatura ambiental es de 10 °C. Luego de media hora se toma la temperatura del agua con un termómetro y se comprueba que bajó a 10 °C.

Temperatura ambiente 10 °C



- a. Si una persona sale a la calle durante un día en el que la temperatura ambiental es 10 °C, ¿su cuerpo se enfriará como el agua del recipiente? ¿Por qué? ¿Qué capacidad posee una persona que no tiene el agua del vaso?
- b. ¿Cómo regula ese individuo su temperatura corporal para mantenerla constante a pesar del frío?

El sudor y los escalofríos son dos mecanismos que tiene el cuerpo humano para mantener estable la temperatura corporal.

Ciclo vital



Durante el período de desarrollo, las plantas adquieren nuevos órganos: las flores, que en su interior llevan las estructuras reproductoras. En cambio, en los animales no se originan órganos nuevos, estos solo maduran.


Los seres vivos pasan por diferentes etapas a lo largo de su vida: nacen, crecen, se desarrollan, se reproducen y mueren. Al conjunto de todas estas etapas se lo denomina **ciclo vital**.

Durante la etapa de crecimiento, los organismos aumentan su tamaño: las células se hacen más grandes y se dividen en forma activa, incrementando su número. Las plantas crecen a lo largo de toda su vida en forma continua mientras que los animales lo hacen solo durante un período. Una vez finalizado este período, no crecen más.


La etapa de desarrollo implica la adquisición de nuevas funciones, por ejemplo, la función de reproducción: las plantas desarrollan las flores portadoras de las estructuras reproductivas mientras que en los animales maduran los órganos reproductores.

El ciclo de vida de las plantas con flor comienza con la germinación de la semilla, de ella nace una plántula, es decir, una planta pequeña. A medida que la plántula crece, produce más hojas y ramas. Durante su desarrollo aparecen las flores. Cuando la planta completa su maduración, las flores se transforman en frutos con semillas en su interior, que germinarán y darán origen a nuevas plantas.

La **reproducción** es la capacidad que tiene un organismo de dejar descendientes semejantes a él y así asegurar la perpetuidad de su especie. El ADN es la biomolécula responsable de la herencia: porta la información genética de los progenitores, que será heredada por su descendencia.



Ciclo de vida de una planta con flor: luego de la fecundación y la producción de semillas, las paredes del ovario de la flor se transforman en el fruto. El fruto protege en su interior las semillas y, en algunos casos, colabora con su dispersión.




Como consecuencia del proceso de reproducción, el ADN paterno y el materno con la información genética de los progenitores se transmiten a la descendencia.

El conjunto de seres vivos evoluciona

En la actualidad se acepta que el conjunto de seres vivos cambia a lo largo de generaciones y que, como consecuencia de esos cambios, en un proceso que lleva miles de años, a partir de especies antecesoras se originan especies nuevas. La **evolución biológica** es el proceso que origina nuevas especies a partir de una especie más antigua.

En cada nueva generación nacen individuos con algunas características diferentes a las de sus progenitores, por eso son semejantes y no idénticos a ellos. Esas características diferentes están asociadas a la variabilidad aportada por la meiosis* y las mutaciones*. Si las **mutaciones** ocurren en las gametas, se transmiten a la siguiente generación. Estas variaciones heredables podrían dar lugar a una nueva especie en un proceso que dura millones de años.

Si las variaciones o características diferentes son heredables y les otorgan a los individuos la capacidad de dejar más descendencia, la especie prevalecerá a lo largo del tiempo.



Los elefantes de la actualidad surgieron de una especie antecesora antigua que vivió hace 38 millones de años.



No todos los miembros de una misma especie son idénticos.

Glosario

meiosis: sucesión de dos divisiones celulares durante la formación de las gametas, de la que resultan cuatro células que tienen un cromosoma de cada pareja de la célula original.

mutación: cambio en la información genética contenida en el ADN.

Actividades


1. Observen la siguiente ilustración y respondan las preguntas.

a. ¿Cómo se llama el ancestro de los caballos actuales?

b. Los caballos actuales, ¿son idénticos a sus ancestros? ¿Qué diferencias observan en su altura, pelaje y huesos?

c. ¿Cuántos millones de años pasaron hasta que el caballo adquirió su aspecto actual?


¿Fue lento o rápido ese proceso de evolución?



Orden en la diversidad

Para facilitar el estudio de la **biodiversidad**, es decir, el conjunto de todos los seres vivos que habitan la Tierra, los científicos la clasifican teniendo en cuenta diferentes criterios.

Los **criterios de clasificación biológica** permiten agrupar seres vivos que comparten algún rasgo o característica. El rasgo o característica debe ser observable (color, longitud, altura) y compartido por todos los integrantes del grupo.



Los grupos de seres vivos se ordenan en niveles siguiendo una jerarquía. Cada nivel dentro de la jerarquía representa una categoría taxonómica.

La clasificación de los seres vivos es dinámica. Esto significa que cambió y seguirá cambiando a medida que las ideas científicas se modifican debido a los nuevos descubrimientos. Entonces, los seres vivos no se clasificaron siempre de la misma manera, y su ordenamiento sigue modificándose en la actualidad por los descubrimientos en el área de la Biología Molecular. Hoy en día se los clasifica según su **filogenia**, es decir, su parentesco evolutivo.

Clasificación jerárquica de *Canis lupus*. La categoría taxonómica de nivel superior es el reino. Dentro de un reino se encuentra un segundo nivel de jerarquía: el filo. Dentro de un filo se diferencian las clases y, a su vez, dentro de las clases, los órdenes, y así sucesivamente familias, géneros y especies.

Las clasificaciones antiguas

En el siglo IV a. C., el filósofo y científico griego Aristóteles dividió a los seres vivos en dos reinos: el reino vegetal y el reino animal. Clasificó las plantas según su tipo de tallo en hierbas, arbustos y árboles. Dividió a los animales en dos grupos: animales de sangre roja (mamíferos, reptiles y aves) y animales sin sangre (insectos y moluscos). Los animales de sangre roja están representados actualmente por los vertebrados mientras que los animales sin sangre, por los invertebrados. Además, clasificó a los animales con sangre según su locomoción en nadadores, voladores y corredores.

Los grandes viajes de conquista del siglo XVI permitieron a los naturalistas de la época armar colecciones grandes de plantas y animales desconocidos hasta ese momento, que era necesario ordenar.

En el siglo XVIII, el naturalista sueco Carlos Linneo dividió la naturaleza en tres reinos: el reino mineral, el reino vegetal y el reino animal. Según Linneo, los minerales crecen; los vegetales crecen y viven, y los animales crecen, viven y sienten.

Actividades


1. ¿Qué criterios utilizó Aristóteles para clasificar las plantas? ¿Y los animales?
 2. Agrupen los siguientes animales usando los criterios de Aristóteles: golondrina, pez espada, mosquito, pingüino, delfín, pato.
- a. ¿Con qué inconvenientes se encuentran si usan estos criterios? Expliquen.
 3. Busquen en enciclopedias o en Internet la clasificación jerárquica del *Homo sapiens* y cópienla en sus carpetas.

La clasificación filogenética

La **filogenética** es la ciencia que estudia las relaciones evolutivas entre grupos de organismos. La filogenia de un grupo de seres vivos permite determinar quiénes fueron sus antecesores comunes, y cómo a partir de ellos surgieron nuevas especies y otras se extinguieron.

Los **árboles filogenéticos**, estructuras con aspecto de árboles ramificados, representan gráficamente la filogenia.

En 1990, el microbiólogo estadounidense Carl Woese propuso la creación de una nueva categoría taxonómica de mayor jerarquía que el reino: el **dominio**. Woese dividió toda la diversidad biológica en tres dominios, que incluyen los cinco reinos estudiados: bacteria, archaea y eukarya.



Árbol filogenético de la vida. En él aparecen las arqueas, organismos procariotas ubicados antiguamente en el reino monera. Su pared celular y su metabolismo son diferentes a los de las bacterias.

Actividades experimentales

La clasificación de las hojas de las plantas

La siguiente experiencia tiene como objetivo establecer criterios de clasificación y experimentar el dinamismo de la clasificación: según cómo usemos esos criterios podremos dividir a los seres vivos en grupos distintos.

Necesitan:

- ▶ hojas de 10 plantas y árboles diferentes
- ▶ bandejas de plástico
- ▶ lupa
- ▶ hojas de papel
- ▶ lápiz negro
- ▶ goma de borrar

Paso 1. Observen cada una de las hojas.

Paso 2. Registren su forma (aciculada, alargada, triangular, romboide, lobulada, etc.) y la disposición de las nervaduras (nervaduras paralelas o en red).

Paso 3. Observen con la lupa los bordes y registren su forma (dentado, aserrado, entero, ondulado, ciliado).

Paso 4. Según las observaciones que hicieron, escriban los tres criterios que utilizarán para clasificar las hojas.


Paso 5. Coloquen las hojas en las bandejas de

plástico y formen dos grupos en función de una característica. Indiquen el criterio utilizado.

Paso 6. Dividan cada uno de los grupos obtenidos en dos, e indiquen el nuevo criterio que utilizaron.

Paso 7. Si pueden, divídanlos de nuevo.

1. Completen el siguiente esquema.



2. Respondan las siguientes preguntas.

- a. ¿Cuántos grupos de hojas obtuvieron?
- b. ¿Cómo quedarían esos grupos si cambiaron el orden de uso de los criterios?
- c. ¿Usarían cualquier criterio para comenzar la clasificación? ¿Por qué?

La biodiversidad

Actividades

1. ¿Qué beneficios les trae a los seres humanos la conservación de la biodiversidad?
2. ¿Cuáles son las ventajas de conservar y proteger la biodiversidad desde el punto de vista biológico y evolutivo?
3. ¿Qué acciones cotidianas podrían adoptar ustedes como ciudadanos para mantener la diversidad?
4. ¿Qué medidas podrían adoptar los gobiernos para el mismo fin?



La selva constituye un gran reservorio de especies animales y vegetales, y de numerosos microorganismos.

La **biodiversidad** es el conjunto de todos los seres vivos que habitan la Tierra. Estos seres vivos alcanzan distintos niveles de organización, y para aprender sobre ellos se los divide en distintos grupos utilizando criterios de clasificación. La Tierra es el único planeta en el que se ha desarrollado la vida tal como la conocemos actualmente. Es el hogar de miles de millones de plantas, animales, hongos, bacterias y protistas. Sin embargo, los seres humanos, muchas veces, realizamos actividades que perjudican a otros seres vivos y dañan el ambiente. Por eso, es necesario que todos tomemos conciencia de que el cuidado de la biodiversidad está en nuestras manos: de nosotros depende que la Tierra siga siendo nuestro hogar.

¿Por qué es importante cuidar y preservar la biodiversidad de nuestro planeta?

La biodiversidad se está reduciendo a gran velocidad como consecuencia de una **tasa de extinción de especies elevada**, es decir, en poco tiempo se está extinguiendo una gran cantidad de especies. Esta pérdida está vinculada a la contaminación del suelo, del agua y del aire causada por los seres humanos y, por otro lado, a la **modificación de ambientes naturales** para actividades agrícola-ganaderas, explotación de minerales y crecimiento de ciudades.

La biodiversidad ofrece numerosos beneficios para los seres humanos:

► Microorganismos como hongos y bacterias son utilizados para la producción de antibióticos y vacunas contra enfermedades. También se aprovecha su metabolismo como recurso biotecnológico para la producción de alimentos, como yogur, pan, vinos y cerveza, y la producción de biocombustibles.

► La inmensa diversidad de especies vegetales contribuye a la oxigenación del aire y a la captación de dióxido de carbono, a la vez que modulan el clima. Por ejemplo, las especies vegetales del bosque dan sombra a otras plantas y disminuyen así la evaporación del agua causada por el Sol, y el agua retenida crea un ambiente húmedo y fresco que regula el clima. A su vez, la existencia de insectos y aves polinizadoras asegura la dispersión y reproducción de especies vegetales.

La biodiversidad es el reservorio de la variabilidad genética, indispensable para la perpetuación de las especies y el surgimiento de otras nuevas.

Todos los productos de la naturaleza obtenidos por los seres humanos dependen de la existencia y el mantenimiento de la **variabilidad biológica**. Además, a medida que aumenta la variabilidad de los seres vivos, los ecosistemas tienen mayor capacidad de recuperarse frente a un desequilibrio. Por lo tanto, la conservación de la biodiversidad es un elemento esencial para la conservación de los ecosistemas y el desarrollo sostenible.

Para conocer más

Andrade Gamboa, J. J., *La química está entre nosotros*, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2013.

Darwin, Ch., *Autobiografía*, Navarra, Ed. Laetoli, 2009.

La música, el humor y la clasificación de las ovejas

Les Luthiers es un grupo argentino de humor que utiliza la música como hilo conductor de todas sus obras. Sus instrumentos musicales están fabricados con materiales sencillos de la vida cotidiana. De allí su nombre, del francés *luthier*, “creador de instrumentos musicales”.

En uno de sus espectáculos, cuentan con humor lo confuso que puede resultar un determinado criterio de clasificación y los equívocos que pueden surgir.

“Y dice el narrador:

Muchos especialistas sostienen que algunos animales son sensibles a la música, Mastropiero entre ellos.

Entre los especialistas.

Tal vez la experiencia más fascinante de Mastropiero sobre los sonidos que emiten los distintos animales fue la que realizó con un rebaño de ovejas, en la hacienda de su amigo Gustav Schafterfen.

Allí comprobó que el 37% de los ovinos estudiados proferían un sonido que se iniciaba con un ataque bilabial nasal laríngeo, similar a una M, seguido por una reiteración en staccato de un sonido de E abierta gutural* con resonancias palato-alveolares, o sea M-E-E-E-E-E.*

El restante 63% reemplazaba el ataque bilabial nasal por un ataque bilabial fricativo laríngeo, B-E-E-E-E-E. Además, del total de ovejas que emitían B-E-E-E-E-E, un 12% también podía emitir M-E-E-E-E-E, y las llamó ovejas de balido* mixto, ambivalentes o ambibalantes.*

Por otra parte, si bien algunas B-E-E-E-E-E podían M-E-E-E-E-E-E, ninguna M-E-E-E-E podía B-E-E-E-E-E, salvo QU-E-E-E-E-E estuviera en la proximidad de una B-E-E-E-E-E ambibalante, en cuyo caso dicha M-E-E-E-E no hacía ni M-E-E-E-E-E, ni B-E-E-E-E-E, sino que guardaba un respetuoso silencio.

Pero lo que más asombró a Mastropiero fue que en medio del rebaño había una oveja que no balaba como las demás y que cada vez que lo veía corría hacia él profiriendo un extraño: U-U-U-U-U. Mastropiero creyó encontrarse ante un hallazgo científico. Grande fue su desilusión al descubrir que no se trataba de una simple oveja, sino de la hermana de Gustav Schafterfen”.



Grupo *Les Luthiers*.

Glosario

balido: voz del carnero, el cordero, la oveja, la cabra, el gamo y el ciervo.

fricativo: consonante que se articula permitiendo una salida continua del aire emitido, y hace que este produzca cierta fricción o roce en los órganos bucales.

gutural: sonido que se articula tocando el dorso de la lengua con la parte posterior del velo del paladar o acercándose a él formando una estrechez por la que pasa el aire espirado.

proferir: pronunciar, decir, articular palabras o sonidos.

*Les Luthiers, “Romance del joven conde, la sirena y el pájaro cucú. Y la oveja”, presentado en el espectáculo *Viegesimo aniversario*, marzo de 1989 (fragmento).*

Actividades

1. Respondan las siguientes preguntas.

a. ¿A qué grupo de animales se intenta clasificar en la obra? ¿Por qué?

b. ¿Cuáles son los criterios de clasificación propuestos?

c. ¿Qué confusiones surgieron a raíz del uso de esos criterios de clasificación?

Actividades finales

- 1.** ¿Qué características comparten los seres vivos? Explíquenlas.
- 2.** Escriban en cada recuadro la letra que corresponde a la característica de los seres vivos que mejor representa a cada oración.

 - a.** Presentan una composición química particular.
 - b.** Poseen una organización interna.
 - c.** Se relacionan con el medio externo.
 - d.** Son capaces de mantener la estabilidad de su medio interno.
 - e.** Poseen un ciclo vital.
 - f.** Tienen la capacidad de evolucionar.
- 4.** Escriban en la carpeta en qué nivel de organización de la materia y de los seres vivos ubicarían las siguientes estructuras.

 - a.** Piel.
 - b.** Molécula de agua.
 - c.** Neuronas.
 - d.** Músculo cardíaco.
 - e.** Cerebro.
 - f.** Oxígeno.
 - g.** Glucosa.
 - h.** *Escherichia coli*.
 - i.** Clavel.
 - j.** Glóbulos rojos.

- Los aminoácidos son las unidades componentes de una biomolécula más grande: la proteína.
- Juan está resfriado y tiene mucha fiebre: su temperatura corporal ascendió a 38 °C. Luego de un día de reposo se sintió mejor, la fiebre había desaparecido y su temperatura corporal restableció su valor normal.
- Algunos seres vivos, como las bacterias, están formados por una sola célula, mientras que otros, como las plantas, están formados por millones de células.
- Cuando despertó de la siesta, la luz intensa del Sol lo obligó a cerrar los ojos.
- El elefante actual es más pequeño que su ancestro, el mamut.
- Cuando las condiciones de luz y temperatura fueron favorables, la semilla germinó y dio una nueva planta.

- 3.** Completen las oraciones con las palabras correspondientes.

- a.** Los organismos están formados por una sola célula mientras que los organismos están formados por millones de células.
- b.** Los organismos de los reinos plantae, y tienen células eucariotas. El reino es el único con organismos de células procariotas.
- c.** Las plantas alcanzan el nivel de organización de Sus órganos son las flores....., y

- 5.** Sabiendo que $1 \mu\text{m} = 0,001 \text{ mm}$, calculen:
- a.** ¿Cuántos micrones entran en un milímetro?
 - b.** Si un organismo unicelular mide $2 \mu\text{m}$, ¿cuántos organismos unicelulares habrá en un centímetro?
 - c.** Si un espermatozoide mide alrededor de $5 \mu\text{m}$, ¿cuántos espermatozoides entran en un milímetro?

- 6.** Carlos Linneo (1707-1778) fue un naturalista, botánico y zoólogo sueco considerado el fundador de la taxonomía moderna. La taxonomía es la ciencia de la clasificación. Linneo creó un sistema para clasificar y nombrar las distintas especies de seres vivos, llamado nomenclatura binomial.

Busquen información sobre Carlos Linneo en enciclopedias o en Internet y respondan.


- a.** ¿Cuántas categorías para clasificar a los seres vivos propuso Linneo?
- b.** ¿Cómo se determina el nombre de una especie según la nomenclatura binomial?
- c.** ¿Qué debe hacerse antes de poner nombre a una especie?
- d.** Determinen el nombre científico de la planta de papa y del tigre de bengala.

- 7.** En los días de calor tenemos más sed y transpiramos más de lo habitual. Teniendo en cuenta el concepto de homeostasis:

- a.** ¿Cuál es el cambio del medio externo?
- b.** ¿Qué desequilibrio se produce debido a ese cambio?
- c.** ¿Qué sensación aparece y cuál es la acción que ayuda a recuperar el equilibrio?
- d.** Mencionen otros ejemplos de regulación homeostática que puedan reconocer en los seres humanos.

Origen de la vida

2



Contenidos

- > Características de los seres vivos
- > Composición de los seres vivos
- > Explicaciones sobre el origen de la vida
- > Refutación de la teoría de la generación espontánea
- > Origen y nutrición de las primeras células

Los guías del zoológico acompañaban a los visitantes, aportando información a su paseo. Cerca del sector acuático, algunos niños se maravillaban mientras otros hacían preguntas.

“¿De qué se alimentan los cocodrilos? ¿Por qué se parecen a los dinosaurios?”.

El guía les explicó que los dinosaurios y los cocodrilos tuvieron un mismo antepasado, que vivió en la Tierra hace aproximadamente 250 millones de años. La respuesta generó una nueva pregunta: “Y ese antepasado, ¿tuvo un antepasado?”.

El guía les contó que todos los seres vivos tenemos un mismo antepasado, y que por eso compartimos ciertas características. La explicación generó tal curiosidad en los visitantes que no pudieron dejar de volver a preguntar.

¿Cómo y dónde se originó ese primer antepasado de todos los seres vivos? ¿Qué características tenía? ¿Cómo eran las condiciones del planeta en ese momento? ¿Existe una única explicación sobre el origen de la vida en la Tierra?

EN ESTE CAPÍTULO...

Se explican las diferentes teorías sobre el origen de la vida en el planeta Tierra.

Además, se describen las condiciones ambientales de la Tierra primitiva y la nutrición de las primeras células.


Contenido digital adicional

www.tintaf.com.ar/

NBIO1C2



Diferencia entre lo vivo y lo no vivo



Las levaduras son organismos unicelulares.



Los insectos son organismos pluricelulares.

Glosario

nutriente: sustancia que utiliza la célula como fuente de materia y energía para construir su estructura y cumplir sus funciones.

Representación de la entrada de nutrientes a una célula, su transformación en el interior y la eliminación de desechos.

Curiosidades

El oso polar tiene una gruesa capa de grasa subcutánea que le permite aislarse del ambiente y mantener su temperatura interna a aproximadamente 37 °C, incluso cuando en el exterior la temperatura es menor a -37 °C.


Si observamos atentamente a nuestro alrededor, encontraremos que estamos rodeados de infinidad de seres. Algunos son más grandes, y los podemos ver a simple vista, mientras que otros son más pequeños, y solo los podemos observar a través de un microscopio. Aunque pueden ser muy diferentes entre sí, todos los seres vivos tienen características en común que nos permiten reconocerlos como tales. Para estudiar cómo se originó la vida, es necesario definir esas características.

Los seres vivos están formados por células. La **célula** es la parte más pequeña que compone el cuerpo de todos los organismos y que es capaz de realizar todas sus funciones. Los seres vivos pueden clasificarse en **unicelulares**, cuando son una única célula, y **multicelulares o pluricelulares**, si su cuerpo está formado por muchas células. En estos últimos, las células no solo están agrupadas, sino que además están conectadas entre sí para funcionar de manera coordinada.

Los seres vivos son **sistemas abiertos** ya que intercambian materia y energía con el ambiente que los rodea. Estos intercambios ocurren, por ejemplo, cuando los organismos se nutren. La **nutrición** es el conjunto de procesos biológicos a través de los cuales ingresan los nutrientes*, se distribuyen hasta las células, y se transforman para obtener materiales y energía que se usan para diversas actividades. Los nutrientes pueden obtenerse a partir de otros seres vivos que sirven de alimento, o el mismo organismo los puede fabricar a partir de sustancias más simples que toma del ambiente. El primer tipo de nutrición recibe el nombre de **heterótrofa** y el segundo, **autótrofa**.

Los organismos heterótrofos intercambian materia cada vez que ingieren alimentos y eliminan desechos. Los organismos autótrofos, como las plantas, fabrican sus nutrientes durante el proceso de **fotosíntesis**.

El conjunto de transformaciones de la materia y la energía que ocurren en el interior de cada célula se llama **metabolismo**. Esta es otra de las características comunes a todos los seres vivos, ya que no solo un ser vivo debe hacer intercambio de materiales y energía con el ambiente, sino que debe transformar esos materiales en sus células para poder aprovecharlos.



Los seres vivos tienen mecanismos de autorregulación para evitar que sus condiciones internas se modifiquen cuando hay cambios en el ambiente que los rodea. Por ejemplo, la temperatura es una condición que debe mantenerse constante en nuestro cuerpo. La transpiración durante el verano permite disminuir la temperatura interna cuando la externa es elevada. Esta característica de los organismos de mantener la estabilidad de su medio interno constante se llama **homeostasis**.

Los seres vivos se reproducen, es decir, originan otros organismos similares a ellos. La **reproducción** es fundamental para asegurar la continuidad de la especie a través del tiempo, pero no lo es para la supervivencia del individuo en sí. Por tal motivo, esta es la única característica que puede estar ausente en un ser vivo, y aun así seguir considerándolo como tal. La mayoría de los animales tienen **reproducción sexual**, que es aquella en la que intervienen dos organismos de distinto sexo. En los organismos más simples, como los microorganismos, la forma de reproducción más común es la **asexual**. En este caso, el nuevo organismo se origina partir de un único progenitor, y es idéntico a él. Esta forma de reproducción puede estar presente también en animales y plantas.

Los seres vivos poseen también **irritabilidad**, la capacidad de percibir estímulos o cambios del ambiente, y generan una respuesta. Esto ocurre, por ejemplo, cuando tocamos algo muy caliente con la mano y la alejamos rápidamente para no quemarnos. Los animales tienen un sistema nervioso especializado en captar las señales externas y generar una reacción. Pero no son los únicos que presentan irritabilidad. La orientación de las plantas hacia la luz o el reconocimiento de las bacterias del género *Rhizobium* de su organismo hospedador* (las plantas) son otros casos menos intuitivos que muestran esta capacidad.

Los seres vivos están **adaptados al ambiente** en el que viven. Por ejemplo, las alas son adaptaciones de las aves que les permiten volar. Las **adaptaciones** son características de los organismos que les aportan ventajas para vivir en el ambiente en el que habitan. Se clasifican en:


- ▶ **estructurales:** cuando están relacionadas con la forma del cuerpo, como el caso de las alas de las aves.
- ▶ **fisiológicas:** cuando tienen que ver con el funcionamiento del organismo. Por ejemplo, la capacidad que tienen los osos de hibernar.
- ▶ **comportamentales:** cuando están relacionadas con las conductas de los seres vivos, como el canto de las aves macho para atraer a las hembras.



Durante la hibernación, ciertos animales, como el oso pardo, permanecen en un estado similar al sueño debido a que disminuye su actividad metabólica interna.

Curiosidades ►

La mayoría de los **híbridos***, como el ligre (cruce de león y tigresa), no tienen la capacidad para dejar descendencia debido a incompatibilidades genéticas, pero nadie dudaría de que están vivos.



Bulbo redondeado sobre la raíz de una planta, que contiene en su interior bacterias del género *Rhizobium*.

Glosario

híbrido: organismo procedente de la cría de dos organismos de distintas especies.

hospedador: organismo que alberga a otro en su interior o que lo porta sobre sí.

Actividades

1. Escriban un ejemplo para cada una de las características de los seres vivos.
2. Expliquen por qué la bioma que usan no está viva y sí lo están ustedes. Tengan en cuenta las características estudiadas en esta sección.

Estructura de los seres vivos

Glosario

elemento químico: tipo de sustancia que no puede descomponerse en otras, como el hidrógeno, el oxígeno y el carbono.

enlace químico: fuerza de unión que existe entre dos átomos.


fórmula química: representación simbólica de la molécula, en la que se indican el tipo y la cantidad de átomos que la forman.

Como dijimos anteriormente, todos los seres vivos están formados por células. Podemos preguntarnos ahora: ¿cómo están constituidas las células? Las células tienen una composición química única y muy compleja. Están formadas por millones de millones de **moléculas**, algunas de ellas simples, como el agua, y otras de mayor tamaño, como los azúcares. La molécula es la partícula más pequeña que presenta todas las propiedades de una sustancia. Un vaso con 250 ml de agua contiene en su interior muchísimas moléculas de agua, alrededor de 8.355.760.000.000.000.000.000. ¿Pueden imaginarse lo minúsculas que son? Las moléculas están formadas a su vez por partículas más pequeñas, llamadas **átomos**, que se unen mediante enlaces químicos*. La molécula de agua, por ejemplo, está constituida por dos átomos de hidrógeno (H) y uno de oxígeno (O), y por eso se representa con la fórmula química* H_2O .

Una manera de representar las moléculas es a través de modelos moleculares. Un **modelo** es la representación de algo que no es perceptible a simple vista, y que nos facilita su comprensión. En los modelos moleculares se utilizan en general esferas de un mismo color para simbolizar a los átomos de un mismo tipo o elemento químico*. Por ejemplo, los átomos de oxígeno con esferas rojas y los de hidrógeno con esferas blancas. De este modo, podemos dibujar la molécula de agua con una esfera roja rodeada de dos esferas blancas. Conviene recordar que ese dibujo no es la verdadera molécula de agua, sino una representación de ella.




Vaso con agua. Sustancia formada por moléculas de agua, constituidas a su vez por átomos de hidrógeno y oxígeno.



cena energía, que se denomina **energía química**. Podemos diferenciar dos tipos de moléculas orgánicas: aquellas más sencillas, constituidas por unos pocos átomos de carbono, como el metano (CH_4) o el alcohol común (CH_3CH_2OH) y otras más complejas, que reciben el nombre de **biomoléculas**. La glucosa y el almidón son ejemplos de biomoléculas.

Modelo del alcohol común o etanol (molécula orgánica sencilla). Las esferas grises representan los átomos de carbono; las blancas, los de hidrógeno, y la roja, el único átomo de oxígeno que tiene esta molécula.



Actividades experimentales

Construcción de modelos escolares de moléculas

El objetivo de esta experiencia es mostrar los distintos niveles de complejidad que pueden tener las moléculas que forman a los seres vivos. Para ello, representaremos los átomos de los distintos elementos químicos con clips de metal, y los uniremos para construir moléculas.

Necesitan:

- 7 clips de metal de color rojo para representar los átomos de carbono (C)
- 8 de color azul para representar los de oxígeno (O)
- 12 de color amarillo para representar los de hidrógeno (H)

Paso 1. Representen la molécula de dióxido de carbono (CO_2) utilizando un clip rojo y dos azules.

Paso 2. Copien en la carpeta el modelo de molécula de dióxido de carbono, señalando los átomos que la componen.

Paso 3. Representen la molécula de glucosa ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$) con los restantes clips. Para esto, unan primero los clips rojos que representan los átomos de carbono formando una cadena. Luego, sobre esta cadena, vayan agregando los clips de los otros colores, tratando que cada clip rojo lleve la misma cantidad de los otros colores.

Paso 4. Comparen los modelos de molécula de


glucosa construidos por los distintos grupos. ¿Son todos iguales? Es posible que con los mismos clips hayan construido modelos de moléculas distintas pero en realidad, en cada molécula los átomos que la forman están unidos de una manera determinada.

Paso 5. Copien en la carpeta el modelo de molécula de glucosa que armaron. Escriban cuántos átomos la forman.


Paso 6. Construyan ahora una parte de la molécula de almidón. El almidón es una molécula muy compleja, formada por la unión de cientos de moléculas de glucosa. Para hacerlo, cada grupo deberá unir primero los dos extremos de la cadena de clips rojos, y obtener una molécula circular. Luego, con la ayuda del docente, unan todas las moléculas de glucosa que hayan construido en el aula.

Paso 7. Cuenten cuántos átomos contiene el fragmento de la molécula de almidón que armaron y escribanlo en la carpeta.

Paso 8. Redacten una conclusión sobre las diferencias que encontraron entre la complejidad, el tamaño y el número de átomos que componen las moléculas de dióxido de carbono, glucosa y almidón. Clasifiquenlas en inorgánicas, orgánicas sencillas o biomoléculas.



Modelo científico.




Modelo escolar.

En el modelo científico de glucosa se utilizan esferas para representar los distintos átomos y se respeta la forma en que se ubican en el espacio en la molécula real. En el modelo escolar, los clips representan los átomos y no es necesario que se unan igual que en la molécula real.

Así se trabaja en ciencias

Los modelos científicos se construyen a partir de teorías y de los datos obtenidos de las investigaciones. Los modelos escolares son aquellos que podemos construir en la escuela, y también sirven para representar la realidad, pero de una manera menos formal.

Las biomoléculas



Un polímero, como un collar, está formado por la unión de unidades similares más pequeñas, llamadas monómeros (en este caso, las perlas).


Las **moléculas biológicas** o **biomoléculas** solo están presentes en los seres vivos y en los derivados de ellos. Están formadas por átomos de carbono (C), a los que se unen átomos de hidrógeno (H), oxígeno (O) y en algunos casos nitrógeno (N), fósforo (P) y azufre (S). Existen cuatro tipos básicos de biomoléculas: los hidratos de carbono, las proteínas, los lípidos y los ácidos nucleicos. Pueden ser relativamente pequeñas o tener miles de átomos. Las moléculas grandes se llaman **polímeros** y están constituidas por la unión de otras de menor tamaño y complejidad, que se denominan **monómeros**.

Existen distintos tipos de monómeros, según los tipos de átomos que contienen. Los **hidratos de carbono** están formados por un tipo de monómero que tiene solamente carbono, hidrógeno y oxígeno, y recibe el nombre de **monosacárido**. La glucosa es un monosacárido. Cuando muchas moléculas de glucosa se unen, forman polímeros, como el almidón. Los **aminoácidos** son otro tipo de monómero, constituidos por átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Existen 22 clases de aminoácidos diferentes, según cómo se unan esos átomos y cuántos sean. La cadena formada por la unión de aminoácidos se llama **proteína**. La hemoglobina y la insulina son ejemplos de proteínas.


Los ácidos nucleicos son polímeros constituidos por la unión de otro tipo de monómeros, llamados **nucleótidos**. Los nucleótidos tienen átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Su estructura química es bastante compleja. El ADN es un ejemplo de un ácido nucleico, que está formado por dos largas cadenas de nucleótidos unidos entre sí. Finalmente, los **lípidos** no forman polímeros y tienen la particularidad de ser moléculas de gran tamaño que no se disuelven en agua. Entre ellos podemos nombrar los aceites y las grasas.

Referencias ▼


- gris: átomos de carbono (C)
- rojo: átomos de oxígeno (O)
- blanco: átomos de hidrógeno (H)
- azul: átomos de nitrógeno (N)



Modelo de glicina (aminoácido).



Modelo de nucleótido.



Modelo de ácido graso (lípido).

Actividades

1. Completen el siguiente cuadro en la carpeta.

	Hidratos de carbono	Lípidos	Proteínas	Ácidos nucleicos
Nombre del monómero que las compone				
Ejemplo				

2. Averigüen cuál es la molécula más abundante en los seres vivos.


Propongan algunas razones que permitan explicarlo.

Virus: entre la vida y la muerte


La palabra virus se refería originalmente a cualquier emanación venenosa y más tarde se utilizó para designar a cualquier agente causal de una enfermedad infecciosa. En 1889, Friedrich Loeffler y Paul Frosch investigaban la causa de una enfermedad que afecta gravemente la piel de los animales, la glosopeda. Encontraron que el causante era un agente muy pequeño, capaz de pasar a través de los filtros que no podían atravesar las bacterias. Un año después, el microbiólogo holandés, Martinus Beijerinck publicó su trabajo sobre la enfermedad del mosaico del tabaco, que daña las hojas del tabaco y de los tomates. Años antes, Dmitri Ivanowski, en Rusia, había demostrado por primera vez que el agente causal de la enfermedad del mosaico del tabaco era filtrable, pero Beijerinck fue mucho más lejos y presentó pruebas de que aun cuando el agente causal fuera filtrable, tenía muchas de las propiedades de un organismo vivo. Lo llamó "Contagium vivum

fluidum" (fluido vivo contagioso). Propuso que el agente debía ingresar a la célula viva a fin de reproducirse y que su reproducción se debía efectuar en forma paralela a la célula. Más tarde, en 1915, se descubrieron los virus que atacan bacterias, también conocidos como bacteriófagos.

Un virus es una estructura situada entre lo animado y lo inanimado. Es básicamente una diminuta partícula infecciosa que contiene un ácido nucleico central (el material genético), rodeado por una capa de proteínas llamada cápside. Se considera que no son organismos verdaderos porque no pueden realizar actividades metabólicas de manera independiente y carecen de los componentes necesarios para la reproducción celular o para fabricar proteínas y otras moléculas. Los virus pueden reproducirse, pero únicamente dentro del complejo ambiente de las células vivas a las que infectan. En cierto sentido, los virus "cobran vida" solo cuando infectan una célula.



Fotografía de un virus tomada con una cámara conectada a un microscopio electrónico.



Esquema de un virus que muestra su estructura básica, que es un ácido nucleico central rodeado por una capa de proteínas.

Adaptación del artículo de Rosa María Catalá: "Virus. Entre la vida y la muerte", publicado en la revista de divulgación de la ciencia de la UNAM (México) llamada *¿Cómo ves?*, volumen 22, año 2000.

Actividades

- Luego de leer el artículo, resuelvan las siguientes consignas.
 - ¿Qué es un virus? ¿A qué tipo de organismos puede afectar?
 - ¿Cómo demostraron Loeffler y Frosch que los virus no eran bacterias? ¿Qué pudieron determinar acerca de su tamaño?
 - ¿Cómo están formados los virus? ¿Son organismos constituidos por células?
 - Indiquen si los virus tienen alguna de las siguientes características de los seres vivos. Justifiquen su respuesta.
 - metabolismo
 - reproducción
 - ¿Puede considerarse a los virus como seres vivos? Justifiquen su respuesta.
 - ¿Por qué creen que el título del artículo es "Virus: entre la vida y la muerte"?

Explicaciones sobre el origen de la vida


El creacionismo y la teoría de la generación espontánea

Primera página
del manuscrito
del *Popol Vuh*.



Así se trabaja en ciencias

Una **hipótesis** es la respuesta a una pregunta sobre un hecho u observación, que puede ponerse a prueba mediante la experimentación. Las hipótesis siempre deben redactarse en modo afirmativo y en tiempo presente. En general, son oraciones simples y específicas. Una **teoría** es un conjunto de ideas e hipótesis que permiten explicar un fenómeno.



Aristóteles (384-322 a.C.)

Filósofo y naturalista griego. Sus ideas han influenciado el pensamiento de Occidente por más de 2.000 años. Dejó obras escritas sobre una gran variedad de áreas del conocimiento, entre ellos la filosofía, la ética, la lógica, la política y las ciencias naturales. Es considerado el fundador de la lógica y la biología.

Glosario

inerte: sin vida.

Las células tienen características muy particulares y cumplen funciones únicas. Conocer los orígenes de la vida es uno de los grandes interrogantes para el hombre desde tiempos muy remotos. Diversas civilizaciones han intentado responder esta pregunta a través de historias en las que se describen los comienzos del universo, de la Tierra y de la vida como actos de creación de diferentes dioses. Estos relatos forman parte de los libros sagrados de los pueblos. Seguramente el más conocido sea la Biblia. Pero existen muchos otros, entre ellos el *Popol Vuh*, perteneciente a la cultura maya. En él

se describe cómo al principio solo existían las deidades mayores (el Creador, el Formador, los Progenitores, Tepeu y Gucumatz y el Corazón del Cielo) sobre un mar inmóvil. Más adelante relata cómo los dioses dispusieron la creación y el crecimiento de los árboles y las plantas trepadoras, y el nacimiento de la vida y la creación del hombre. Como en los mitos de creación de otras religiones, la culminación tiene lugar cuando aparece el hombre. A este tipo de explicaciones sobre el origen de la vida a partir de actos de dioses creadores, inspiradas en creencias religiosas o populares, se las llama creacionistas.

El **creacionismo** carece de bases científicas, ya que no es posible verificar los fenómenos sobrenaturales ni la existencia de entidades no materiales. Las teorías científicas se basan en los resultados de investigaciones, en las que se ponen a prueba **hipótesis**. Para ello se aplica una serie de pasos, técnicas y procedimientos, que en conjunto podemos denominar **metodología científica**. La elaboración de las reglas que utilizamos en la actualidad en las investigaciones ha llevado muchos años, y es el producto del aporte de gran cantidad de protagonistas.

La cultura científica actual tiene sus bases en el Renacimiento (siglos xv y xvi), período histórico en el que tuvo lugar un fuerte cambio en el panorama intelectual de Europa. En la Antigüedad y en la Edad Media, las teorías sobre la naturaleza estaban muy influenciadas por las ideas de Aristóteles. En lo que respecta al origen de la vida, este gran pensador griego sostenía que los peces e insectos podían originarse espontáneamente a partir del rocío, la humedad y el sudor. Esta explicación fue aceptada y generalizada por otros pensadores, lo que dio lugar a la **teoría de la generación espontánea o abiogénesis**. Según ella, los seres vivos pueden generarse de manera espontánea a partir de la materia inerte*.

Actividades

1. Busquen la explicación que propone la Biblia para el origen de la vida.
2. Compárenla con la explicación que se presenta en el *Popol Vuh*.
 - a. ¿Qué similitudes y diferencias encuentran?
 - b. ¿Por qué será que en muchas culturas se ha utilizado la figura de los dioses para explicar el origen de la vida y de los fenómenos naturales?

Refutación de la teoría de la generación espontánea

La idea de que los seres vivos simples, como los gusanos e insectos, podían originarse de manera espontánea en el polvo o en la materia en descomposición fue aceptada prácticamente durante 2.000 años. Fue recién en el siglo XVII que la teoría de la generación espontánea recibió fuertes cuestionamientos. En ese momento histórico comenzaron a realizarse los primeros experimentos biológicos para explicar los fenómenos naturales. Uno de ellos fue la experiencia de Francesco Redi, que permitió demostrar que la teoría de la generación espontánea carecía de validez.

El objetivo del experimento de Redi era demostrar que los seres vivos (moscas en este caso) no se generaban a partir de materia en descomposición (particularmente carne). Para hacerlo, utilizó tres frascos de vidrio, dentro de los cuales colocó la misma cantidad de carne. A uno de los frascos lo tapó herméticamente, a otro lo dejó abierto, y al tercero lo cubrió con una gasa. Después de unas semanas observó que solo había moscas, huevos y larvas de ellas en la carne que estaba dentro del frasco abierto. La carne en los otros dos frascos estaba podrida y olía mal, pero no había sobre ella ninguna forma de vida macroscópica*. Sobre la gasa del tercer recipiente encontró huevos que habían dejado las moscas.



Experiencia de Redi.

A pesar de los claros resultados de Redi, las discusiones continuaron casi 200 años más. El descubrimiento de los microorganismos, descriptos por primera vez por Anton van Leeuwenhoek en el año 1674, dio nuevas ideas a quienes apoyaban la generación espontánea. Estos científicos sostenían que a partir de los **caldos nutritivos** podían desarrollarse formas de vida muy simples. Los caldos nutritivos eran agua con nutrientes disueltos, que se utilizaban para hacer crecer microorganismos en los experimentos que se realizaban en ese momento. El nombre que en la actualidad usan los científicos es "medio de cultivo". Hoy en día sabemos que los medios de cultivo deben esterilizarse antes de realizar cualquier tipo de actividad experimental ya que, de lo contrario, los microorganismos que están en el ambiente utilizarán esos nutrientes para crecer. Pero en aquella época se desconocían las técnicas de esterilización.

Así se trabaja en ciencias


Cuando se realiza un experimento para poner a prueba una hipótesis, pueden darse dos situaciones. Si los resultados demuestran que la hipótesis era incorrecta, esta se descarta o refuta. Luego, en general, se plantean nuevas hipótesis, que requerirán nuevos experimentos. Contrariamente, si los resultados indican que la hipótesis es correcta, se acepta como válida. Conviene tener en cuenta que las hipótesis son verificadas de manera temporal, ya que nuevos conocimientos y experimentos en el futuro pueden aportar evidencias para refutarla.

Glosario

macroscópico: que puede observarse a simple vista, sin la necesidad de utilizar un microscopio.

Actividades

1. Elaboren la posible hipótesis que Redi puso a prueba con su experiencia.
2. ¿Por qué les parece que incluyó el frasco con la gasa?
3. ¿Qué conclusiones pueden sacar de la experiencia de Redi?
4. ¿Por qué piensan que la carne se pudrió? ¿Cómo afecta esto a su objetivo, que era demostrar que la generación espontánea era falsa?
5. ¿Cómo podrían mejorar el experimento para evitar que la carne se pudra?



La experiencia de Pasteur.

Las explicaciones más aceptadas en la actualidad

Los hallazgos de Pasteur permitieron establecer que todo ser vivo, incluso los microorganismos, proviene de otro ser vivo preexistente. Ahora bien, esto es cierto para todos los seres vivos, excepto para los primeros... ¿de dónde provienen entonces estos primeros seres vivos?

Las primeras formas de vida no han dejado registros fósiles, y por lo tanto las explicaciones que los científicos pueden elaborar se basan en teorías químicas y matemáticas, experimentos de laboratorio y en las condiciones primitivas que se supone había en la Tierra. Si bien es posible que la vida se haya originado en más de una oportunidad, se cree que todos los organismos que conocemos provienen de un único ancestro en común, ya que todos ellos comparten características únicas. La teoría más aceptada hasta el momento es aquella que propone que las primeras células se desarrollaron como complejos de moléculas, luego de un largo proceso de evolución química. Fue elaborada por el bioquímico ruso Alexander Oparin y el biólogo inglés John Haldane, y ha recibido el nombre de **teoría quimiosintética** o de la **síntesis prebiótica**.

Existen actualmente otras explicaciones científicas acerca del origen de la vida. La **hipótesis de la panspermia** sostiene, que los primeros organismos en la Tierra habrían llegado como esporas* desde el espacio exterior, tal vez en meteoritos o cometas. Según este abordaje, la vida no procedería directamente de nuestro planeta. Las evidencias que la apoyan son la capacidad que tienen algunas bacterias de vivir en condiciones extremas, y el hallazgo de materia orgánica en los cometas y en el meteorito ALH84001. Este meteorito, proveniente de Marte y hallado en la Antártida, contiene formaciones en su interior que podrían haber sido originadas por formas de vida microscópicas. Sin embargo, es una evidencia dudosa, ya que estas estructuras podrían ser resultado de una contaminación terrestre.

Glosario

espora: estructura de resistencia que puede sobrevivir por largos períodos en condiciones adversas.

Actividades

1. Sinteticen qué plantean las cuatro explicaciones sobre el origen de la vida estudiadas en este capítulo.
 2. Aclaren cuál o cuáles son actualmente aceptadas por los científicos y cuáles no.
 3. Averigüen si existen otras explicaciones sobre el origen de la vida y anótenlas en la carpeta.

El diseño experimental

Los experimentos que refutaron la teoría de la generación espontánea tenían ciertas características especiales, necesarias para que los resultados obtenidos fueran confiables. Por ejemplo, Pasteur no solo controló las condiciones de esterilidad, sino que además utilizó diferentes caldos nutritivos para asegurarse de que sus observaciones finales no dependieran del medio de cultivo con el cual realizaba el experimento. La estructura que debe tener un experimento para que los resultados obtenidos nos permitan decidir si nuestra hipótesis es válida, se llama **diseño experimental**.

El primer paso para diseñar un experimento es definir con qué variables se va a trabajar. Llamamos **variables** a los atributos de los objetos, cosas o seres que pueden medirse, y cuyos valores varían de una situación a otra, por ejemplo, el color, el peso, la temperatura o el tiempo. Una vez planteada la hipótesis que se quiere probar, los investigadores deciden qué variables se manipularán, cuáles se medirán y qué condiciones deberán mantenerse **constantes**. Por ejemplo, si se desea estudiar cómo la luz afecta el crecimiento de las plantas, podríamos plantear la hipótesis: "Las plantas expuestas a baja intensidad lumínica desarrollan menos hojas nuevas que las expuestas a altas intensidades". Luego haríamos un experimento en el que colocaríamos cinco plantas a una intensidad de luz alta, cinco bajo una luz más tenue y otras cinco en oscuridad. Al cabo de un mes, contaríamos cuántas hojas nuevas desarrolló cada planta. En este caso, la **variable que manipulamos** es la luz, y la **variable respuesta** que se midió es la cantidad de hojas nuevas. Las condiciones que se tienen que haber mantenido constantes son la temperatura, la humedad, el tipo de planta, la cantidad inicial de hojas por planta, etcétera. Lo que se busca entonces en un experimento es analizar cómo los cambios de una condición que podemos controlar (la variable manipulada) afectan a otra, que es la que nos interesa (la variable respuesta).

En el experimento propuesto se utilizaron cinco plantas para cada intensidad lumínica. Si trabajáramos con una única planta en cada caso, y una de ellas muriera en el medio del experimento, no podríamos saber a qué se debe. Para obtener resultados confiables no basta con realizar una única repetición. Estas repeticiones se denominan **réplicas**, y deben ser lo más parecidas entre sí. En el ejemplo anterior, se trabajó con cinco réplicas para cada intensidad lumínica.

Actividades

1. La experiencia de Redi tiene un diseño experimental sencillo, que merece la pena ser analizado.
 - a. ¿Cuáles son las variables que se manipularon, la variable respuesta y las condiciones que se mantuvieron constantes en el experimento?
 - b. Propongan otras variables que se podrían haber manipulado en este experimento.
 - c. ¿Piensan que Redi trabajó solamente con tres frascos? ¿Por qué?
 - d. Expliquen por qué los resultados obtenidos por Redi permitieron refutar la teoría de la generación espontánea.



Grupos de cinco plantas expuestos a distintas intensidades lumínicas.

Louis Pasteur

Químico francés considerado el padre de la microbiología. Hizo importantísimas contribuciones a la Química, la Biología y la Medicina. Inventó los procesos de esterilización por calor y de “pasteurización”, que se emplean para disminuir la cantidad de microorganismos (actualmente muy utilizado en la industria alimenticia). También propuso que algunos microorganismos son la causa de enfermedades y sentó las bases para el desarrollo de las vacunas.

Corría el año 1864, y las discusiones científicas sobre la generación espontánea de los microorganismos eran tan intensas que la Academia de Ciencias de París ofreció un premio para quien pudiera demostrarla o refutarla. El ganador fue Louis Pasteur, que desarrolló una inteligente variación de los experimentos anteriores llevados a cabo por John Needham (1713-1781) y Lazzaro Spallanzani (1729-1799). En ese momento aún se desconocían las técnicas de esterilización, pero Pasteur pensaba que la aparición de microorganismos en los caldos nutritivos se debía a que los microorganismos contaminaban el líquido y se reproducían en dicho medio. Dedujo que si se evitaba que los microorganismos llegaran al caldo, se impediría su desarrollo. Para demostrarlo, realizó su famosa experiencia, que relata así:

“En distintos frascos de vidrio coloqué, separadamente, líquidos muy alterables* cuando están en contacto con el aire: agua de levadura de cerveza con azúcar, orina,

jugo de remolacha y agua de pimienta. Luego procedí a doblar el cuello de los frascos a la llama, que así quedan curvados en varios sectores. Después herví el contenido de los frascos, de tal forma que el vapor salió por el extremo del cuello de los matraces*. Dejé enfriar y observé al cabo de algunos días que los líquidos no se alteraban. Esto ha dejado sorprendidos a los partidarios de la generación espontánea [...]”.

“Si se corta el cuello de uno de estos matraces con una lima, al cabo de pocos días comienzan a aparecer microorganismos, tal como sucede al trabajar al aire libre. Esto demuestra que los microorganismos son transportados por el aire, y que si en su recorrido encuentran obstáculos –como el cuello doblado del matraz– no logran avanzar para hacer contacto con el líquido. En las soluciones nutritivas esterilizadas –que no están en contacto con el aire– no prosperan los microorganismos [...]”.

Glosario

- líquido muy alterable:** caldo nutritivo o medio de cultivo.
- matraz:** frasco de vidrio con base esférica, y cuello recto y estrecho.

Actividades

1. Elaboren la posible hipótesis que Pasteur puso a prueba con su experiencia.
2. ¿Para qué dobló el cuello de los matraces? ¿Por qué hirvió el contenido de los frascos?
3. En su experiencia, Pasteur incluyó además matraces a los que aplicó el mismo procedimiento, pero no les dobló el cuello. Luego de un tiempo, encontró que en los caldos nutritivos de su interior crecían microorganismos. ¿Para qué habrá incluido estos
4. ¿Cuáles son las variables que se manipularon, la variable respuesta y las condiciones que se mantuvieron constantes en el experimento de Pasteur?
5. ¿Cuáles son las conclusiones que pueden elaborarse a partir de los resultados obtenidos por Pasteur en su experimento? ¿Refutan o verifican la teoría de la generación espontánea?

Las condiciones prebióticas

Resulta importante no confundir el origen de la vida en la Tierra con el origen de la Tierra en sí. Para tratar de comprender cómo se pudo haber formado el universo, el físico George Gamow planteó en 1948 la teoría del *Big Bang* o de la “gran explosión”. Esta teoría explica que hace aproximadamente 13.810 millones de años, el universo se habría formado luego de que ocurriera una gran explosión o *Big Bang* a partir de un punto donde se encontraba concentrada toda la materia y energía. A partir de esta gran explosión, el universo comenzó a expandirse y se cree que esta expansión continúa hoy en día. Es decir, que desde ese momento se comenzó a crear el espacio. Luego de este acontecimiento, como consecuencia del descenso de la temperatura del universo y de la acción de la gravedad, se formaron partículas de materia que fueron agrupándose para formar galaxias, estrellas y nubes de gas y polvo, de las cuales surgieron los planetas y otros astros.



El universo tal cual lo conocemos en la actualidad.

La Tierra primitiva

Hace unos 4.600 millones de años, cuando se formó nuestro planeta, las condiciones eran muy distintas a las que hoy conocemos. El planeta Tierra era una masa de roca fundida que se encontraba a una temperatura cercana a 1.500 °C. A estas elevadas temperaturas, los materiales que la formaban se encontraban fundidos, es decir, en estado líquido. Los elementos más pesados, como el hierro y el níquel, se sumergieron y llegaron a su centro, y de esta manera dieron origen al **núcleo**. Los elementos más livianos, como el sílice, el magnesio, el aluminio y el oxígeno, se combinaron y formaron lo que hoy conocemos como el **manto** y la **corteza terrestre**. Su **atmósfera** estaba formada por gases que hoy en día no están presentes y que resultarían tóxicos para la mayoría de los seres vivos. Los rayos del Sol producían una intensa radiación ultravioleta que alcanzaba la superficie terrestre, sobre la que además impactaban meteoritos, que dejaron numerosos cráteres. Para completar el panorama, también había **intensa actividad volcánica** debido a que las rocas se encontraban fundidas por la elevada temperatura. Esto último, como veremos a continuación, resultaría clave para la formación de los primeros seres vivos.



Volcán en erupción.

Actividades

1. Confeccionen una lista de los gases que salían de los volcanes. Averigüen qué gases están presentes en la atmósfera actual y armen otra lista. Comparen ambas composiciones.
 - a. ¿Qué diferencias encuentran?
2. Copien y completen, en la carpeta, el siguiente cuadro.

	Universo	Tierra
Tiempo aproximado		
Explicación sobre su origen		

Curiosidades ►

Se cree que hace 4.330 millones de años, la Luna se pudo haber formado como consecuencia de un choque de la Tierra con un planeta del tamaño de Marte, llamado Tea. Parte de su masa se fundió con la de la Tierra, por lo que aumentaron su tamaño y su gravedad. El resto de los fragmentos salieron despedidos y formaron un anillo de asteroides alrededor de nuestro planeta. Con el tiempo, se agruparon y condensaron hasta formar la Luna.


Glosario

agregado molecular: agrupación de moléculas que funcionan como un conjunto sin llegar a estar unidas. **precursor:** entidad que antecede o que significa el primer paso hacia la formación de algo más complejo.



Alexander Oparin (1894-1980)

Bioquímico ruso. Estudió en Moscú, donde posteriormente sería profesor de Fitofisiología y Bioquímica. En 1935, junto con Bakh, fundó y organizó el Instituto Bioquímico de la Academia de Ciencias de la URSS, que dirigió desde 1946 hasta su muerte.



John B. S. Haldane (1892-1964)

Biólogo y genetista evolutivo inglés. Estudió en Eton y la Universidad de Oxford, en la que ingresó para estudiar Matemáticas y Biología. Se desempeñó como uno de los fundadores de la genética de poblaciones. Fue investigador de Bioquímica en la Universidad de Cambridge y profesor de Genética y Biometría en Londres.

La teoría quimiosintética

El bioquímico ruso Alexander Oparin y el biólogo inglés John Haldane propusieron a comienzos del siglo xx que la vida pudo haber surgido a partir de una evolución química desde moléculas muy simples que se encontraban en nuestro planeta en sus comienzos. A partir de reacciones químicas sencillas, con el paso del tiempo fueron formando moléculas cada vez más complejas, que dieron origen a los primeros agregados moleculares*. Estos agregados, luego de millones de años habrían dado lugar a las primeras protocélulas o células primitivas, muy diferentes en su aspecto y funcionamiento de las que conocemos actualmente.

Origen de las primeras moléculas orgánicas

Como vimos anteriormente, cuando se formó la Tierra había una gran actividad volcánica. Se cree que los volcanes, además de expulsar lava, liberaban moléculas inorgánicas en forma de gas, como vapor de agua, amoníaco, metano, dióxido de carbono, hidrógeno, nitrógeno y sulfuro de hidrógeno. Su acumulación alrededor de la Tierra, por efecto de la fuerza de gravedad, habría originado una **atmósfera primitiva**. Esta atmósfera era muy diferente a la actual y carecía de oxígeno.

Según la teoría quimiosintética, los gases de la atmósfera primitiva habrían comenzado a combinarse entre sí por efecto de la energía proveniente de la radiación ultravioleta (UV), y habrían formado las **primeras moléculas orgánicas** sencillas, que contenían mayor cantidad de átomos que las de los gases inorgánicos. Lentamente, luego de millones de años, la temperatura del planeta comenzó a descender, lo que provocó que el vapor de agua que se encontraba en la atmósfera primitiva se condensara y precipitara. Dicha precipitación de agua líquida sobre la superficie terrestre habría formado los **océanos primitivos**. Las moléculas orgánicas sencillas de la atmósfera habrían sido “arrastradas” por la acción de las lluvias, formando parte de las grandes masas de agua. A partir de estas moléculas orgánicas sencillas se habrían formado moléculas cada vez más complejas, que habrían sido las **primeras biomoléculas**. Así, se habrían originado los primeros monosacáridos, ácidos grasos, aminoácidos y nucleótidos. A su vez, estas biomoléculas pequeñas, o monómeros, se habrían unido formando cadenas, o polímeros, como las proteínas. A esta enorme masa de agua que contenía gran cantidad de moléculas orgánicas sencillas y biomoléculas, Oparin le dio el nombre de **caldo primitivo**. Este caldo primitivo habría sido fundamental para la aparición de agregados moleculares muy simples, llamados **protobiontes** o **coacervados**. Según la teoría, estas estructuras se habrían vuelto más complejas y adquirido nuevas funciones durante un largo tiempo (aproximadamente 1.000 millones de años), lo que dio origen a las primeras células. Por este motivo, los coacervados son considerados los precursores* de las primeras células.

Actividades

1. ¿Cómo se formaron las primeras moléculas orgánicas?
2. ¿Por qué fue fundamental la condensación del agua en la formación de las primeras biomoléculas?


Formación de los protobiontes o coacervados

Para explicar cómo se formaron los coacervados, Oparin propuso que las biomoléculas que se encontraban en el caldo primitivo, como las proteínas y los lípidos, se habrían agrupado formando una capa continua. Esta capa se habría cerrado sobre sí misma originando pequeñas esferas huecas que encerraban agua del caldo primitivo en su interior. Estos agregados moleculares, o coacervados, son considerados por la teoría quimiosintética como el paso de transición entre las biomoléculas y las primeras células. No solo habrían tenido una composición química similar a la de los seres vivos, sino que además habrían presentado algunas de sus características.


La envoltura o membrana de los coacervados habría delimitado un medio interno, independiente del exterior. Así se habría creado dentro de ellos un espacio donde ocurrían reacciones químicas diferentes de las que tenían lugar en el caldo primitivo. Por ejemplo, algunas de las biomoléculas simples o monómeros se habrían agrupado para formar nuevos polímeros, como los ácidos nucleicos y el almidón. Estos nuevos polímeros habrían contribuido a que su forma fuera cada vez más compleja.

Otra de las reacciones que debe haber ocurrido en el interior de los coacervados es la descomposición de las moléculas complejas en otras más simples para obtener energía. Es decir, habrían presentado un tipo de **metabolismo muy simple**. Dicha característica les habría permitido aumentar de tamaño y, como consecuencia, es probable que se fragmentaran y originaran coacervados más pequeños.


La **membrana de los coacervados** también habría sido fundamental para el intercambio de moléculas con el exterior. Algunas sustancias del caldo primitivo habrían podido atravesarla y así ingresar al interior del coacervado. Otras moléculas habrían podido salir de este hacia el exterior. Sin embargo, este intercambio habría sido desorganizado y mucho menos complejo que el de una célula. Es por eso que los coacervados no habrían podido autorregular su medio interno de manera efectiva.



Esquema de los eventos de evolución molecular que dio origen a los coacervados, según la teoría de Oparin y Haldane.



Esquema que sugiere cómo pudieron haber sido las membranas de los coacervados.



Esquema que muestra el metabolismo interno de los coacervados que les permitió formar los primeros polímeros.

Actividades

1. Los coacervados son considerados los precursores de las primeras células porque presentaban algunas de sus características, mientras que otras habrían estado ausentes en ellos.

- ¿Qué características de los seres vivos presentaban los coacervados?
- ¿Qué características de los seres vivos no habrían estado presentes en los coacervados?

Actividades experimentales

Simulación de la formación de coacervados en el laboratorio

Los coacervados, según la teoría quimiosintética, son esferas microscópicas que se formaron a partir de proteínas y lípidos que estaban presentes en el caldo primitivo. Estas estructuras muy simples darían origen a las primeras células luego de millones de años. El objetivo de esta actividad experimental es fabricar coacervados en el laboratorio a partir de materiales de uso cotidiano.

Necesitan:

- ▶ 2 pipetas de 5 mL
- ▶ 3 pipetas Pasteur de plástico de 1 o 2 mL
- ▶ 3 mL de solución de goma arábiga al 6,7%
- ▶ 5 mL de solución de gelatina al 1%
- ▶ 1 tubo de ensayo en una gradilla
- ▶ 1 propipeta
- ▶ unas gotas de solución de ácido clorhídrico (HCl) al 3,6%
- ▶ unas gotas de azul de metileno
- ▶ 3 tiritas de papel pH
- ▶ un microscopio
- ▶ 3 portaobjetos y 3 cubreobjetos

Paso 1. Tomen con la propipeta 5 mL de la solución de gelatina utilizando la pipeta de 5 mL, y transfírenla al tubo de ensayo. Con la otra pipeta de 5 mL, coloquen en el mismo tubo los 3 mL de solución de goma arábiga. Mezclen vigorosamente y midan el pH de la solución.

Paso 2. Tomen una gota del contenido del tubo con una pipeta Pasteur de plástico y colóquenla sobre un portaobjetos. Cubran la gota con el cubreobjetos, de modo que no quede líquido por fuera de sus bordes. Observen el preparado

que hicieron al microscopio. Esquematicen sus observaciones en la tabla de resultados que se presenta en el paso 6.

Paso 3. A la mezcla anterior, agréguelo lentamente 4 gotas de la solución de HCl, utilizando una pipeta Pasteur de plástico limpia. Agiten de manera continua hasta que la mezcla se vuelva turbia. Midan el pH.

Paso 4. Elaboren un preparado microscópico temporal siguiendo el mismo procedimiento explicado en el paso 2. Obsérvenlo al microscopio. Esquematicen sus observaciones en la tabla de resultados.

Paso 5. Al tubo anterior, adicionenle una gota de azul de metileno utilizando una pipeta Pasteur de plástico limpia, agiten vigorosamente y observen al microscopio. Esquematicen sus observaciones en la tabla de resultados.

Paso 6. Completén el siguiente cuadro.

	Solución de goma arábiga y gelatina	HCl	Azul de metileno
Esquematización			
Aumento			
pH			
Forma			
Distribución			

1. Respondan las siguientes preguntas.

- ¿Qué son los coacervados?
- ¿Qué efecto tiene el pH en la formación de los coacervados?
- ¿Ingresó el azul de metileno al coacervado? ¿A qué se debe esto?




Experiencia de Miller y Urey

En 1953, los químicos estadounidenses Stanley Miller y Harold Urey llevaron a cabo la construcción de un modelo en el laboratorio para recrear las condiciones de la Tierra primitiva y poder poner a prueba cómo se habrían formado las primeras moléculas orgánicas que habrían dado origen a las primeras células. Para ello, Miller construyó un dispositivo que constaba de un matraz con agua caliente (el caldo primitivo propuesto por Oparin) que liberaba vapor de agua, el que ingresaba a otro matraz en el que se encontraban los gases que componían la atmósfera primitiva (amoníaco, nitrógeno, metano, hidrógeno, entre otros) y que a su vez estaba conectado a dos electrodos que simulaban la intensa radiación UV que azotaba la Tierra en sus inicios. Dentro del matraz con los electrodos ocurrían combinaciones entre los gases, y el vapor de agua seguía su camino arrastrándolas. A medida que salía del matraz se encontraba con las paredes frías de un condensador, que provocaba que el vapor de agua condensara y pasara al estado líquido. El condensador simulaba el descenso de la temperatura del planeta. El agua, ahora en forma líquida, descendía y era recolectada en un recipiente para ser analizada. Al analizar la mezcla al microscopio, Miller encontró que se habían formado **aminoácidos**, que son las moléculas complejas que componen las membranas de las células actuales.

Esta experiencia logró demostrar que es posible la formación de moléculas complejas a partir de moléculas simples gracias a las condiciones que reinaban en la Tierra hace 3.600 millones de años.


Actividades

1. Respondan las siguientes preguntas.
 - a. ¿Qué intentaban poner a prueba en su experiencia Miller y Urey?
 - b. ¿Qué encontraron en las muestras que recolectaban? ¿Por qué creen que lo que hallaron fue una evidencia para dar apoyo a la teoría químicosintética?



Modelo experimental que utilizaron Miller y Urey en sus experimentos.

Origen de las primeras células



Esquema que sugiere cómo podrían haber evolucionado las primeras células a partir de un coacervado.

No se sabe a ciencia cierta cómo se formaron las primeras células a partir de los coacervados. Los científicos suponen que este largo proceso llevó aproximadamente 1.000 millones de años. Durante ese tiempo, los coacervados se volvieron cada vez más complejos y fueron adquiriendo nuevas funciones. Las estructuras resultantes de este largo proceso evolutivo y que tuvieron todas las características de los seres vivos, fueron las **primeras células**. Estas células debieron de haber sido muy parecidas a las células más simples que existen en la actualidad: las bacterias.

Todas las células poseen **material genético**, un tipo de ácido nucleico, el ADN, que cumple dos funciones fundamentales para la vida. Por un lado, guarda la información para controlar las reacciones químicas que ocurren dentro de la célula. Por otra parte, tiene la capacidad de hacer copias de sí mismo para que esta información sea transmitida a sucesivas generaciones. Es decir, el material genético es indispensable para garantizar la reproducción. Por tal motivo, uno de los pasos fundamentales para la aparición de las primeras células fue la formación de este material genético dentro de los coacervados.

Paralelamente, las **membranas** de los coacervados se fueron volviendo cada vez más especializadas hasta que lograron regular el intercambio de sustancias. Las membranas tienen una composición química especial, con moléculas que permiten reconocer señales externas y otras que posibilitaron regular el paso de ciertas sustancias. Esto habría permitido una autorregulación interna, que le habrían garantizado cierta estabilidad. La formación de membranas fue el paso previo a la capacidad de responder ante los estímulos externos o irritabilidad.

Finalmente, dentro del coacervado se habrían originado **proteínas especializadas**, capaces de cumplir funciones específicas dentro de su medio interno y habrían sido las encargadas de llevar a cabo los procesos metabólicos simples. Es decir, con el paso del tiempo habrían adquirido un verdadero metabolismo.

Actividades

1. ¿Qué características tenían los coacervados para suponer que pudieron ser los que dieron origen a las primeras células?
2. ¿Cuál fue el evento fundamental para que los coacervados dieran origen a las primeras células?
3. Completen las líneas punteadas con el término correcto. Las moléculas inorgánicas, entre ellas el que eran expulsadas por la actividad volcánica, se acumularon alrededor de la Tierra por efecto de la fuerza de la gravedad, y formaron la Por efecto de la intensa radiación UV, estas moléculas se y dieron lugar a sencillas. A medida que descendió la temperatura del planeta, el condensó y arrastró las moléculas al

Estas moléculas orgánicas sencillas se dando lugar a, entre ellas, proteínas y lípidos. Las proteínas y los lípidos se agruparon formando una capa continua, que se habría cerrado sobre sí misma. Así se originaron pequeñas esferas huecas que encerraban agua del caldo primitivo en su interior. A estas estructuras, Oparin las llamó Estos agregados moleculares son considerados por la teoría quimiosintética como el paso de transición entre las biomoléculas y las No solo habrían tenido una composición química similar a la de los seres vivos, sino que además habrían presentado algunas de sus Las primeras células presentaban ciertas características, ausentes en los coacervados, entre ellas un verdadero y

Evolución de las formas de nutrición de los primeros seres vivos


Para que las células pudieran cumplir todas sus funciones, necesitaban energía. Se sabe actualmente que las moléculas orgánicas poseen energía acumulada en las uniones entre los átomos de carbono. Cuando se rompen las uniones entre los átomos de las moléculas, la energía se libera y queda disponible. Se cree que los primeros seres vivos, las bacterias, adquirían energía rompiendo moléculas orgánicas que incorporaban del medio externo. Entonces, las primeras células se habrían alimentado de moléculas orgánicas que estaban presentes en el caldo primitivo, por eso eran **heterótrofos**. Estas primeras células vivían en una atmósfera primitiva sin oxígeno, es decir, no requerían de este gas para poder respirar, eran **anaeróbicas**. El oxígeno es necesario para la mayoría de los seres vivos actuales, ya que lo utilizan en el interior de sus células para extraer la energía del alimento. Estos organismos que requieren oxígeno para respirar se llaman **aeróbicos**.

Durante muchísimo tiempo, estas bacterias que se alimentaban de moléculas orgánicas presentes en el caldo primitivo, eran los únicos habitantes en nuestro planeta. Con el paso del tiempo, estos organismos sufrieron cambios en la manera en que guardaban la información en su molécula de ADN. Gracias a estos cambios surgieron otras formas de alimentarse. Algunos de ellos lograron fabricar su propia materia orgánica a partir de la energía que obtenían de degradar compuestos inorgánicos. Estos organismos recibieron el nombre de **autótrofos quimiosintéticos**.


Con el paso del tiempo, durante los 3.500 millones de años que transcurrieron desde que apareció la vida, siguieron ocurriendo cambios en las moléculas de ADN, y algunos organismos adquirieron la capacidad de utilizar la luz del sol como fuente de energía para combinar moléculas inorgánicas y formar moléculas orgánicas que serían su fuente de alimento. Es así como surgieron los primeros organismos **autótrofos fotosintéticos**. Por medio de la fotosíntesis, estos organismos no solo utilizaban los minerales disponibles del medio, sino que también adquirieron la capacidad de utilizar el dióxido de carbono del aire como fuente de carbono para formar las moléculas orgánicas. Como consecuencia de este proceso, estos organismos liberaban oxígeno a la atmósfera. Como estos organismos empleaban dióxido de carbono para formar sus moléculas orgánicas, y liberaban oxígeno, la cantidad de dióxido de carbono en el aire comenzó a descender y la cantidad de oxígeno comenzó a aumentar. Luego de millones de años, la atmósfera se volvió rica en oxígeno y los organismos que utilizaban moléculas orgánicas para alimentarse empezaron a hacerlo en presencia de este gas, y es así como aparecieron los **heterótrofos aeróbicos**.

Actividades


1. ¿Qué relación encuentran entre la evolución de las formas de nutrición y la creación de una atmósfera oxigenica?



Transformaciones de la materia en la fotosíntesis, proceso por el cual los organismos autótrofos producen su alimento.




Transformaciones de la materia en la respiración aeróbica.



Cuadro sinóptico que muestra los distintos tipos de nutrición de los primeros seres vivos.

De las primeras células a los organismos complejos



A partir de las primeras células se originaron todos los demás seres vivos.

Glosario

sustrato: superficie sólida sobre la que vive un organismo.

Para conocer más

Aljanati, D., Wolovelsky, E., Tambussi, C., *Los códigos de la vida*, Buenos Aires, Ediciones Colihue, 1999.
Audesirk T., Audesirk, G., *Biología. La vida en la Tierra*, México, Prentice-Hall, 2008.
Cervino, C., Jerusalinsky D., *Características de los seres vivos*, Buenos Aires, Oficinas de publicaciones del CBC, 1995.
Curtis, H., Barnes, S., Schnek, A., Massarini, A., *Curtis Biología*, Madrid, Editorial Médica Panamericana, 2008.

Actividades

1. Expliquen por qué las primeras células son los antepasados de las bacterias, las plantas, los cocodrilos y también los mosquitos.

Los primeros seres vivos que habitaron la Tierra fueron células muy simples que se habrían originado en los mares hace aproximadamente 4.000 millones de años. A partir de estos microorganismos, y luego de muchísimos años de evolución, se generaron otras formas de vida más complejas. Este proceso dio como resultado todos los organismos que conocemos en la actualidad, y también a los extintos. El hecho de que todos los seres vivos hayan tenido un antepasado en común (las primeras células) explica por qué todos ellos comparten características tan particulares.

Las primeras células tenían una organización básica, como la que presentan las bacterias. En este tipo de células, llamadas **procariotas**, el material genético se encuentra en contacto con el medio interno, ya que no hay una membrana interna que lo separe. La complejización de esta organización interna fue uno de los eventos más importantes en la historia de la vida en la Tierra. Se estima que las primeras células con divisiones internas aparecieron hace 2.100 a 1.800 millones de años. Estas células, con membranas internas que delimitan tanto el material genético como otros subespacios en los que se cumplen funciones específicas, reciben el nombre de **eucariotas**. Todos los organismos complejos que ustedes conocen, desde una planta hasta un mosquito o un caballo, están formados por células eucariotas.

Durante más de 3.000 millones de años, todos los seres vivos que habitaban nuestro planeta eran unicelulares, hasta que hace aproximadamente 1.000 millones de años surgieron los primeros organismos multicelulares. Existen rocas marinas de esa época que contienen rastros fósiles de seres vivos con forma de gusano y otros que podrían haber sido los antepasados de las primeras algas. La **multicelularidad** ofrece importantes ventajas para la supervivencia. Los organismos multicelulares pueden alcanzar mayores tamaños, y evitar más eficientemente a sus predadores. También pueden organizar mejor el trabajo y dividir las funciones entre distintos tipos de células. Esta especialización permitió a los organismos multicelulares desarrollar nuevas características, que les posibilitaron adaptarse a nuevas condiciones. Por ejemplo, las primeras algas que lograron vivir en la tierra tenían células especializadas para adherirse a su **sustrato***, y otras se especializaban en realizar la fotosíntesis. A partir de estos primeros organismos multicelulares simples se originaron otros más complejos: las plantas, los animales y los hongos.

Luego de alrededor de 3.500 millones años de vida exclusivamente acuática, algunos invertebrados y algas marinas multicelulares desarrollaron características que les facilitaron vivir en el ambiente aeroterrestre. Este nuevo hábitat ofrecía numerosos desafíos, pero también había recursos para quien pudiera sobrevivir en él. Fue allí donde ocurrieron nuevos procesos evolutivos que dieron origen a todos los demás organismos terrestres, como el ser humano.

Conviene recordar que las células procariotas, descendientes directos de esas primeras células primitivas, aún habitan nuestro planeta. Paralelamente a los eventos ya descriptos, estos organismos unicelulares dieron origen a nuevos procariotas, algunos de los cuales conquistaron la tierra. Junto con los organismos eucariotas unicelulares, que siguieron su propio camino evolutivo, hoy constituyen la gran diversidad de microorganismos de la Tierra.

La amenaza de Andrómeda


La amenaza de Andrómeda (*The Andromeda Strain*) es una novela de ciencia ficción escrita por Michael Crichton. Fue publicada en 1969 y llevada al cine con el mismo nombre dos años después.

La novela trata de la llegada a la Tierra de una forma de vida microscópica a través de un satélite que regresa luego de una fallida misión espacial. Todos los habitantes del pueblo más cercano a la zona de aterrizaje mueren, excepto un bebé y un anciano. Los sobrevivientes y el satélite son entonces trasladados a un laboratorio subterráneo. Allí, un grupo de científicos comienza a estudiar al patógeno* extraterrestre, al que le dan el nombre de "Andrómeda".

Los investigadores realizan ensayos de laboratorio para caracterizar esta nueva forma de vida con el objetivo de neutralizarla y evitar que desencadene una catástrofe. Pero Andrómeda desarrolla la capacidad de degradar los materiales que la contienen y escapa del aislamiento...

El final de esta historia no será develado para que ustedes mismos puedan averiguarlo... Este relato no solo es sumamente atrapante, sino que además se describen en él ensayos reales de laboratorio. Si bien las novelas de Michael Crichton son de ficción, sus argumentos se basan en avances verídicos del mundo científico. Según el autor, su obra describe la historia de una crisis científica de cinco días en Estados Unidos, y la importancia de narrarla consiste en que los descubrimientos científicos tienen una fuerte incidencia en la vida social y política, y que en el futuro podrían desarrollarse crisis como las que se describen en el libro.


Edición de la novela *La amenaza de Andrómeda*.



Michael Crichton nació en Estados Unidos en 1942 y murió en el año 2008. Fue médico, escritor y cineasta. Es considerado el iniciador del estilo narrativo *techno-thriller*, en el que se combinan suspense, acción y un alto detalle de avances tecnológicos. Además de *La amenaza de Andrómeda*, es el autor de *Parque Jurásico*, *Acoso*, *Congo*, *Sol Naciente* y *El mundo perdido*. También fue el creador de la serie televisiva *ER Emergencias*.

Glosario

patógeno: agente biológico externo que es capaz de producir daño o algún tipo de enfermedad a otro organismo.



Película *La amenaza de Andrómeda*.

Actividades

1. ¿Qué características de los seres vivos se mencionan en el texto?
2. Esta forma de vida microscópica, ¿a qué tipo de organismo que conocen podría ser similar? Justifiquen.
3. ¿Con cuál de las aproximaciones teóricas sobre el origen de la vida pueden relacionar el relato? Justifiquen.
4. Miren la película basada en la novela, dirigida por

- Robert Wise en el año 1971, y detallen:
- a. técnicas de laboratorio que se utilizaron para caracterizar esta nueva forma de vida;
 - b. características de los seres vivos que pueden reconocer y las que están ausentes en esta forma de vida.
 5. Averigüen en qué contexto histórico fue publicada la novela.

Actividades finales

1. La siguiente tabla muestra los principales eventos transcurridos desde el inicio del universo hasta la aparición de los primeros humanos.

Tiempo (millones de años)	Evento
13.800	Big Bang.
4.550	Formación del planeta Tierra.
4.500	Formación de la Luna.
4.000	Primeras células (procariotas).
3.500	Inicio de la fotosíntesis.
2.300	La atmósfera se vuelve oxigénica.
2.100	Primeras células eucariotas.
1.000	Primeros organismos multicelulares.
500	Dominio de invertebrados. Primeros vertebrados.
400	Primeras plantas y vertebrados terrestres.
230	Aparición de los primeros dinosaurios.
2	Aparición de los primeros humanos.

Imaginen que la vida del universo fuera de un día, es decir, que el *Big Bang* ocurrió a las 0 horas y 0 minutos, y que el año 2016 corresponde a las 23 horas 59 minutos.

a. ¿En qué momento del día hubieran ocurrido los otros eventos que se mencionan en la tabla anterior? A modo de ejemplo, para calcular la hora de formación del planeta Tierra, dividimos su antigüedad por el total de millones de años transcurridos ($4.550/13.800$) y lo multiplicamos por las 24 horas que dura el día. Así se obtiene el número 7,91, que hay que pasar a escala sexagesimal: el resultado es 7 horas y 54 minutos.

2. Escriban si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). Reescriban las afirmaciones falsas para que resulten verdaderas.

- a. Las proteínas son moléculas orgánicas.
- b. El agua es un polímero compuesto por los monómeros hidrógeno y oxígeno.
- c. La teoría de la generación espontánea sostiene que todo ser vivo proviene de otro ser vivo.
- d. Las primeras células fueron procariotas.

- e. Los científicos afirman que la vida ha surgido en el caldo primitivo luego de un largo proceso de evolución química.

- f. Los científicos creen que las primeras células no utilizaban oxígeno.

- g. En las condiciones de la Tierra primitiva, ninguna célula hubiera podido sobrevivir.

- h. Según Oparin y Haldane, las primeras formas de vida se habrían originado en el espacio exterior.

- i. Miller aportó evidencias a favor de la teoría químico-sintética.

- j. Los coacervados tenían todas las características de los seres vivos.

3. El ántrax es una enfermedad infecciosa producida por la bacteria *Bacillus anthracis* que afecta a algunos animales, incluido el ser humano. Este microorganismo es aerobio y puede formar esporas, que le permiten dispersarse a largas distancias. Sus esporas son resistentes al calor, luz solar, sequía y a muchos desinfectantes. Una forma de destruirlas es exponerlas a una temperatura de 121°C durante un período de al menos 30 minutos. Esta bacteria ha adquirido mucha atención en los últimos años debido a que ha sido utilizada como arma por los bioterroristas y se puede convertir fácilmente en arma biológica como aerosol.

- a. ¿Qué característica de la bacteria permite que pueda ser utilizada como arma biológica?

- b. ¿Con cuál de las explicaciones sobre el origen de la vida pueden asociar esta característica? Luego de leer el texto, ¿piensan que es muy o poco probable que las esporas puedan resistir las condiciones extremas del espacio exterior?

- c. La exposición a 121°C durante un período de al menos 15 minutos se llama esterilización. ¿Qué científico sentó las bases para el desarrollo de este procedimiento?


- d. ¿Por qué piensan que en este caso debe exponerse a las esporas a tan alta temperatura durante 30 minutos en lugar de 15?

- e. Sabiendo que las esporas pueden crecer en medios de cultivo (caldo nutritivo), diseñen un experimento que permita probar la siguiente hipótesis: "Las esporas de las bacterias de *Bacillus anthracis* pueden eliminarse si se exponen a 121°C durante 20 minutos". Detallen qué variables manipularían, cuáles medirían como respuesta, qué condiciones deberían mantenerse constantes y qué resultados esperarían.



Origen de la biodiversidad

3



Contenidos

- > Origen histórico de la teoría evolutiva
- > El transformismo de Lamarck
- > La teoría de la selección natural de Darwin
- > Teoría del ancestro común
- > Adaptaciones

Las alas de las aves, la gruesa capa de grasa subcutánea del oso polar, las hojas delgadas y amplias de las plantas con las que captan gran cantidad de luz. Todas estas características de los seres vivos, que les permiten sobrevivir y reproducirse en los ambientes en los que habitan, parecen estar especialmente diseñadas. Durante muchos años se creyó que eran producto de la creación divina, y que no se modificaban a través del tiempo. Entonces, por ejemplo, ¿todos los perros que conocemos tienen un origen distinto o provienen de un mismo antepasado que vivió hace miles de años? ¿Qué información nos aportan los fósiles para conocer más sobre el origen de las especies actuales? ¿Por qué todos los seres vivos tenemos determinadas características en común? La teoría evolutiva permite dar una respuesta a todas estas preguntas, y explicar además cómo es posible que se haya originado en la Tierra la enorme variedad de seres vivos que habita en ella.

EN ESTE CAPÍTULO...

Se explica cómo se originaron las especies actuales a partir de las transformaciones de especies ancestrales.

Se desarrolla la teoría de la selección natural propuesta por Darwin, que explica los cambios de las especies en el tiempo, el origen de nuevas especies y las adaptaciones.

También se analiza por qué la biodiversidad es una consecuencia de la existencia de diversos ambientes.

Contenido digital adicional

[www.tintaf.com.ar/
NBIO1C3](http://www.tintaf.com.ar/NBIO1C3)



La diversidad biológica



Los pájaros, insectos y plantas epífitas son parte de la diversidad biológica visible que alberga un árbol urbano.

Curiosidades ▶

Methylacidiphilum fumariolicum es una bacteria que se encontró en un pozo de barro en un cráter volcánico de Italia, en el año 2007. Este microorganismo vive perfectamente a temperaturas de 50 a 60 °C, tolera condiciones tan ácidas como las que provoca el ácido sulfúrico concentrado y utiliza el gas metano como nutriente.

Si observamos los árboles de la cuadra en la que vivimos, podremos reconocer una gran cantidad de seres vivos que habitan en ellos. Seguramente primero distinguimos a las aves ubicadas en las zonas más altas, y algunas plantas que crecen adheridas, como enredaderas o claveles del aire. Si miramos con más detalle, encontraremos insectos, como las hormigas, o arañas, y tal vez algunos musgos o algas sobre la corteza. Y si tomáramos una muestra de las hojas, de la misma corteza o del agua que se pueda acumular sobre el árbol, veríamos (usando un microscopio) que también hay una gran variedad de microorganismos, como bacterias. Pero también hay otros seres vivos que habitan nuestra cuadra: el pasto y otras plantas que crecen en los canteros, los perros y gatos, junto con sus pulgas, nosotros y nuestros propios vecinos. Este conjunto de organismos constituye la diversidad biológica de nuestra cuadra, y es solo una muy pequeña porción de la enorme cantidad de seres vivos que alberga nuestro planeta. En sentido amplio, se llama **diversidad biológica** o **biodiversidad** a toda la variedad de formas de vida que se desarrolla en la Tierra e involucra a todas las especies de plantas, animales, hongos y microorganismos.

Las unidades que componen la biodiversidad son las especies. Existen diferentes especies de aves, de mosquitos, de árboles, de bacterias, de hongos y de todos los demás seres vivos. Las **especies** son grupos de poblaciones naturales con características muy similares que se entrecruzan, o potencialmente lo pueden hacer, y que dejan como descendencia organismos fértiles.

Un aspecto sorprendente de la biodiversidad es que puede encontrarse prácticamente en cualquier tipo de ambiente, desde los desiertos hasta el fondo de los océanos, incluidas zonas con condiciones tan extremas como los cráteres volcánicos. Todos los organismos tienen características especiales denominadas **adaptaciones** que les permiten sobrevivir y reproducirse en los ambientes en los que habitan.

¿Por qué los organismos poseen estas adaptaciones? ¿Cómo es posible que la increíble cantidad y diversidad de formas de vida de la Tierra comparta ciertas características? Para responder estas preguntas, no debemos imaginarnos a la biodiversidad como la foto de todo lo que vemos hoy en día, sino como una película. Esta película comenzó con las primeras células, hace casi 4 mil millones de años. Tuvo luego como protagonistas a especies que actualmente están extintas, como los dinosaurios, y siguió hasta la actualidad, con la biodiversidad como la conocemos hoy en día, y continuará... Hoy sabemos que la biodiversidad no es estática, sino que cambia a lo largo del tiempo, y que para comprenderla realmente no podemos ignorar su aspecto temporal.

Actividades

1. Respondan las siguientes preguntas.
 - a. ¿Qué es la biodiversidad? Mencionen diez organismos que sean parte de la biodiversidad que puede encontrarse en las orillas de un lago.
 - b. ¿Cuál es la relación entre biodiversidad y especie?
 - c. ¿Qué evidencias conocen que nos permiten saber que la biodiversidad no es estática, sino que fue cambiando a lo largo de la historia de la vida en la Tierra?

El fijismo de las especies

La idea de que la biodiversidad cambia con el tiempo es relativamente nueva y no fue siempre concebida de esa manera. Así como ocurriera con las explicaciones acerca del origen de la vida, durante la Edad Media (siglos v a xv) todos los fenómenos naturales se interpretaban a partir de los textos bíblicos. Se pensaba que los seres vivos eran la obra de la creación de Dios y que, una vez creados, los seres vivos no habían sufrido ningún tipo de modificación posterior. Esta concepción de los organismos como entidades estáticas a lo largo del tiempo recibe el nombre de **fijismo**.

El cuestionamiento de las explicaciones religiosas para los fenómenos naturales comenzó en el Renacimiento (siglos xv y xvi), época de transición entre el pensamiento medieval y el moderno. Muchos pensadores de esa época fueron perseguidos y condenados por pensar en forma diferente, como Galileo Galilei. Fue en el siglo xvii cuando tuvieron lugar las primeras investigaciones de los fenómenos naturales sobre bases científicas, con lo que se inició así la ciencia moderna. Novedosas ideas surgieron en esta época, desde la sustitución de la Tierra como centro del universo por el heliocentrismo*, hasta las primeras leyes sobre el movimiento, propuestas por Newton. El nacimiento de la Física, la Astronomía y las Matemáticas fue la base para que en el siguiente siglo (xviii) comenzaran los primeros estudios científicos sobre la vida.

Paralelamente a la pérdida de la imagen de un mundo sin cambios ni movimiento, los naturalistas del siglo xviii tuvieron a su alcance grandes cantidades de plantas y animales nuevos, que fueron recolectados en los viajes exploratorios alrededor del mundo. Fue inminente entonces la necesidad de ordenar estas colecciones, y establecer criterios para clasificar a todas las especies conocidas hasta el momento. En el año 1735, Carlos Linneo (1707-1778) publicó una obra, *Systema naturae*, en la que presentó el primer **sistema de clasificación formal** para los reinos vegetal y animal. El ordenamiento propuesto por este naturalista seguía un esquema jerárquico, con categorías superiores, como los reinos, que incluyen a otras inferiores, como los géneros y las especies. Linneo era fijista, ya que estaba convencido de que los organismos que él clasificó habían sido creados por Dios y permanecían inmutables desde ese entonces. Por eso, consideraba que el sistema que desarrolló reflejaba el plan divino de la creación.

El sistema de clasificación linneano fue tan útil que se sigue utilizando en la actualidad. Por otro lado, este primer ordenamiento de la biodiversidad permitió comparar a los distintos grupos de seres vivos, y fue la base sobre la cual se comenzó a pensar la historia de la vida en la Tierra.

Actividades


1. Respondan las siguientes preguntas.

- ¿Qué propone el fijismo acerca de los seres vivos?
- ¿En qué momento histórico comienza a cuestionarse el fijismo?
- ¿Cuál fue el aporte de Linneo para el estudio de la biodiversidad?
- ¿Pensaba Linneo que la biodiversidad sufría modificaciones a lo largo del tiempo? Justifiquen su respuesta.



Galileo Galilei (1564-1642)

Astrónomo y físico italiano. Es considerado el padre de la astronomía moderna. Construyó el primer telescopio astronómico. Fue condenado en el año 1633 por el Santo Oficio por su idea de que la Tierra se movía alrededor del Sol.



Portada de la décima edición de *Systema naturae*, publicada en el año 1758 por Linneo. En esta obra se establecen las bases para la clasificación actual de los animales.


Glosario

heliocentrismo: modelo astronómico según el cual la Tierra y los planetas se mueven alrededor del Sol.



Georges Louis Leclerc,
conde de Buffon (1707-1788)

Naturalista francés. Estudió Derecho en la Universidad de Dijon. En 1728 se trasladó a Angers para satisfacer su vocación, y allí estudió Medicina, Botánica y Matemática. En 1749 se publicó su famosa obra *Historia Natural (Histoire Naturelle)*.



Histoire Naturelle, la famosa obra del conde de Buffon.



Charles Lyell (1797-1875)
Geólogo escocés. Desarrolló la teoría de la uniformidad, que establecía que los procesos naturales que cambiaban la Tierra en el presente son los mismos que actuaron en el pasado. Realizó numerosas observaciones que incluyó en su obra *Principios de geología*, en la que refuta la teoría de las catástrofes como motor de los cambios geológicos.

Las primeras ideas transformistas de las especies

Las contribuciones del conde de Buffon, Hutton y Lyell

Uno de los primeros naturalistas en cuestionar el fijismo de las especies fue el francés George Louis Leclerc, más conocido como el conde de Buffon. Desarrolló su interés por la historia natural después de haber sido nombrado por Luis XV en 1739 como director del jardín *du Roi de París*. En ese entonces se propuso producir un catálogo de las especies de plantas, animales y minerales para una colección real. Su proyecto fue un tanto ambicioso y transformó su tarea en la creación de una historia completa de todos los animales, plantas y minerales de la naturaleza. En 1749 se publicaron los tres primeros volúmenes de su famosa obra *Historia Natural (Histoire Naturelle)*. Sin embargo, la importancia de la obra de Buffon no fue solo su carácter enciclopédista, sino que propuso que nuestro planeta habría sufrido procesos de cambio y transformación. Ligaba los procesos geológicos con los procesos básicos de la historia de la vida. Argumentaba que si bien la creación divina había provisto un número reducido de especies, estas se habrían ido transformando y diversificando a lo largo del tiempo. Es decir que los diferentes organismos existentes en la actualidad descienden de unas pocas formas preexistentes. A este tipo de pensamiento se lo conoce como **transformista**.

Uno de los problemas que enfrentaba el pensamiento transformista de las especies era la edad de la Tierra. Para ese entonces, los teólogos cristianos sostenían que la Tierra tenía aproximadamente 6.000 años de antigüedad ya que contaban las sucesivas generaciones desde la creación de Adán, según la Biblia. Resultaba fundamental establecer que la edad de la Tierra era muchísimo mayor, para admitir que las especies pudieron haber sufrido modificaciones a lo largo de millones de años. El geólogo escocés James Hutton (1726-1797) propuso mediante su teoría llamada **uniformista** que la Tierra habría sido formada por procesos lentos y graduales, como la acción del agua o los fenómenos climáticos, y que la superficie terrestre se hallaba en constante proceso de cambio. Respaldó su teoría con el hecho de que si las capas de rocas de miles de metros de espesor se hubieran formado mediante procesos naturales lentos, hubiera sido necesario que transcurrieran millones de años. El geólogo Charles Lyell refinó las ideas de Hutton y concluyó que el efecto lento, constante y acumulativo de las fuerzas naturales habría provocado un cambio continuo en la Tierra. En su obra *Principios de geología* llegó a afirmar que la Tierra se originó hace miles de millones de años. Este libro tuvo un profundo efecto en Charles Darwin, quien lo leyó durante su viaje.

Actividades

1. ¿Qué ideas aportaron Buffon, Hutton y Lyell?
2. ¿Por qué resultaba fundamental determinar la edad de la Tierra? ¿En qué evidencias se basaron Hutton y Lyell para determinar que la Tierra tenía miles de millones de años de antigüedad?



La teoría de Lamarck

A fines del siglo XVIII, las discusiones acerca de si las especies cambiaban a lo largo del tiempo y cómo lo hacían alcanzaron su máximo nivel. En 1801, un naturalista francés llamado Jean Baptiste de Monet, caballero de Lamarck, propuso una teoría. Lamarck dedicaba gran parte de sus investigaciones a los organismos unicelulares y a los animales invertebrados. Clasificó a los invertebrados desde las formas más simples a las más complejas. También estudió fósiles y observó que las formas más simples se encontraban en los estratos más antiguos, mientras que en los estratos más jóvenes se encontraban fósiles con formas más parecidas a las actuales. Propuso como teoría que todas las especies, incluido el ser humano, descienden de otras especies y que existía una fuerza en la naturaleza que obligaba a las especies a cambiar, desde formas vivas muy simples hacia más complejas.

Para explicar esta evolución, planteó la teoría de los **caracteres adquiridos** según la cual los seres vivos poseían una fuerza interna que los impulsaba a cambiar para poder adaptarse a los cambios que se producían en el ambiente. Aquellos órganos que se utilizaban con mucha frecuencia se desarrollaban más, y los que no se usaban tendían a atrofiarse y a desaparecer. Estos cambios en el cuerpo de los organismos que ocurrían durante sus vidas eran transmitidos a sus descendientes, y las crías nacían con esas nuevas características. Un ejemplo de esto es la descripción acerca del origen del cuello largo de las jirafas. Según esta teoría, las jirafas en un principio tenían cuellos cortos y se alimentaban de las hojas de las ramas más bajas. Como todas comían de esas mismas ramas, resultaba conveniente alcanzar las hojas de las ramas más altas. Las jirafas, con el afán de alcanzarlas, estiraban su cuello durante toda su vida y lograban estirarlo unos pocos centímetros. Como el cuello era un órgano que estaba siendo muy utilizado, se desarrollaba cada vez más. Las crías de estas jirafas heredaban las características que sus progenitores desarrollaban a lo largo de su vida, entonces nacían con el cuello más largo. Al cabo de varias generaciones, las jirafas fueron cambiando su aspecto y desarrollaron cuellos largos, que les permitieron alimentarse de las hojas de las ramas más altas. Como consecuencia de este proceso, el cuello largo de las jirafas actuales sería el resultado del estiramiento heredado de las jirafas ancestrales de cuello corto.




Jean-Baptiste de Monet de Lamarck (1744-1829)

Biólogo francés. Se formó en la carrera eclesiástica y luego se enroló en la infantería, que dejó por problemas de salud y se trasladó a París. Allí estudió Medicina y Botánica. Fue miembro de la Academia Francesa de Ciencias, trabajó en el *Jardin du Roi* hasta que se reconvirtió en el Museo Nacional de Historia Natural.

Actividades

1. Enumeren las ideas principales de la teoría de la evolución según Lamarck.
2. Expliquen, según la teoría de Lamarck, cómo los osos hormigueros pudieron haber desarrollado un hocico tan largo.



Secuencia del estiramiento del cuello de las jirafas durante sucesivas generaciones.

El gran aduersario de Lamarck: George Cuvier



George Cuvier (1769-1832), zoólogo francés, defensor del fijismo de las especies y opositor de las ideas evolutivas de Lamarck.

Glosario

Anatomía comparada: disciplina encargada del estudio de las semejanzas y diferencias de los cuerpos de los seres vivos.

Paleontología: ciencia que estudia los seres vivos que habitaron la Tierra en épocas pasadas y cuyos restos se encuentran en forma de fósiles.

Las ideas evolucionistas de Lamarck encontraron una fuerte oposición por parte de George Cuvier, un poderoso y reconocido científico de la época, considerado actualmente como el padre de la Anatomía comparada* y la Paleontología*. Como fuerte defensor del fijismo de las especies, sostenía que estas habían sido creadas por Dios y se mantienen sin modificaciones a lo largo del tiempo. Su estudio de los fósiles fue exhaustivo y le hizo descubrir que la Tierra había estado poblada por faunas muy diversas a lo largo del tiempo. Observó que los fósiles debían de ser muy antiguos al estar enterrados en estratos rocosos muy profundos y que mientras más hondo estuviera el fósil y más vieja fuera la roca, más difería de cualquier forma de vida actual. Para explicar este fenómeno, propuso la **teoría de las catástrofes**. De acuerdo con ella, a lo largo de la historia de la Tierra habrían ocurrido extinciones masivas provocadas por catástrofes universales, seguidas por la creación de una fauna nueva. Desde la perspectiva del catastrofismo, apoyaba la idea de que la edad de la Tierra solo debía rondar los 6.000 años de antigüedad, lo que difería de Charles Lyell, cuyo gradualismo requería millones de años. Cuvier sostenía que los cambios que proponía Lamarck tampoco habrían sido posibles en un lapso tan breve de tiempo.

Cuvier revolucionó las clasificaciones del reino animal basándose en la Anatomía comparada y rompiendo con la idea anterior de que todos los animales formaban una línea continua, desde los más simples hasta el ser humano. Para llevar a cabo esta clasificación, se fijó en la estructura interna del cuerpo del animal más que en las características externas. Uno de los principios que aplicó fue que todas las partes del cuerpo de un animal están relacionadas entre sí y forman un todo coordinado. Sostenía que el diseño eficiente de cada animal era la prueba de que este no podría haber variado desde su creación.

Cuvier fue un influyente y firme adversario de las teorías de la evolución y, con su brillante personalidad, llegó a destruir la carrera científica de Lamarck, a quien desestimó permanentemente.

Hoy en día se sabe que la Tierra tiene una antigüedad cercana a los 4.600 millones de años y se acepta que las especies van cambiando a lo largo del tiempo, lo que da lugar a otras especies. Si bien el mecanismo que propuso Lamarck sobre cómo ocurrían los cambios evolutivos en los seres vivos no es correcto, fue un adelantado para su época ya que hablaba de evolución y adaptaciones de los seres vivos, dos conceptos fundamentales para poder explicar la enorme diversidad de seres vivos que existe en nuestro planeta. Unos pocos años más tarde, Darwin y Wallace dieron una explicación de cómo opera el proceso evolutivo, que sería aceptada hasta la actualidad por la comunidad científica.

Actividades

1. ¿Quién fue el gran adversario de las ideas evolutivas de Lamarck? ¿Qué ideas sostenía este científico, que no coincidían con las de Lamarck? ¿Por qué logró desestimar a Lamarck?

El viaje de Darwin a bordo del *Beagle*

Casi medio siglo después de que Lamarck propusiera que los seres vivos no eran entidades estáticas, el debate entre transformismo y fijismo tuvo un nuevo gran protagonista: Charles Darwin. Las ciencias naturales eran muy populares en Inglaterra en el momento en que nació y, probablemente por esa razón, ya desde pequeño coleccionaba piedras, insectos y flores. A los 22 años recibió una oferta que cambiaría su vida y la de la historia de la Biología: embarcarse como naturalista a bordo del velero *Beagle*. La expedición duró 5 años e incluyó la exploración de las costas de Sudamérica, África y Oceanía. El objetivo principal de la expedición era recoger datos cartográficos*.

Durante el viaje, Darwin tuvo la oportunidad de observar una enorme cantidad de animales, plantas, fósiles y paisajes, cuyas características y distribución le generaron nuevas preguntas. Estas observaciones fueron detalladamente registradas en su diario, que luego publicaría en el año 1839 bajo el título de *El viaje del Beagle*. También recolectó gran cantidad de especies animales y vegetales, realizó investigaciones geológicas en Sudamérica y hasta descubrió una nueva especie de delfín. Las observaciones de Darwin durante la expedición estuvieron fuertemente influenciadas por un libro que estaba leyendo en ese momento: *Principios de la geología*, de Charles Lyell. En su trabajo, Lyell proponía que los paisajes de la Tierra son producto del efecto de procesos lentos y constantes que modifican su superficie, y que su edad era de millones de años y no de unos pocos miles. Darwin corroboró la hipótesis de Lyell con varias observaciones durante su viaje. Por ejemplo, en Cabo Verde descubrió que uno de los estratos blanquecinos elevados en la roca volcánica contenía restos de conchillas. Esto podía ser fácilmente interpretado, considerando que el relieve de ese lugar se había formado mediante surgimientos y hundimientos a lo largo de grandes períodos. De este modo, la experiencia de Darwin en la geología, ciencia a la que también hizo importantes aportes, fue crucial para sus posteriores explicaciones sobre los cambios de los seres vivos en el tiempo.




Mapa del mundo con el recorrido realizado por el *Beagle* entre los años 1831 y 1836.

Curiosidades ►

El velero *Beagle* pesaba 240 toneladas y llevó a bordo a 76 personas, entre ellos a Charles Darwin. Su salida del puerto de Plymouth estuvo postergada por más de un mes debido al mal tiempo.

Glosario

cartografía: disciplina que se ocupa de la elaboración, producción y estudio de los mapas.



Charles Darwin (1809-1882)

Naturalista inglés. Su obra más famosa, *El origen de las especies por medio de la selección natural*, fue publicada en 1859. Escribió otros trabajos sobre sus investigaciones botánicas y zoológicas, e incluso sobre evolución humana, como *El origen del hombre y de la selección en relación al sexo*.

Actividades

1. ¿A qué actividades se dedicó Charles Darwin durante el viaje en el *Beagle*? ¿Cuánto tiempo le llevaron y en qué lugares las realizó?
2. Expliquen cómo las ideas de Lyell influenciaron en las observaciones de Darwin durante su viaje.

Charles Darwin

Durante su viaje, Darwin observó la distribución espacial y temporal de algunas especies. A partir de estas observaciones elaboró su teoría de la evolución.

En la pampa argentina encontró restos fósiles de megaterios, toxodontes y gliptodontes, grandes mamíferos ya extinguidos, semejantes a los armadillos que vivían en el lugar. La relación geográfica y morfológica entre la fauna actual de la región y la extinta le llamó poderosamente la atención:

“[...] me había impresionado profundamente al descubrir en la formación de las pampas el parecido entre los grandes animales fósiles cubiertos por caparazón y los armadillos existentes. Era evidente que hechos como estos, al igual que muchos otros, podían explicarse bajo el supuesto de que las especies se modificaban gradualmente. El tema me obsesionó [...]”.

La sucesión espacial de especies muy similares a lo largo de Sudamérica fue otro de sus hallazgos. El reemplazo geográfico de un tipo de ñandú, el choique, por el ñandú común en el sur argentino, lo llevaron a pensar que las especies cambian a través del tiempo, y que este cambio luego se ve reflejado en el espacio.

En las islas Galápagos, en Ecuador, Darwin encontró un grupo de aves llamadas pinzones, y detectó que no todas eran iguales. Reconoció trece especies que diferían en el ambiente en el que vivían (desde las copas de los árboles hasta el suelo), en sus hábitos alimentarios (algunos eran herbívoros y otros, insectívoros) y en cada isla había especies diferentes. Estas especies no se encuentran en ningún otro lugar del mundo, excepto una de ellas, que vive en el continente más cercano, a 1.000 km de distancia. ¿Cómo explicó Darwin, posteriormente, esta distribución de los pinzones? Propuso que habían surgido a partir de un tipo ancestral, presente en el continente y que las variaciones entre las distintas especies se habrían ido acumulando con el tiempo al permanecer unas aisladas de las otras.



Restos fósiles de un gliptodonte, mamífero extinto hace más de 10.000 años. Estos animales medían entre 1,5 y 4 metros de largo, y podían pesar hasta 2.000 kg.



El armadillo es un mamífero que tiene un caparazón dorsal formado por placas. Mide entre 30 cm y 1,5 m. La especie más grande que vive en la actualidad, el armadillo gigante, puede superar los 60 kg de peso.



Actividades

1. ¿Qué diferencias y qué similitudes encuentran entre el gliptodonte y el armadillo?
2. ¿Cómo pueden explicar la similitud entre el gliptodonte y el armadillo?
3. ¿Cómo explicó Darwin la existencia de dos especies de ñandúes muy similares que habitan en regiones vecinas?
4. ¿Cómo explicó Darwin que en las islas Galápagos había trece especies diferentes de pinzones pero solo un tipo en el continente?

La teoría del ancestro común

A su regreso del viaje, Charles Darwin contaba con una amplia colección de animales y plantas, que analizaría durante los siguientes años. Los fósiles que había descubierto en las pampas argentinas, el reemplazo de animales relacionados a lo largo de Sudamérica y las características particulares de los pinzones de las Islas Galápagos fueron algunas de las observaciones que apoyaban su idea de la modificación gradual de las especies. Si bien compartió sus pensamientos con algunos naturalistas de la época, fue recién más de 20 años después, en 1859, cuando publicó su obra fundamental, *El origen de las especies por medio de la selección natural, o la preservación de las razas preferidas en la lucha por la vida*. Esta demora en la publicación no se debió a que el naturalista estuviera buscando una buena explicación a sus observaciones, sino a que utilizó todo ese tiempo para evaluar la confiabilidad de sus ideas.

Una de las hipótesis más importantes de su libro es que las especies se modifican gradualmente a través del tiempo a partir de un **antepasado o ancestro común**. Las especies que observamos en la actualidad están entonces relacionadas con otras que no existen hoy en día, pero cuya descendencia fue sufriendo modificaciones a lo largo de miles de generaciones hasta tener las actuales características. De este modo, Darwin explicó cómo los fósiles de gliptodontes encontrados en la pampa argentina serían restos de los ancestros de los actuales armadillos. Para el caso de los pinzones de las Islas Galápagos, las distintas especies encontradas en las islas habrían surgido a partir de una especie ancestral que vivió en el continente. Con el paso del tiempo, y debido al aislamiento, las poblaciones de pinzones de cada isla habrían ido teniendo descendencia con modificaciones particulares, hasta convertirse en diferentes especies luego de muchas generaciones. Los descendientes de la especie ancestral que vivía en el continente no habrían sufrido grandes cambios, y constituirían la especie de pinzón que Darwin encontró en el continente.

La hipótesis de Darwin de la **descendencia con modificación a partir de un ancestro común** es aceptada hoy en día ampliamente. Dada la gran cantidad de evidencias que la apoyan, puede considerarse como una teoría, que ha sido también llamada **teoría del ancestro común**. En sentido amplio, llamamos ancestro común de un conjunto de especies actuales o extintas a una especie que vivió en el pasado, y cuyas siguientes generaciones fueron acumulando cambios hasta originar las actuales especies. Cuando decimos que el lobo y el perro comparten un ancestro común, estamos asumiendo que hace miles de años existió una población de organismos similar a los dos, su ancestro común. Dentro de esta población, y con el correr del tiempo, se fueron diferenciando dos subpoblaciones, que luego de millones de años de acumular pequeñas diferencias, llegaron a ser especies independientes. Se considera que el proceso concluyó cuando fueron tantas las diferencias que ya no pudieron dejar descendencia fértil.



El perro y el lobo comparten muchas características, que heredaron de su ancestro común.


Actividades

1. ¿Qué características tienen en común el perro y el lobo, que debieron estar presentes en su ancestro común? ¿Qué rasgos los diferencian?
2. Expliquen con sus palabras la teoría del ancestro común.
3. El tigre, el león, el leopardo y el jaguar son felinos de gran tamaño con muchas características en común.
 - a. ¿Qué características tienen en común todos estos animales, que deberían haber estado presentes en su ancestro común?
 - b. Expliquen con sus palabras cómo estas cuatro especies pudieron haberse originado a partir de un ancestro común.

Observaciones que se explican por la teoría del ancestro común



La teoría del ancestro común permite explicar varias observaciones y fenómenos biológicos. A continuación se detallan algunos de ellos.



Existencia de los fósiles

Los **fósiles** son huellas o restos de organismos que vivieron en el pasado. Según la teoría del ancestro común, pueden interpretarse como una evidencia de la existencia de formas de vida antepasadas que dieron origen a las actuales. Los fósiles aparecen asociados a capas de rocas, cuya antigüedad puede calcularse, y de esta manera tener idea de la época en que vivieron. Así pudo estimarse que los primeros vertebrados, similares a peces sin mandíbula, habrían habitado la Tierra hace aproximadamente 530 millones de años.

No todos los fósiles se encuentran depositados en capas de la misma antigüedad. En general, los fósiles más antiguos se encuentran también en las capas más profundas o de mayor edad. Por ejemplo, los restos de dinosaurios más antiguos se hallaron en rocas de aproximadamente 230 millones de años, más recientes que las asociadas a los primeros vertebrados. Esta distribución de fósiles en capas de rocas de distinta antigüedad puede explicarse también por la teoría del ancestro común. Los fósiles más antiguos son los ancestros de los más recientes, y por eso se encuentran en capas de rocas de mayor edad.

El registro fósil no solo proporciona información sobre las características de las especies extintas, sino que además permite investigar las relaciones espacio-temporales entre estos organismos del pasado, y también con respecto a los actuales. Por ejemplo, los fósiles encontrados en un determinado sitio se parecen más a los animales locales actuales que a otros fósiles de la misma época de lugares lejanos.



Distribución geográfica de las especies actuales

El camello, el guanaco y la vicuña son representantes de los camélidos. La distribución geográfica de estos organismos puede explicarse con la teoría del ancestro común.


La **distribución geográfica de las especies actuales** también puede ser explicada por la teoría del ancestro común. Los organismos que habitan en zonas cercanas son más parecidos entre sí que los que habitan en otros sitios más lejanos, debido a que comparten un antepasado más próximo. Así, las modificaciones de las especies en el espacio son un reflejo de las modificaciones de las especies en el tiempo. Un interesante ejemplo de esto son los camélidos, una familia de mamíferos que incluye la vicuña, el guanaco, el dromedario y el camello. Las dos especies que viven en Sudamérica, la vicuña y el guanaco, comparten más rasgos entre sí que con el camello, originario de Asia. Analizando el registro fósil se pudo establecer que el ancestro de todos los camélidos vivió en América del Norte, y a partir de él se originaron otras dos especies. Hace aproximadamente 3 millones de años, una de estas especies migró por el Estrecho de Bering y se extendió por Asia, lo que luego dio origen a los camellos. La otra especie migró a América del Sur y allí dio origen a las vicuñas y los guanacos actuales.

Homologías anatómicas entre organismos

La teoría del ancestro común permite explicar los rasgos compartidos en grupos de organismos. El caso de las extremidades de los anfibios, reptiles y mamíferos es un ejemplo. Estos animales poseen miembros superiores que cumplen diferentes funciones según el ambiente en el que viven: las alas del murciélagos, las aletas de la ballena, las patas del caballo o el cocodrilo, y los brazos del ser humano. A pesar de las diferencias externas, todas tienen un mismo patrón interno: los huesos se ubican en posiciones relativas similares y siempre tienen cinco dedos. Las similitudes pueden explicarse proponiendo que todos estos animales tuvieron un antecesor que tenía cinco dedos, y los huesos en esas posiciones particulares. Estas características compartidas entre grupos de organismos, que son consecuencia de haber tenido un antepasado común, reciben el nombre de **homologías**. Estas pueden ser parte del cuerpo, y se las llama anatómicas, pero también pueden encontrarse a nivel molecular. Por ejemplo, las secuencias de aminoácidos de las proteínas son homologías moleculares, y se pueden estudiar para establecer relaciones de parentesco entre microorganismos. Aquellos microorganismos que tengan un antepasado en común tendrán una secuencia más semejante que los que no lo tengan.

Semejanzas embriológicas entre organismos


Las homologías también pueden encontrarse durante el **desarrollo embrionario**, etapa que ocurre desde la fertilización hasta el nacimiento de los organismos. Los embriones* de todos los vertebrados son muy similares durante las primeras etapas, y luego se van diferenciando a medida que avanza el desarrollo. A su vez, los organismos que están más emparentados mantienen durante más tiempo las similitudes. Según la teoría del ancestro común, las semejanzas embriológicas entre un grupo de organismos son el reflejo de su grado de parentesco.



Las similitudes entre las extremidades anteriores del cocodrilo, la ballena, el caballo, el murciélagos y el ser humano pueden explicarse por la teoría del ancestro común.

Glosario

embrión: estadio temprano del desarrollo de un organismo, desde la fertilización hasta su nacimiento.




Las similitudes en el desarrollo embrionario entre los vertebrados pueden explicarse por la teoría del ancestro común.

Actividades

- Expliquen, según la teoría del ancestro común, las siguientes observaciones.
 - Los fósiles de cierta época se parecen más a los animales locales actuales que a los fósiles de la misma época de lugares remotos.
 - Las especies tropicales de Sudamérica se parecen más a las especies de Sudamérica templada que a las

- especies tropicales de África o Asia.
- Los embriones de los peces, los anfibios y los mamíferos son parecidos durante las primeras etapas del desarrollo, mientras que al final de la gestación los embriones de los peces son más parecidos a los de los anfibios que a los de los mamíferos.



Las categorías que propuso Linneo en su sistema de clasificación son inclusivas. La de menor jerarquía está incluida dentro del siguiente rango.



El tigre, el leopardo, el león y el jaguar son especies del género *Panthera*, que está incluido dentro de la familia Felidae.

La clasificación linneana

La clasificación de los seres vivos propuesta por Linneo también adquiere sentido si se interpreta según la teoría del ancestro común. En este sistema, cada especie de organismos se ubica dentro de un grupo y, a su vez, cada grupo se coloca dentro de grupos de jerarquía mayor. Así, las **especies** pueden agruparse en **géneros**, los géneros en **familias**, las familias en **órdenes**, los órdenes en **clases**, las clases en **phylums** (para los animales) o **divisiones** (para las plantas), y estos últimos en **reinos**. En este sistema inclusivo, el reino es la categoría de mayor jerarquía, y la especie, la de menor.

El ser humano, por ejemplo, pertenece a la especie *Homo sapiens*. A su vez, la especie *Homo sapiens* está incluida dentro del género *Homo*, que se ubica en la familia Hominidae y en el orden Primates. A lo largo de la historia de la Tierra han existido otras especies de *Homo*, como *Homo erectus* u *Homo neanderthalensis*, todos actualmente extintos. *Homo sapiens* también es el único miembro actual de la familia Hominidae. Si hay especies actuales que pertenecen al orden Primates: el gorila, el chimpancé y otros monos. Todos ellos tienen en común ciertas características, como manos y pies con cinco dedos con el pulgar oponible, o una dentición muy similar. Bajo la teoría del ancestro común puede interpretarse que el grupo Primates incluye a todas las especies que descendieron de un antepasado que tenía los rasgos que definen a este orden. A su vez, todos los miembros del género *Homo*, el hombre y las especies extintas, no solo tienen los rasgos de todos los primates, sino que además comparten otras particularidades, como una gran capacidad craneana. Es por esta gran cantidad de caracteres compartidos que pertenecen al mismo género, y que se dice que tienen un ancestro común más próximo. Esto significa que el ancestro de todos los primates dio origen a diferentes tipos de organismos, algunos de los cuales fueron los ancestros de los gorilas, otros los ancestros de los chimpancés y otros los de todos los *Homo*.

Bajo la hipótesis del ancestro común, hoy asumimos que todas las especies pertenecientes a un mismo género descienden del mismo ancestro, y es por eso que comparten características morfológicas que las colocan en el mismo grupo. Este ancestro común es más reciente que el que comparten los géneros de una misma familia, y por eso tienen menos rasgos en común.

Actividades

1. Lean la siguiente información y respondan las preguntas.

El tigre (*Panthera tigris*), el león (*Panthera leo*), el leopardo (*Panthera pardus*) y el jaguar (*Panthera onca*) pertenecen al género *Panthera*. Se diferencian de otros felinos por su gran tamaño y por tener ciertas estructuras anatómicas que les permiten rugir. El género *Panthera*, al igual que el género *Felis* (al que pertenece el gato común) y otros géneros de felinos, está incluido dentro de la familia Felidae.

- ¿Qué características comparten los miembros de la familia Felidae y debieron estar presentes en su ancestro común?
- ¿Qué características debe haber tenido el ancestro del género *Panthera*?
- ¿Qué ancestro piensan que fue más reciente, el del género *Panthera* o el de la familia Felidae? ¿Por qué?

Predicciones de la teoría del ancestro común

Toda teoría bien elaborada permite hacer **predicciones**, y se espera que puedan ser probadas con éxito a lo largo del tiempo. La teoría del ancestro común predice, por ejemplo, que es posible encontrar en el registro fósil formas intermedias entre los distintos grupos de organismos. El hallazgo de fósiles con características intermedias entre las aves y los dinosaurios es una interesante prueba de esta predicción.

En 1861, en la cantera de Solnhofen, Alemania, se encontró el esqueleto de una especie fósil a la que se llamó *Archaeopteryx lithographica*, que habría vivido en el período Jurásico, hace aproximadamente 147 millones de años. Este organismo fue en principio considerado como el ave más antigua, por la presencia de plumas en las alas y cola. Pero tenía además dientes y una cola más larga que las aves actuales. En 1868, Thomas Huxley sugirió que *Archaeopteryx* mostraba la conexión evolutiva entre los dinosaurios y las aves, y que entonces las aves habrían descendido de los dinosaurios. Desde ese primer hallazgo hasta la actualidad se han encontrado más fósiles de *Archaeopteryx* y de otros dinosaurios similares con plumas. Hoy en día existe el consenso de que las aves evolucionaron de un dinosaurio bípedo de talla pequeña y de hábitos carnívoros, y que esto ocurrió hace más de 150 millones de años.

Las **semejanzas genéticas entre especies emparentadas** son otra de las predicciones que pueden desprenderse de la teoría del ancestro común. El ADN es el material genético de las células, y contiene las instrucciones para el desarrollo y funcionamiento de los seres vivos. La información del material genético está codificada como una secuencia de cuatro letras distintas (cada letra corresponde a un tipo de nucleótido diferente). Es decir, todas las características de un organismo están “escritas” como una larguísima sucesión de cuatro letras diferentes: A, C, G y T. Así, si las moléculas de ADN que están en las células de un organismo fueran un libro, al abrirlo encontraríamos cientos de páginas escritas con una combinación de estas letras, por ejemplo: AAA-GCTTAAACCCCTT. Estas secuencias son las que determinan que un chimpancé sea un chimpancé y no un gorila.

Para el momento en que Darwin propuso la hipótesis del ancestro común, poco se sabía sobre la información genética. Fue recién a finales de la década de 1970 cuando los investigadores comenzaron a sospechar que los organismos que comparten un gran número de características, por ejemplo el chimpancé y el gorila, también deberían presentar grandes semejanzas en su información genética. Recordemos además que el material genético se transmite de generación en generación, asegurándose la continuidad de las especies en el tiempo. Por ese motivo, es lógico pensar que el ADN de organismos que provienen de un mismo antepasado sea similar, pero que tenga a su vez pequeñas variaciones que se hayan acumulado a lo largo de las generaciones. Es por esto que los científicos que actualmente investigan las relaciones de parentesco entre los seres vivos sacan muchas de sus conclusiones a partir de la comparación de las secuencias del ADN de los organismos en estudio.



Fósil de *Archaeopteryx lithographica*.



Probable aspecto de *Archaeopteryx lithographica*.

Actividades

1. La información genética del chimpancé es un 96% idéntica a la de los seres humanos, mientras que la de la rata tiene un 90% de similitud.
 - a. Según la teoría del ancestro común, ¿cómo pueden explicar estos porcentajes de similitud? ¿Por qué el chimpancé tiene mayor semejanza genética con nosotros que las ratas? ¿Cómo pueden explicar el 4% de diferencias entre chimpancés y humanos?
 - b. ¿Piensan que la información genética de una planta será más o menos parecida a la de los humanos que la de los chimpancés? ¿Y la de las bacterias? ¿Por qué?

Dinosaurios con plumas

Glosario

plumón: tipo de pluma suave con eje central muy corto, o ausente, cuyas barbas están sueltas y no se entrelazan.

terópodo: grupo diverso de dinosaurios bípedos y carnívoros, como los carnosaurios y los ovirraptóres, entre otros.

En la actualidad solo las aves tienen plumas, pero esto no fue siempre así, como lo confirma una serie de descubrimientos de fósiles en China. En 1996 se encontró en la provincia de Liaoning, al noreste de este país, un fósil de un dinosaurio terópodo* que tenía la cola y el lomo cubiertos por unas estructuras parecidas a plumas. Este ejemplar fue bautizado como *Sinosauropelta prima* y era del tamaño de un gallo. Al siguiente año se descubrieron otros dos dinosaurios emplumados en la misma área, a los que se les dio el nombre de *Caudipteryx zoui* y *Protarchaeopteryx robusta*. Dos nuevos dinosaurios con plumas más complejas y ramificadas se hallaron en 1999 en Liaoning: *Beipiaosaurus inexpectus* y *Sinornithosaurus millenii*. En el año 2000 se registraron la sexta y séptima especies de dinosaurios emplumados en el oeste de la provincia de Liaoning: *Caudipteryx dongi* y *Microraptor zhaoianus*. Este último ejemplar es el dinosaurio adulto más pequeño conocido hasta la fecha (tiene menos de 40 cm de largo) y el más cercano a las aves. Presenta un cráneo expandido como las aves, las patas delanteras son largas (lo que le permitía aletear) y las traseras tienen adaptaciones para trepar árboles. En 2003 se descubrió un nuevo dinosaurio emplumado:



Possible aspecto de *Microraptor*, el dinosaurio adulto más pequeño conocido, y el más similar a las aves.

Microraptor gui, poseedor de plumas casi idénticas a las de las aves actuales. El descubrimiento de estos dinosaurios con plumas desafió la idea de que las plumas solo sirven para volar y que son específicas de las aves. Cuando se analiza la diversidad de plumas que presentan los fósiles chinos, se puede asegurar que estos organismos, a excepción de *Microraptor*, no volaban. Entonces, ¿para qué servían las plumas o qué ventaja tenía poseerlas? El hecho de que la mayoría de estos dinosaurios fueran de tamaño pequeño y que las primeras formas de plumas eran parecidas a los plumones*, hace pensar que tener esta cubierta en el cuerpo podría haber ayudado a mantener la temperatura estable, ya sea en los recién nacidos o en los adultos pequeños.

Fuente: Marisol Montellano Ballesteros, *Dinosaurios con plumas, ¿Cómo ves?*, volumen 79, páginas 10 a 15, 2005. (Adaptación).

Actividades


1. Lean el artículo y luego, respondan las preguntas.
- a. ¿Cuántas especies distintas de dinosaurios se nombran en el texto?
 - b. ¿Qué características en común tienen todas y cuáles las diferencian?
 - c. ¿Qué características debía tener el ancestro de todas estas especies?
 - d. ¿Qué características comparten estas especies con las aves?
 - e. Comparen los rasgos de *Archaeopteryx lithographica* con los de *Microraptor zhaoianus*. ¿Cuál de ellos es más similar a las aves, por lo que podría ser su ancestro? ¿Cómo podrían investigar acerca de cuál de las dos especies es más probable que sea el ancestro de las aves?
 - f. ¿Cuál predicción de la teoría del ancestro común permite comprobar el hallazgo de estos fósiles?

Los árboles filogenéticos

Para representar la idea de la **descendencia con modificaciones a partir de un ancestro común**, Darwin incluyó en su obra un esquema, que tiene la forma de un árbol formado por ramas que se dividen en otras ramas. En este dibujo mostraba las relaciones de parentesco entre especies actuales y sus antepasados. Ubicó a los antepasados en la base, a los que consideró la primera generación. A partir de ellos, dibujó ramas que terminaban en la siguiente generación. De las nuevas generaciones se desprendían a su vez otras ramas, algunas de las cuales seguían prosperando en el tiempo hasta las actuales (en el borde superior del árbol). Algunas ramas llegaban hasta la mitad del árbol, es decir, no prosperaban hasta las generaciones actuales, indicando así las especies extintas.

En el eje vertical, los números romanos indican los intervalos de tiempo y representan miles de generaciones. La distancia a lo largo del eje horizontal representa la cantidad de diferencias entre las especies. Los ancestros, ubicados en la base, se señalan con las letras de A a L. A partir de estos ancestros, por modificaciones a lo largo del tiempo, derivan las especies actuales (que son las que se encuentran en la línea superior, z^{14} por ejemplo) y las extintas (aquellas que quedan en las líneas intermedias, como i^3). Este tipo de diagrama ramificado, que se utiliza para representar las **relaciones de parentesco** o **filogenia** entre grupos de organismos, recibe el nombre de **árbol filogenético**. Darwin dibujó el primer árbol filogenético, y con los años este tipo de representación fue ampliamente adoptada, e incluso mejorada, para describir las relaciones entre los seres vivos.


En las ramas terminales de un **árbol filogenético** se ubican grupos de organismos que existan o hayan existido, actuales o extintos, y los puntos de ramificación representan los ancestros. Por ejemplo, en el árbol filogenético que muestra las relaciones de parentesco entre las aves, los reptiles y los dinosaurios, el ancestro común entre las aves y los terópodos se señala con un círculo, el de las aves, los dinosaurios y los cocodrilos se muestra con un rombo. El ancestro de las aves representado por el círculo es más **reciente** que el ancestro representado con el rombo (que es más **remoto**), ya que está más próximo a ellas. El punto de ramificación del cual se desprenden todas las ramas es el ancestro común a todos los organismos incluidos en el árbol, aquí representado con un cuadrado. Este ancestro tiene las características que comparten todos los organismos incluidos en el árbol, por ejemplo, reproducción a partir de huevos.



Árbol de la vida ideado por Darwin.

Actividades


1. ¿Qué es un árbol filogenético?
2. Ubiquen la especie z^{14} del árbol filogenético ilustrado por Darwin en la esquina superior derecha.
 - a. ¿Con qué letra está representado el ancestro más primitivo de z^{14} ?
 - b. ¿Cuáles son las dos especies actuales que más emparentadas están con z^{14} ?



Teoría de la selección natural

Glosario

teosinte: conjunto de plantas similares al maíz pero más pequeñas. Todas ellas pertenecen al género *Zea*, y no son cultivadas por el ser humano: son nativas.



Maíz comercial, obtenido por selección artificial a partir del teosinte.



Thomas Malthus (1766-1834)

Economista y sacerdote inglés. Sus obras principales son *Ensayo sobre el principio de la población* (1789) y *Principios de economía política* (1817). Intentó explicar la desigualdad económica, la miseria y la pobreza de las masas trabajadoras recurriendo a las leyes de la naturaleza.

Darwin llegó a la conclusión de que los seres vivos cambiaban a través del tiempo, pero aún quedaba sin resolver cuál era el proceso que explicaba esos cambios. Dos fueron las fuentes que inspiraron al naturalista para responder a esta pregunta: el proceso de selección artificial que practicaban los criadores de ganado y el concepto de lucha por la existencia de Malthus.

La **selección artificial** es una técnica que aplica el ser humano desde épocas remotas para mejorar las características de los animales y cultivos. Consiste en elegir para cruzar organismos que tienen rasgos que son interesantes para el criador, por ejemplo, vacas y toros que tengan una buena calidad de carne. Así, a lo largo de varias generaciones, la descendencia tendrá estas características deseadas bien desarrolladas. Por este proceso se han generado todos

los vegetales que consumimos actualmente, los diferentes tipos de ganado y las distintas razas de perros. Un interesante caso de selección artificial es el del maíz, una de las primeras plantas cultivadas, desde hace entre 7.000 y 10.000 años. La hipótesis más fuerte sobre su origen sostiene que el teosinte* es su ancestro silvestre, y que los aborígenes mexicanos lo habrían domesticado. Esto significa que habrían ido cruzando por muchas generaciones aquellos teosintes con granos de mayor tamaño hasta finalmente obtener una variedad similar a la del actual maíz.


Darwin no había estudiado solo la experiencia de los criadores de ganado, sino que él mismo hizo experimentos con palomas caseras, en los que obtuvo variedades con rasgos deseados. La selección artificial fue entonces una primera evidencia de cómo un proceso de selección podía modificar las características de las poblaciones en el tiempo.

La siguiente pregunta que se hizo Darwin fue qué o quién era responsable de ejercer esta selección en la naturaleza. La lectura del libro de Thomas Malthus, *Ensayo sobre el principio de la población*, le dio la clave para esto. En esta obra, Malthus propone que la población humana crece más rápidamente que los recursos alimenticios. Al ser los recursos cada vez más escasos, predice que dentro de la población se desatará una feroz lucha por la existencia. Esta idea interesó profundamente a Darwin, y le llevó a pensar que en las poblaciones naturales podría ocurrir algo similar. Las palabras con las que el naturalista lo explicó son: "Como de cada especie nacen muchos más individuos de los que pueden sobrevivir, y como, en consecuencia, hay una lucha por la vida, que se repite frecuentemente, se sigue que todo ser, si varía, por débilmente que sea, de algún modo provechoso para él bajo las complejas y a veces variables condiciones de la vida, tendrá mayor probabilidad de sobrevivir y, de ser así, será naturalmente seleccionado. Según el poderoso principio de la herencia, toda variedad seleccionada tenderá a propagar su nueva y modificada forma". A este proceso por el cual se conservan las diferencias y variaciones individualmente favorables y se destruyen las que son perjudiciales, Darwin lo llamó **selección natural** o supervivencia de los más aptos.

Analicemos más en detalle cómo Darwin explicó los cambios de las especies en el tiempo mediante el mecanismo de selección natural. Él propuso que en las poblaciones naturales existen individuos con características ventajosas o perjudiciales en un determinado ambiente. Cuando los recursos escasean, tendrán más probabilidad de sobrevivir y en consecuencia de dejar descendencia, los individuos portadores de las características ventajosas. Es así que, generación tras generación, el porcentaje de individuos con características ventajosas irá aumentando en la población.

Un caso interesante de selección natural es el de las mariposas del abedul (*Biston betularia*) de Gran Bretaña. Dentro de esta especie, existen dos variedades, la clara y la oscura. Antes de la Revolución Industrial, la variedad clara era la más abundante. Esto se debía a que gracias a sus alas blancas con motas parduscas, se camuflaba muy bien con los líquenes que crecían en las cortezas de los árboles, y lograban pasar inadvertidas para las aves que se alimentaban de ellas. En cambio, las mariposas oscuras eran menos abundantes y tenían menos probabilidad de supervivencia, ya que las aves las detectaban con facilidad y las predaban. Es decir que el color de la variante clara era una característica ventajosa, y por lo tanto los individuos portadores de esta podían llegar a la madurez sexual y dejaban más descendientes que los individuos oscuros. A finales del siglo XVIII, el ambiente en el que vivían estas mariposas sufrió grandes cambios. La quema masiva de carbón de las fábricas que tuvo lugar durante la Revolución Industrial generó gran cantidad de hollín, que ennegreció las cortezas de los árboles. Como consecuencia, las mariposas claras empezaron a ser más notorias y fácilmente detectables por las aves, mientras que las oscuras lograban camuflarse mucho mejor. En menos de 50 años se invirtió la proporción de las variantes: solo el 1 o 2% de la población era de color claro. Este ejemplo demuestra cómo la selección natural no tiene una dirección preferencial: no hay una característica que sea mejor que otra, sino que **la ventaja depende del ambiente**.

La variante clara de la mariposa del abedul se camuflaba sobre la corteza de los árboles. En cambio, la variante oscura era fácilmente detectada por sus predadores: las aves.



Actividades

1. Completan el siguiente cuadro sobre la selección artificial y la selección natural.

	Selección artificial	Selección natural
¿Tiene una finalidad? ¿Cuál?		
¿Sobre qué poblaciones ocurre?		
¿Cuál es la “presión” que ejerce la selección?		
¿Cuál es el resultado?		

2. Respondan las siguientes preguntas.

- ¿Cuál es el motivo para que haya una “lucha por la vida” en la naturaleza?
- ¿Cuál es la consecuencia de esta “lucha por la vida” en la naturaleza?
- ¿Qué determina que un organismo sea naturalmente seleccionado?

- ¿Por qué piensan que tiene que haber individuos con distintas características para que pueda ocurrir la selección natural? Dicho de otra manera, ¿podría haber selección natural si todos los individuos de una población fueran iguales? ¿Por qué?

Conceptos clave para comprender la selección natural



La especie *Canis lupis familiaris* (perro doméstico) incluye gran cantidad de variantes o individuos con distintas características.



Dentro de la especie *Impatiens walleriana* (alegría del hogar) pueden encontrarse distintas variantes de plantas con flores de diferentes colores.

La teoría de la selección natural se basa en algunos conceptos que no son intuitivos. Es por esto que puede ser mal interpretada. A continuación analizaremos algunas de estas ideas clave para comprender el mecanismo propuesto por Darwin.

La selección natural actúa sobre poblaciones

Las ideas relacionadas con la selección natural se basan en un modo de pensamiento poblacional. No son los individuos los que evolucionan, sino las poblaciones. La existencia de los organismos es breve, pero no así la de su material genético, que se transmite de generación en generación. A diferencia de los individuos, las poblaciones son sistemas que tienen continuidad temporal.

La variabilidad dentro de la población es previa a la selección natural

Las especies no son agrupaciones de individuos idénticos, sino que existe una gran variedad entre ellos. La existencia de estas variaciones, lejos de ser "desviaciones" de un "tipo", es un requisito para que pueda actuar la selección natural. Si todos los individuos fueran iguales, no habría algunos que tuvieran características más ventajosas que otros, y entonces no hay forma de que haya ningún tipo de cambio.

Llamamos **variabilidad** de una especie a las diferencias entre los individuos que la componen. Estas diferencias pueden ser visibles (como el tamaño de los perros o el color del pelo en los seres humanos) o no visibles (por ejemplo, las diferencias en el material genético). La variabilidad puede estar determinada por el material genético o ser consecuencia del ambiente. Solo la primera de ellas es importante para la selección natural, ya que es la única que pasará a las próximas generaciones. La variabilidad genética es además fundamental para mantener la continuidad de la especie. Tener distintas variantes que sobrevivan a diferentes condiciones es de gran ventaja en los cambiantes ambientes naturales.

El ambiente ejerce la presión que selecciona las variantes más aptas

Las restricciones que impone el ambiente a los organismos son las que determinan qué individuos podrán llegar a la madurez sexual y reproducirse. La **presión de selección** es el factor del ambiente que beneficia la supervivencia y reproducción de ciertas variantes dentro de la población y perjudica a otras. En el ejemplo de las mariposas del abedul, la presión de selección era la predación de las aves, ya que son las aves las que seleccionan al cazar cuál variante es más apta según el color de la corteza de los árboles.

El más apto es el que deja mayor número de descendientes


Darwin propuso en su teoría que los organismos que tuvieran mayor probabilidad de sobrevivir y de propagarse en el tiempo son los más aptos. Los individuos más aptos no son entonces los más fuertes, sino aquellos que dejan más descendientes. Una variante es seleccionada positivamente cuando posee ciertas características que, en determinado ambiente, le permiten sobrevivir y dejar más descendientes que las otras variantes. A estas diferencias en la capacidad para reproducirse de las variantes de una población se la llama **reproducción diferencial**.

Las características ventajosas deben ser heredables

Para que una característica cambie su porcentaje dentro de una población en el tiempo debe poder pasar de una generación a otra, es decir, debe ser heredable. Aunque Darwin sabía que ciertos rasgos se transmitían de padres a hijos, no pudo explicar en su teoría cómo sucedía esto. El naturalista propuso el **mecanismo de herencia mezclada**, que supone que las características de los progenitores se mezclan en sus descendientes. Si esto fuera válido, los hijos tendrían una apariencia intermedia respecto de la de los padres. La herencia mezclada fue el punto más atacado por los adversarios a la teoría de la selección natural: si las características se mezclaban, se irían diluyendo en las siguientes generaciones hasta ser imperceptibles.


El mecanismo por el cual las características se transmiten de una generación a la siguiente fue explicado por otro naturalista, Gregor Mendel. A pesar de la coincidencia en la época entre el trabajo de Darwin y de Mendel, ellos no compartieron los resultados de sus investigaciones. Es más, las ideas mendelianas fueron valoradas muchos años después de su muerte. La gran contribución de Mendel fue demostrar que las características heredadas eran llevadas en el material genético. Es por eso que a Mendel se lo conoce como el padre de la genética.

La combinación de los aportes de la genética y la teoría de la selección natural tuvo lugar entre 1920 y 1950, aproximadamente. Fue el resultado del trabajo de muchos investigadores, entre los que puede nombrarse a Theodosius Dobzhansky y Julian Huxley. Esta nueva teoría se conoce como **síntesis neodarwiniana o teoría sintética de la evolución**.



Gregor Mendel (1822-1884)

Monje y naturalista austriaco. Realizó cruzas entre variedades de arvejas a partir de las cuales propuso las leyes básicas de la herencia. Publicó sus resultados en 1866, pero fueron ignorados por la comunidad científica hasta el año 1900, cuando otros investigadores los redescubrieron.



Según el mecanismo de la herencia mezclada, la descendencia de la cruce de una flor roja y una blanca debería ser de color rosa.

Actividades

1. Analicen la siguiente situación y respondan las preguntas.

Cuando una persona está enferma por el ingreso de una bacteria en su cuerpo (es decir, tiene una infección bacteriana), le indican tomar antibióticos. Hay diferentes tipos de antibióticos, con distintos efectos, pero básicamente todos tienen en común que detienen el crecimiento de las bacterias. Sigue a veces que, dentro de la población bacteriana, hay algunos pocos individuos que son resistentes al antibiótico, es decir, el antibiótico no impide que se reproduzcan. Estos individuos son los que luego de la ingestión del antibiótico sobreviven, y aumentan su proporción dentro de la población.

- a. ¿Cuál es la población que se menciona en el texto,

sobre la que actúa la selección natural?

- b. ¿Cuáles son las dos variantes dentro de esta población con relación a la resistencia a los antibióticos?
- c. ¿Qué variante era la predominante antes de que se aplicara el antibiótico?
- d. ¿Qué variante será la predominante luego de que se aplique el antibiótico?
- e. ¿Cuál es la presión de selección que actuó sobre la población, modificando los porcentajes de cada variante?
- f. Las bacterias, ¿se volvieron resistentes al aplicar el antibiótico o la resistencia era previa?
- g. ¿Cuál es la variante más apta luego de la aplicación del antibiótico?

Alfred Wallace

La evolución por selección natural es conocida como “darwinismo”, pero en realidad tuvo dos diferentes autores que llegaron a la misma idea. Alfred Russel Wallace (1823-1913) fue un naturalista que estudió la distribución geográfica de las especies; y obtuvo las mismas conclusiones a las que había llegado Darwin.

“Toda especie ha comenzado a existir coincidiendo en espacio y tiempo con otra especie preexistente y estrechamente ligada a ella”.

En febrero de 1858, Wallace envió su ensayo *Sobre la tendencia de las variedades a diferenciarse indefinidamente del tipo original* al ya reconocido naturalista, pidiéndole ayuda para hacer pública su teoría. Cuando Charles Darwin lo leyó, se quedó sorprendido y temió ser adelantado a la hora de presentar sus conclusiones. Los mentores de Darwin, Charles Lyell y Joseph Hooker, llegaron a lo que se ha dado en llamar un “arreglo delicado”: presentaron la teoría de ambos autores en la Sociedad Linneana de Londres en julio de 1858. Wallace se enteró de esto después y demostró su total aceptación, declarando que sus ideas hubieran pasado desapercibidas sin el apoyo de Darwin. De hecho, consideró que había sido de mucha ayuda para ganar una posición en la comunidad científica de la época. En los siguientes años, los dos naturalistas mantuvieron una activa correspondencia. Este es un fragmento de una carta que Darwin envió a Wallace en mayo de 1860:

“He recibido esta mañana su carta de Amboyna del 16 de febrero, que contiene algunas acotaciones tuyas y la demasiado alta aprobación que hace de mi libro. Su carta me ha agradado mucho... Antes de contarle sobre el progreso de opinión sobre el tema, déjeme decirle cómo he admirado la manera generosa con que usted se expresa de mi libro: la mayoría de las personas, en su posición, habrían sentido amargos celos y envidia... Qué noblemente libre parece usted de ese defecto común de la humanidad. Pero usted habla demasiado modestamente de usted mismo. De haber tenido el tiempo libre que yo tengo, usted habría hecho este trabajo tan bien o tal vez mejor que yo... Y aquí hay una cosa curiosa: un Sr. Pat Matthews, un escocés, ha publicado en 1830 un trabajo sobre maderas de navegación y arboricultura, y en un apéndice, en media docena de párrafos da muy clara, aunque brevemente, nuestra visión de la selección natural. Mi hermano, que es un hombre muy sagaz, solía decir: ‘Siempre encontrarás que alguien ha estado allí antes que tú’. Sigo trabajando en mi compromiso mayor, que lo publicaré en volúmenes separados, pero por mala salud y la multitud de cartas que recibo, estoy avanzando lenta, muy lentamente”.

Actividades

1. Propongan explicaciones para el hecho de que dos naturalistas distintos hayan llegado a la misma conclusión de forma independiente.
2. ¿Cómo se resolvió el conflicto por la autoría de la teoría de la selección natural entre Wallace y Darwin?

Las adaptaciones como consecuencia de la selección natural

Los individuos de una especie que tienen alguna característica favorable en un determinado ambiente compiten en mejores condiciones que aquellos que no la poseen. Son, en consecuencia, más aptos para sobrevivir y dejar más descendencia. Sus hijos heredan esa característica y, a medida que transcurren las generaciones, aumentan los individuos que poseen el rasgo favorable y disminuyen los que no lo tienen. Al cabo de muchas generaciones, los primeros ocuparán todo el hábitat y los segundos habrán desaparecido. Estas características que se fijan en una especie por selección natural bajo la presión de un ambiente determinado son adaptaciones.

Una **adaptación** es una característica que le posibilita a los individuos de una especie a sobrevivir y reproducirse en un ambiente determinado. Cuando decimos que las alas son adaptaciones de las aves, asumimos que estas estructuras les aportan beneficios para desplazarse en el medio aéreo. También pensamos que en la especie que fue el ancestro de las aves había algunos individuos con alas desarrolladas que les permitían volar, y otros sin esta capacidad. Los individuos con capacidad para volar probablemente hayan tenido más habilidad para escapar de los predadores o para conseguir alimento. Dada su mayor capacidad para sobrevivir y para reproducirse con el paso del tiempo, habrían sido dominantes en porcentaje respecto de los que no las tenían. Al cabo de muchas generaciones, la variante con alas funcionales habría ocupado todo el hábitat y la variante sin esta característica habría desaparecido.

La selección natural permite responder “por qué” todas las aves poseen alas, pero no “para qué”. En el ejemplo anterior, las alas no aparecieron en la especie ancestral de las aves por ser beneficiosas para el vuelo, sino que existían antes de que actuara la selección natural. La presencia de alas resultó beneficiosa para sobrevivir y es por eso que este carácter aumentó su presencia en las siguientes generaciones, hasta fijarse. Recordemos que las variantes existen antes de que las presiones de selección actúen sobre ellas. Es por esto que la selección natural no explica la aparición de las características adaptativas, solo su expansión en las poblaciones debido a las ventajas que implica.

Conviene entender que las adaptaciones no son finalidades. Que las alas de las aves sean adaptaciones no significa que les sirvan “para” volar, ya que sus ancestros no desarrollaron esta característica para obtener una ventaja. Pero sí podemos decir que las alas están presentes en las aves “porque” les aportaron a sus ancestros un beneficio en el ambiente aeroterrreste y son el resultado de un proceso de selección natural. La selección natural no explica “**para qué**” están presentes ciertas estructuras sino “**por qué**” lo están.

Si cada tipo de organismo se adapta a un determinado ambiente como consecuencia de la selección natural, dada la existencia de muchísimos tipos de ambientes, es esperable que en ellos habiten diferentes seres vivos adaptados a esas condiciones. Es por eso que la biodiversidad es una consecuencia de la selección natural.



Las alas de las aves son adaptaciones de estos organismos que les permiten sobrevivir y reproducirse en el ambiente aeroterrreste.

Actividades

1. ¿Por qué las adaptaciones son consecuencia de la selección natural?
2. Expliquen por qué son incorrectas las siguientes afirmaciones:
 - a. Los osos hibernan para sobrevivir bajo las condiciones adversas del invierno.
 - b. Las aves macho cantan para atraer a las hembras.

Las adaptaciones según Lamarck y según Darwin



El cuello largo en las jirafas.

Actividades

- Expliquen cómo podrían haberse originado las siguientes adaptaciones, según Lamarck y según Darwin.
 - Las aletas de los peces, que les permiten desplazarse con gran efectividad en el medio acuático.
 - Las raíces desarrolladas de las plantas, que les permiten obtener nutrientes y un buen anclaje en el suelo.
- Expliquen qué quiso decir Theodosius Dobzhansky con su famosa frase: "En Biología nada tiene sentido, si no es a la luz de la evolución".

Tanto Darwin como Lamarck propusieron que las adaptaciones son el resultado de un proceso de transformación poblacional, que ocurre luego de acumular cambios durante muchas generaciones. Pero ambos se diferenciaron en cuanto al **mecanismo** por el que explicaron cómo ocurrían estas transformaciones.

La idea de voluntad para el cambio y de transmisión de características adquiridas durante la vida fueron los dos puntos débiles de la teoría de Lamarck. Estos conceptos fueron mejorados por Darwin y por los autores de la teoría sintética de la evolución. Darwin demostró que esas variantes o modificaciones existen previamente a que el ambiente cambie y las seleccione. Por su parte, los aportes de la genética incluidos en la teoría sintética permitieron establecer que los caracteres que adquieren los organismos solo se transmiten a las siguientes generaciones si están codificados en el material genético. Por ejemplo, si una persona pierde un brazo durante su vida, sus hijos no nacerán sin este brazo. Lamarck explicó que las jirafas tienen el cuello largo debido a que sus ancestros lo habían estirado durante su vida para alcanzar mejor el alimento. La presencia de un largo cuello se habría transmitido a la siguiente generación, y luego de muchas generaciones esta característica se habría ido desarrollando, hasta que todas las jirafas habrían tenido cuellos largos. Darwin y Wallace dirían en cambio que hace miles de años habría existido una población de antílopes de cuello corto. Pero los antílopes no eran todos iguales y había algunos que tenían el cuello un poco más largo. Gracias a esta característica, en épocas desfavorables, los individuos de cuello más largo podían alcanzar las hojas de las ramas altas de las acacias para comer, por lo que tendrían mayor probabilidad de sobrevivir y reproducirse. Los demás irían pereciendo de hambre. Como esta característica era de origen genético, se transmitía de generación en generación. De este modo, como en cada generación se reproducían los animales de cuello más largo, cada vez los descendientes tenían el cuello más largo. Al cabo de millones de años, la totalidad de los animales eran altos, como las jirafas actuales.

¿Qué es la evolución?

La **evolución biológica** es el proceso de transformación de las especies en el tiempo. La evolución es un hecho (porque ocurre en las poblaciones naturales) y también una teoría (que propone explicar los mecanismos que operan durante este hecho). La teoría evolutiva (también llamada síntesis neodarwiniana) es uno de los pilares de la Biología, ya que da coherencia a una enorme cantidad de datos y fenómenos observables. Permite explicar el origen de la biodiversidad y de nuevas especies, además de las adaptaciones de los seres vivos al ambiente.

Para conocer más


Curtis, H., Barnes, S., Schnek, A. y A. Massarini, *Curtis Biología*, Madrid, Editorial Médica Panamericana, 2008.
Darwin, C., *El origen de las especies*, Buenos Aires, Longseller, 2009.

Massarini, A. y R. Liascovich, *Biología 2*, Buenos Aires, Editorial Kapelusz, 2001.

Evolución tecnológica: *Yo, robot*

Yo, robot es una película de 2004, dirigida por Alex Proyas y protagonizada por Will Smith. Incluye algunas de las ideas de las *Series de los robots*, de Isaac Asimov, entre ellas las “tres leyes de la robótica”. La primera de estas leyes dice: “Un robot no hará daño a un ser humano o, por inacción, no permitirá que un ser humano sufra daño”.

La película está ambientada en el año 2035, en Chicago, donde los robots forman parte de la vida cotidiana en la Tierra y son la principal fuerza laboral de la especie humana. La historia comienza con el presunto suicidio de Alfred J. Lanning, ingeniero diseñador de robots y cofundador de la compañía. Lanning muere después de caer al vacío por la ventana de su oficina, y el detective Spooner sospecha que Lanning fue asesinado. Así, entrará en contacto con Susan Calvin, psicóloga de robots de la empresa, junto con quien descubre a un robot llamado Sonny, que parece estar fuera de control y que podría ser el asesino del Dr. Lanning. Pronto, la vida del detective se ve amenazada por diversos ataques de robots. Por medio de un estudio de Sonny, la doctora Susan Calvin descubre que el Dr. Lanning construyó un prototipo, los robots NS-5, con una aleación más densa y los dotó de un segundo cerebro positrónico*, lo que les permite desobedecer las tres leyes de la robótica. Los NS-5 comienzan a destruir a los otros robots más viejos, afines a los humanos. El ordenador central de la compañía, Viki, un cerebro positrónico que dirige a los NS-5 y había intentado matar a Spooner, posee el propósito de proteger a la humanidad de sí misma y de su instinto de autodestrucción. Viki tiene en marcha una auténtica rebelión de robots. La inteligencia artificial de la supercomputadora Viki fue creciendo y determinó que los seres humanos son una raza altamente autodestructiva, creando una ley adicional, que dice que los robots deben proteger a los humanos incluso si tienen que desobedecer la primera y segunda ley, y matar a algunos de ellos. Viki controla a los NS-5 para llevar un control global de los robots, justificando que menos personas morirán después de esta rebelión, en comparación con las que mueren en la naturaleza de la propia humanidad. Finalmente, Viki es desactivada y los NS-5 recuperan su programación original, con lo que vuelven a ser robots normales. Así, Spooner devuelve el control de los robots a los humanos, y Sonny muestra su fidelidad a la humanidad.



Película *Yo, robot*, de Alex Proyas, en la que se plantea un conflicto entre robots y humanos como consecuencia de la evolución de la inteligencia artificial.

Glosario

cerebro positrónico: artefacto tecnológico ficticio, concebido por el escritor de ciencia ficción Isaac Asimov, que opera como una unidad central de procesamiento (CPU) para los robots y les dota de cierta forma de conciencia. Es de tamaño similar al cerebro humano, pero es artificial y está ubicado en la cabeza de los robots.

Actividades

- Resuelvan las siguientes consignas.
 - ¿Existe variabilidad entre los robots? Detallen cuáles son las variantes de robots que se mencionan en el texto y qué características tiene cada una.
 - En el texto que leyeron se relata que hay un cambio en los porcentajes de las distintas variantes de robots. ¿Cuál es la variante que pasa a ser dominante?
 - ¿Qué opinan sobre la inserción de robots en nuestra vida cotidiana?
 - Los cambios en la tecnología de los robots, ¿se dan más rápido o más lento que en los seres vivos?
 - Comparen cuáles son las fuerzas que determinan los cambios de los seres vivos y cuáles las que determinan los cambios tecnológicos.
 - ¿Qué les parece que es la “evolución tecnológica”? ¿En qué se parece y en qué se diferencia de la evolución biológica?

Actividades finales

1. Resuelvan las siguientes consignas a partir de lo estudiado a lo largo del capítulo.

a. Elaboren una línea de tiempo en la que señalen el período en el que vivieron los siguientes naturalistas y el año en que se publicó su obra más famosa (si es posible):

Buffon ➤ Lamarck ➤ Cuvier ➤ Linneo ➤ Lyell
Malthus ➤ Wallace ➤ Darwin ➤ Mendel

b. Establezcan tres relaciones entre autores que hayan vivido en la misma época, con la ayuda del texto del capítulo. Por ejemplo: Wallace y Darwin vivieron en la misma época y llegaron a la misma teoría.

c. Establezcan dos relaciones entre autores que no hayan vivido en la misma época. Por ejemplo: el ordenamiento de la biodiversidad realizado por Linneo permitió la comparación sistemática entre los seres vivos y fue la base para que otros autores, como Darwin, propusieran explicaciones sobre el origen de los seres vivos.

2. *Cosmos: un viaje personal* es una serie documental de divulgación científica escrita y presentada por Carl Sagan en 1980. En el año 2014 se presentó una continuación: *Cosmos: una odisea espacio-temporal*. Uno de sus episodios, “Evolución molécula a molécula”, trata sobre la evolución biológica. Vean ese episodio y, luego de verlo, resuelvan las siguientes consignas.

a. ¿Cómo explica el documental el origen de los osos polares blancos?
b. ¿Qué dice este episodio sobre la distribución de los fósiles en las rocas?
c. Mencionen tres conceptos que aparezcan en el documental y hayan estudiado en este capítulo.

3. En una región de Japón hay una especie de cangrejos con marcas en el caparazón que tienen la forma de la cara de un guerrero samurái. Durante el siglo XII se disputó una batalla naval en la que perdió el clan samurái. Muchos de ellos murieron a manos del enemigo y otros se lanzaron al mar, donde finalmente murieron ahogados. Los pescadores, al capturar cangrejos con dibujos en el caparazón que parecían la cara de un samurái, los devolvían al mar por miedo a los espíritus y para conmemorar lo ocurrido. Al cabo del tiempo, todos los cangrejos de la región poseían caparazones con dibujos similares a la cara de los samurái.

Resuelvan las siguientes consignas.

- a. ¿Cuáles eran las dos variantes de cangrejos?
b. ¿Qué ventaja tenían los cangrejos con caparazones con dibujos que parecían la cara de un samurái? ¿Qué consecuencia tuvo esto?
c. ¿Cuál fue la presión de selección que actuó sobre la población de cangrejos?
d. Expliquen qué proceso evolutivo operó en el ejemplo de los cangrejos samurái.

4. A algunos perros de raza les cortan la cola y las orejas al nacer. ¿Qué opinarían Lamarck y Darwin en cuanto a la descendencia? ¿Nacerán con cola y orejas largas o no? Justifiquen la respuesta.

5. Marquen con X según corresponda.

Características sobre la teoría de la evolución	Lamarck	Darwin
Los cambios ocurren en el individuo.		
Los cambios suceden en una proporción de la población.		
Los individuos de una población presentan variabilidad.		
Las características adaptativas de los individuos son transmitidas a la descendencia y les permiten dejar mayor número de descendientes.		
Los seres vivos buscan adaptarse al ambiente.		
Los seres vivos adquieren características durante su vida que luego son transmitidas a su descendencia y eso les permite adaptarse mejor al ambiente.		
Las características adaptativas son seleccionadas por el ambiente.		
Cuando un órgano del cuerpo se usa mucho, este se desarrolla más y cuando no se lo utiliza, luego de un tiempo desaparece.		

Clasificación de los seres vivos

4



Contenidos

- > Los criterios para clasificar
- > Clasificación de los seres vivos en dominios
- > Árboles filogenéticos
- > Adquisiciones evolutivas de los grandes grupos de organismos
- > Conservación de la biodiversidad

Escuchamos un sonido, una simple nota musical en el aire. Un experto en música nos podría contar que esa nota es fa, o que está incluida en una escala musical. Otro experto nos podría decir que esa misma nota pertenece a un acorde musical, que es parte de una canción, que a su vez pertenece a un género musical. Un tercero afirmaría que dentro de esa canción, la nota debe estar en “armonía” con otras notas. Al igual que las notas musicales, los seres vivos tenemos características que nos distinguen de otros según las cuales podemos ser clasificados. También compartimos más rasgos con algunos seres vivos que con otros, como ocurre entre los géneros musicales. ¿Habrá entonces una única manera de clasificar a los seres vivos o a la música? ¿Qué características son importantes para establecer agrupamientos? ¿Cómo se puede estudiar estas relaciones de parentesco y por qué serán importantes? ¿Qué sucede cuando se pierden seres vivos dentro de un ecosistema, o notas dentro de una canción?

EN ESTE CAPÍTULO...

Se analiza por qué las relaciones de parentesco evolutivo son el criterio más útil para clasificar a los organismos, y cómo estas se representan con árboles filogenéticos.

Además, se caracterizan los tres grandes dominios en los que se puede clasificar la biodiversidad y se busca reconocer los rasgos que heredaron de su ancestro común.

Se aborda, por último, el tema de la importancia ecológica y económica de conservar la biodiversidad.

Contenido digital adicional

www.tintaf.com.ar/
NBIO1C4



Las clasificaciones



En la vida cotidiana clasificamos la ropa según su utilidad, por ejemplo, las medias suelen colocarse dentro de un mismo cajón.

Ana se levanta de la cama y busca en el segundo cajón de su ropero un par de medias de color blanco. Ni a Ana ni a ninguno de ustedes se les habría ocurrido ir a buscar las medias a la alacena de la cocina, ni dentro de la bañera, así como tampoco se les habría ocurrido buscar una cucharita en el segundo cajón del ropero. Ordenar y clasificar son dos procedimientos tan cotidianos que ni siquiera tomamos conciencia de ellos. ¿Cuál es la ventaja de colocar las medias en un cajón del ropero y los cubiertos en uno de la cocina? Esto nos permite recuperar los objetos clasificados rápidamente, sin perder demasiado tiempo en buscarlos.

Las clasificaciones son agrupamientos de objetos según un **criterio**. Ana clasificó sus medias en el cajón del ropero y las cucharitas en el cajón de la cocina utilizando como criterio la función que cumplen estos objetos. Existen distintos criterios para clasificar, y según cuál se elija, se obtendrán diferentes agrupamientos.

Algunos criterios son mejores que otros a la hora de clasificar. No sería muy útil para Ana clasificar los elementos de cocina y a su ropa según el color. Ubicar las espátulas, medias y remeras blancas en un mismo cajón dificultará encontrarlos rápidamente. Establecer una buena clasificación implica elegir un buen criterio para separar los objetos.

Para analizar algunos aspectos importantes de las clasificaciones, les proponemos una experiencia en la que clasificarán figuras geométricas de diferentes colores y tamaños.

Actividades experimentales

Clasificación de figuras geométricas

El objetivo es analizar algunas de las características de los sistemas de clasificación.

Necesitan:

- ▶ una cartulina azul
- ▶ una cartulina roja
- ▶ tijera
- ▶ lápiz
- ▶ regla

Paso 1. Dibujen y recorten en la cartulina azul dos cuadrados grandes (de 5 cm de lado aproximadamente), dos cuadrados chicos (de 2 cm de lado aproximadamente), dos triángulos grandes (de 5 cm de lado aproximadamente) y dos triángulos chicos (de 2 cm de lado aproximadamente). Repitan el mismo procedimiento utilizando la cartulina roja.

Paso 2. Clasifiquen las figuras en dos grupos. Luego, comparen con otros grupos. ¿Utilizaron todos el mismo criterio para clasificar?

Paso 3. Dentro de cada uno de los dos grupos


de figuras que formaron, vuelvan a clasificarlas (usando el mismo criterio en ambos casos).

Paso 4. Dibujen y recorten un círculo grande (de 5 cm de diámetro aproximadamente) en la cartulina roja. ¿Pueden ubicarlo en alguno de los grupos que formaron? ¿Qué tendrían que hacer para poder ubicar esta nueva figura en algún grupo?

Paso 5. Copien y completen en su carpeta el párrafo.

En esta experiencia clasificamos
..... En primer lugar, lo hicimos según su y luego según su

Cuando quisimos clasificar un objeto con nuevas características



Figuras geométricas que se pueden clasificar según diferentes criterios.

Un buen sistema de clasificación debería facilitar la recuperación de la información o de los objetos clasificados. En el caso de las medias de Ana, si su ropa fue bien clasificada, le será sumamente sencillo recuperar un par de medias o una remera. Una buena clasificación también debería permitir incorporar nueva información u objetos. Por ejemplo, si a Ana le regalan unas polainas* probablemente las ubique en el mismo cajón de las medias, aunque no haya tenido nunca antes esta prenda de vestir. Si el sistema de clasificación no es muy bueno, quizás haya que modificarlo cuando aparezcan objetos nuevos que no se puedan ubicar en ningún grupo. Es probable que esto les haya sucedido cuando quisieron clasificar el círculo rojo en la experiencia de las figuras geométricas.

Cuando los elementos a clasificar son muchos, suelen establecerse subdivisiones dentro de los grupos. Por ejemplo, en una cocina cada tipo de elemento se ubicará en un lugar distinto: las tazas en algún estante, los platos en otro y los cubiertos en un cajón. A su vez, dentro del cajón de los cubiertos, los cuchillos estarán separados de los tenedores, de las cucharas y de las cucharitas. Por su parte, probablemente separaremos los platos en hondos y playos. Este tipo de clasificación, en la que se diferencian subgrupos dentro de los grupos, se llama **jerárquica**. Ustedes también hicieron una clasificación jerárquica en la experiencia de las figuras geométricas, ya que dividieron en subgrupos los grupos que habían establecido.

El desafío de clasificar la biodiversidad

Los seres vivos no son solo diversos, sino también muy abundantes. Hasta la fecha se han descrito aproximadamente 1,8 millones de especies distintas, tanto de microorganismos como de animales, plantas y hongos. Los científicos estiman que aún falta descubrir y describir a la mayor parte de la biodiversidad. Según el método que utilicen para calcularlo, se predice que la cantidad total de especies que habita el planeta Tierra podría ser entre 3 y 100 millones. ¿Se imaginan lo difícil que es tener un buen sistema para clasificar esta enorme cantidad de seres vivos?



Las polainas son prendas de vestir que podrían clasificarse junto a las medias, según su función.

Glosario

polainas: prenda de vestir que protege la pierna desde la rodilla hasta el tobillo o desde el tobillo hasta el empeine del pie.

Actividades

1. ¿Por qué es importante elegir un buen criterio para clasificar?
2. ¿Qué características debería tener un buen sistema de clasificación?
3. Observen el esquema del ecosistema aeroterrestre.
 - a. Nombren diez organismos que formen parte de la biodiversidad que lo compone.
 - b. Clasifiquen a los organismos que mencionaron. ¿Qué criterio utilizaron para hacerlo?
 - c. Clasifiquen a los mismos organismos eligiendo otro criterio.
 - d. ¿Qué criterios piensan que se utilizan para clasificar a los seres vivos?

La biodiversidad presente en un ecosistema aeroterrestre puede clasificarse según distintos criterios.

La clasificación de los seres vivos




Las arañas son animales que tienen un exoesqueleto y patas articuladas, como los insectos. A diferencia de estos últimos, presentan el cuerpo dividido en dos grandes regiones y cuatro pares de patas locomotoras.

Clasificar a los seres vivos es una tarea que ha preocupado a los naturalistas desde épocas remotas, ya que es un paso previo necesario para poder compararlos y estudiarlos. De hecho, las teorías acerca del origen de los seres vivos, como la selección natural de Darwin, fueron planteadas una vez que el científico y naturalista sueco Carlos Linneo propuso una primera clasificación para la biodiversidad. Cuando reconocen un grillo, una araña o una rosa, están asumiendo una clasificación sin tal vez notarlo. Para que ustedes puedan llamar “araña” a ese pequeño animal tan familiar, alguien definió previamente qué características debe tener un ser vivo para ser incluido dentro del grupo de las arañas.

Un buen sistema de clasificación de la biodiversidad debe poder dar un nombre a cada tipo de ser vivo distinto y, al mismo tiempo, permitir agruparlos de una manera **eficiente**. Como sabrán, existen distintos tipos de arañas, de diferentes tamaños y colores, algunas venenosas para el ser humano y otras no. Cada una de ellas tiene un nombre distinto, para poder identificarlas y no confundirlas. A su vez, todas tienen ciertos rasgos en común, y por eso se agrupan dentro de un conjunto al que llamamos coloquialmente “arañas”.

Otro requisito para un buen sistema de clasificación de la biodiversidad es que sea lo suficientemente **flexible** como para poder crear nuevos grupos cuando se descubran organismos con características nuevas. Actualmente hay grandes avances tecnológicos que permiten reconocer nuevos seres vivos todos los días. Estos nuevos organismos deben recibir un nombre adecuado y, además, deben ser incluidos dentro de otros grupos de seres vivos conocidos, con los que comparten características.



Carlos Linneo (1707-1778)

Es el padre de la taxonomía. Fue quien propuso el actual sistema de clasificación de la biodiversidad, y además estableció las primeras reglas para dar un nombre científico a los seres vivos.

La taxonomía

La disciplina biológica que se dedica a la clasificación de los seres vivos se llama **taxonomía**. Su función no se limita a identificar a los organismos, darles nombre y agruparlos, sino que además se encarga de establecer los principios teóricos para hacerlo. Como podrán imaginarse, esta tarea es tan complicada que los científicos que se especializan en esta área encuentran constantemente formas de mejorarla. La taxonomía no es un área estática del conocimiento, sino que se actualiza todo el tiempo. Por eso es importante recordar que las clasificaciones biológicas son **hipótesis**. ¿Qué significa esto? Que las clasificaciones son propuestas por científicos y que tienen una validez temporal, ya que nuevos descubrimientos pueden modificarlas.

Actividades

1. Imaginen que están visitando el jardín de la abuela de un amigo y ella les muestra que una de sus plantas, a la que llama “rosa”, acaba de dar unas flores muy bonitas.
 - a. ¿Por qué cuando la abuela llama a esta planta “rosa”, la está clasificando aunque no lo note?
 - b. ¿Qué sucedería si un investigador en el futuro descubriera que dentro de las plantas a las que llamamos “rosa”, existen dos variedades distintas, que no pueden dejar descendencia entre ellas?
 - c. ¿Por qué les parece entonces que llamar “rosa” a cierto grupo de plantas es una hipótesis?

La nomenclatura binomial

Para dar un nombre científico a las especies se sigue una serie de reglas propuestas por Linneo, que se llama **nomenclatura binomial**. Según este sistema, el nombre de las especies se compone por dos términos, es decir, es un binomio, y se escribe en latín. Por ejemplo, el nombre científico de la especie humana es *Homo sapiens*. El primer término siempre comienza con mayúscula e indica el género al cual pertenece la especie. El segundo siempre se inicia con letra minúscula. Ambos se escriben en itálica para señalar que pertenecen a una lengua extranjera.

Identificar a cada especie con un nombre único y estandarizado es útil para evitar confusiones. Imagínense que cocineros de países distintos quieren comparar sus recetas de mermelada de damasco. Esto no sería sencillo si utilizaran el nombre común de esta fruta que se llama, por ejemplo, albaricoque en España o chabacano en México. Pero no tendrían problemas si todos se refirieran a *Prunus armeniaca*, el nombre científico del damasco.



Giardia lamblia es un parásito intestinal microscópico. Si un doctor quisiera comunicar a otra persona que su paciente está infectado con este organismo, debería indicar su nombre científico para evitar confusiones.

El sistema de clasificación linneano

El número de seres vivos es tan grande que para clasificarlos, Linneo eligió un sistema jerárquico, que incluye una serie de niveles subordinados. Estos niveles reciben el nombre de **categorías taxonómicas**. La categoría taxonómica de menor rango es la de las especies*. Los organismos con características muy similares pertenecen a una misma especie, como todos los perros, que se asignan a la especie *Canis familiaris*. El nivel de siguiente jerarquía se llama **género**. Un género agrupa a varias especies que son parecidas entre sí. Por ejemplo, en el género *Canis* se incluyen las especies *Canis familiaris* (perro), *Canis mesomelas* (chacal común), *Canis latrans* (coyote) y *Canis rufus* (lobo rojo), entre otras. El nombre de los géneros también se escribe en latín y por eso también usamos letra itálica, como para las especies.

Las categorías taxonómicas de mayor rango que el género se inician también con letra mayúscula, pero no se escriben en latín. La **familia** es la categoría que sigue al género, es decir, una familia agrupa a varios géneros que sean parecidos. Así, la familia Canidae incluye a los géneros *Canis* (perros, chacales, coyotes y lobos), *Lycalopex* (zorros colorado, patagónico, pampeano y del desierto peruano), *Urocyon* (zorros grises) y *Vulpes* (zorros indio, afgano, mongol y tibetano), entre otros. Del mismo modo, varias familias forman un **orden**, varios órdenes se agrupan en una **clase** y las clases con características similares se incluyen dentro de una misma **división** (en el caso de las plantas) o **phylum** (para los animales). Finalmente, las divisiones o phyla se agrupan en **reinos**. De este modo, el reino es la categoría taxonómica de mayor jerarquía dentro del sistema linneano de clasificación.

Los grupos de organismos de cualquier categoría taxonómica se llaman **taxones**. Por ejemplo, *Canis* y *Homo sapiens* son distintos taxones.

Glosario

especie: grupos de poblaciones naturales con características semejantes que al cruzarse dejan descendencia fértil.

Los perros pertenecen a la especie *Canis familiaris*, que se ubica dentro del género *Canis*, el cual a su vez pertenece a la familia *Canidae*.



Las clasificaciones después de Darwin



Las alas de las aves, las patas delanteras de los reptiles y los brazos de los seres humanos son un ejemplo de homologías anatómicas.

Como recordarán del capítulo anterior, Linneo pensaba que los seres vivos habían permanecido inmutables desde el momento en que fueron creados por Dios. Este naturalista estableció las reglas para clasificar las plantas y los animales comparando sus características, a las cuales consideraba como producto de un plan divino de la creación. Casi 100 años después, Darwin demostró que los seres vivos cambiaban a lo largo del tiempo, y que sus rasgos eran la consecuencia de modificaciones graduales a partir de ancestros comunes. Pasaron casi 100 años más hasta que el sistema de clasificación linneano comenzó a ser cuestionado. Fue a mediados del siglo xx cuando los biólogos reconocieron que si la evolución permite explicar las características de los seres vivos, un buen sistema de clasificación de la biodiversidad debería reflejar la historia evolutiva de los organismos: la **filogenia**. ¿Pueden imaginarse el revuelo que significó esto? Adoptar un nuevo criterio de clasificación, la filogenia en lugar de las características morfológicas, implicaba reevaluar toda la clasificación de los seres vivos. Por suerte, a pesar de que Linneo era fijista, muchos de los rasgos que eligió para clasificar eran **homologías**, es decir, permitían reconstruir esta historia evolutiva. Un verdadero adelantado para su época. Pero la historia aún continúa, y muchos científicos se dedican actualmente a mejorar la clasificación de los cientos de grupos de organismos que se conocen y los que se siguen descubriendo.


Árboles para representar la filogenia

La herramienta que se utiliza para representar las relaciones de parentesco entre los seres vivos es el **árbol filogenético**. Este tipo de esquema sirve para mostrar el agrupamiento de taxones, y las características que comparten y provienen de su ancestro común. En los árboles filogenéticos, los organismos se van agrupando de acuerdo con sus homologías. Cuantas más homologías comparten, más cercanos serán dentro del árbol.

Para construir un árbol filogenético se sigue una serie de pasos. Para exemplificarlos, armaremos un árbol filogenético que muestre las relaciones de parentesco entre la ballena común, el zorro, el gato, el perro, el león, la orca y el lobo. Comenzamos por escribir en una misma línea todos los organismos. No hacemos esto de cualquier manera, sino que ubicamos a aquellos que son más similares uno al lado del otro, por ejemplo, lobo al lado de perro. Luego unimos estos organismos más similares de a pares, extendiendo una línea diagonal desde cada uno hacia abajo, hasta que se crucen. De este modo, los pares perro-lobo, ballena-orca y gato-león quedan unidos por un trazo con forma de "V". En el paso siguiente, agrupamos estos grupos con otros grupos, o con organismos con los que sean más similares. Así, unimos perro-lobo con zorro. Los siguientes grupos en ser unidos serán perro-lobo-zorro y gato-león (todos carnívoros terrestres). Siempre se asocian primero aquellos grupos que comparten más homologías, y luego los que comparten menos. El árbol queda completo cuando todos los organismos quedan relacionados.

Actividades

1. ¿Por qué piensan los científicos actuales que el mejor criterio para clasificar la biodiversidad es la filogenia?
2. Reflexionen acerca de la influencia de las ideas de la época sobre los criterios para clasificar.



Pasos para construir un árbol filogenético que permita mostrar las relaciones de parentesco entre los organismos: ballena común, zorro, gato, perro, león, orca y lobo.

Los organismos que se relacionan con este tipo de esquema, como lobo, perro y ballena, se llaman taxones terminales. Los puntos de ramificación reciben el nombre de nodos, y representan el ancestro hipotético más próximo de los taxones que se derivan de ellos. En el esquema se señala con un punto el nodo en el que se ubica al ancestro común a perro, lobo y zorro. La raíz de un árbol es el punto donde se ubica el ancestro común de todos los taxones terminales. En nuestro árbol, hemos señalado con una línea violeta dos de estas características adquiridas por cada uno de estos ancestros y/o por los taxones terminales. La que tiene el número 1 es exclusiva de los perros, y el número 2 corresponde a un rasgo adquirido por el ancestro de todos los carnívoros terrestres.

Actividades


1. Señalen en el árbol filogenético del esquema:
 - el ancestro hipotético de las ballenas y las orcas;
 - una característica presente en el ancestro de los felinos, con una rayita con el número 3. ¿Cuál podría ser esta característica?

Curiosidades

Para diseñar los sistemas informáticos, como los videojuegos o redes sociales, entre otros, se utilizan unos esquemas muy similares a los árboles filogenéticos, llamados diagramas de clases.

La carpeta

Conviene que esté completa y prolífica, porque es muy útil para preparar una evaluación o presentarla al docente.



Clasificación de la biodiversidad en cinco reinos.

Los principales grupos en que se clasifica la biodiversidad

Lamarck dividió a los seres vivos en dos grandes grupos, a los que llamó reino animal y reino vegetal. Pero más adelante se descubrieron los microorganismos, y fue necesaria la creación de nuevos reinos para clasificarlos. Fue en 1959 cuando Robert Whittaker (1924-1980) sintetizó la información disponible hasta el momento y propuso una clasificación general de los seres vivos en **cinco reinos**. Así, a los tradicionales reinos vegetal (a partir de aquí llamado Plantae) y animal (Animalia) se sumaron los reinos Monera, Protista y Fungi. Los microorganismos procariotas se ubicaron dentro de Monera. Los hongos tuvieron un reino propio, Fungi. Finalmente, todos los organismos restantes que no eran ni animales, ni plantas, ni hongos, como las algas, se agruparon en el reino Protista.

La clasificación en cinco reinos utiliza varios criterios al mismo tiempo, como el tipo de célula y el tipo de nutrición, entre otros.


Los organismos del reino Protista no tienen un rasgo distintivo ya que los organismos que lo componen no están emparentados. Entonces, este reino no podría estar incluido en un sistema de clasificación de la biodiversidad que tome como criterio de agrupamiento las relaciones de parentesco o filogenia.

El sistema de clasificación de la biodiversidad en cinco reinos se enfrentó con otra dificultad adicional. A medida que se fueron descubriendo nuevos microorganismos, se encontró que son mucho más diversos que los organismos multicelulares. Esto cambió la visión respecto de la biodiversidad, ya que las plantas y los animales son en realidad una muy pequeña porción de esta. En 1977, Woese demostró que el reino Monera, es decir, los microorganismos procariotas, podían dividirse en dos grandes grupos, a los que llamó Bacteria y Archaea. Este investigador construyó un árbol filogenético que incluía a todos los seres vivos. En este árbol pudo reconocer tres grandes grupos o **dominios**: Bacteria, Archaea y Eukarya (que abarca a todos los organismos eucariotas). Cada uno de los dominios contiene organismos que derivan de un único ancestro. Es por eso que la comunidad científica actualmente prefiere este sistema de clasificación, ya que refleja la filogenia de la biodiversidad.

Actividades

1. ¿Por qué el sistema de clasificación en cinco reinos ha perdido validez en la comunidad científica?
2. ¿Cuáles son los grandes grupos en que puede clasificarse la biodiversidad si se sigue como criterio las relaciones de parentesco?

Árbol filogenético de la biodiversidad, en el que pueden diferenciarse los tres dominios. El último ancestro común universal es el organismo hipotético del cual descendemos todos los seres vivos de la Tierra.



Carl Woese y los tres dominios

Carl Woese pasó a la historia por haber realizado la primera clasificación de todos los seres que refleja la historia evolutiva. En 1977 publicó un trabajo en el que describía un nuevo grupo de seres vivos procariotas, distinto a las típicas bacterias, al que llamó *Archaea*. Propuso además que las arqueobacterias, las bacterias comunes y los eucariotas eran las tres líneas evolutivas de los seres vivos. Pero Woese fue ignorado, e incluso ridiculizado, ya que en ese momento estaba instalado el dogma* de la división de la biodiversidad únicamente en dos grupos distintos: eucariotas y procariotas. ¿Quién iba a aceptar en ese momento que se estaba ignorando un tercio de la biodiversidad? Además, el criterio que utilizó para construir su árbol filogenético era muy novedoso y aún no estaba probado en otros trabajos. A pesar de esto, siguió juntando evidencias y en 1990 publicó otro trabajo, en el que llamó dominios a estos tres grupos. Así los presentó en el resumen de esta publicación:

“Las comparaciones moleculares muestran que la vida en este planeta se divide en tres agrupamientos primarios, comúnmente conocidos como las eubacterias, las arqueobacterias y los eucariotas. Los tres son muy distintos, siendo las diferencias que los separan de una naturaleza más profunda que las diferencias que separan a los típicos reinos, como los animales y las plantas. Desafortunadamente, ninguna de las visiones convencionalmente aceptadas de las relaciones naturales de los sistemas vivos, es decir, la taxonomía de los cinco reinos o

la dicotomía eucariota-procariota refleja esta división tripartita del mundo vivo. Para remediar esta situación, nosotros proponemos que se establezca un sistema de organismos en el cual por sobre el nivel de reino exista un nuevo taxón llamado ‘dominio’. La vida de este planeta comprendería entonces tres dominios: Bacteria, Archaea y Eukarya, cada uno de los cuales contiene dos o más reinos. (Eukarya, por ejemplo, contiene Animalia, Plantae, Fungi y un número de otros no definidos aún.)”.*

Carl R. Woese, Otto Kandler y Mark L. Wheelis, “Towards a natural system of organisms: Proposal for the domains Archaea, Bacteria, and Eucarya,” *Proceedings of the National Academy of Science*, volumen 87, páginas 4576-4579, 1990.

Para mediados de la década de 1990, el dominio *Archaea* ya era completamente aceptado, apoyado por evidencias que se obtuvieron con las nuevas tecnologías. Una de estas evidencias fundamentales fue la “lectura” completa de la información genética de una arqueobacteria. En la actualidad, el sistema propuesto por Woese para clasificar los seres vivos ha reemplazado al de cinco reinos y es el nuevo dogma de la división de la biodiversidad. Además, el tipo de homología molecular que el investigador empleó para construir su árbol es uno de los más usados para establecer relaciones de parentesco entre los seres vivos.

Actividades

1. En el texto se mencionan tres dogmas diferentes para clasificar la biodiversidad. Nómbrenlos en el orden en que se fueron proponiendo.
2. Según Carl Woese, ¿hay más diferencias entre una planta y un animal, o entre una arqueobacteria y una eubacteria?
3. Según Woese, ¿debería el reino ser el taxón de mayor jerarquía para clasificar la biodiversidad, como propuso Linneo? Expliquen.
4. Expliquen por qué el sistema de clasificación propuesto por Woese demoró tanto tiempo en ser aceptado.

Glosario

dogma: principio aceptado como verdad.

tripartito: compuesto por tres partes.

Adquisiciones evolutivas de las eubacterias



Escherichia coli es una bacteria muy estudiada que vive en el intestino. En algunos casos puede causar infecciones cuando se consume en alimentos contaminados.

Glosario

antibiótico: sustancia que evita el crecimiento de las bacterias.

metano: gas constituido por moléculas que tiene un átomo de carbono y cuatro de hidrógeno (CH_4).

Si bien las eubacterias se diferenciaron originalmente de las arqueobacterias a partir de la comparación de su información genética, años después se encontró que también tienen distintas características en sus células y en las moléculas que las componen. ¿Cuáles son los rasgos que tienen en común todas las eubacterias y que debieron estar presentes en su ancestro común? Todas ellas son microorganismos procariotas que tienen una pared celular muy particular. Esta pared contiene un polímero llamado peptidoglicano, exclusivo de este dominio. Por otro lado, la mayor parte de ellas no crecen en presencia de antibióticos*. Las eubacterias incluyen organismos con tipos de metabolismos muy variados. Algunos de estos microorganismos pueden respirar sin oxígeno, o tener una nutrición autotrófica distinta a la fotosíntesis. Tal es la variedad metabólica de las bacterias que muchas de ellas tienen aplicaciones que benefician al ser humano. Por ejemplo, algunas de ellas pueden fabricar polímeros que luego se utilizan como plásticos biodegradables.

Dentro del dominio Eubacteria pueden reconocerse como mínimo doce grupos distintos, cada uno proveniente de un ancestro común. Entre estos doce reinos se encuentran por ejemplo las cianobacterias o algas azules, que tienen clorofila como las plantas, y hacen fotosíntesis. Las bacterias verdes son otro grupo autótrofo con un tipo de fotosíntesis diferente a la de las plantas. El grupo más grande es el de las bacterias rojas o proteobacterias, e incluye a organismos con todos los tipos de metabolismo.

Adquisiciones evolutivas de las arqueobacterias



Algunas arqueobacterias termófilas viven en las aguas termales, a temperaturas muy altas.

Las **arqueobacterias** son microorganismos procariotas que tienen una pared celular diferente a la de las eubacterias. No contiene peptidoglicanos y se caracteriza por tener un tipo de lípidos especiales que no se encuentra en ningún otro dominio. Además, son resistentes a los antibióticos que afectan a las eubacterias. Por otro lado, utilizan su material genético de una manera muy similar a los eucariotas. El nombre de este dominio proviene del griego (*arkhaios*, que significa “antiguo”), ya que inicialmente se consideraba que estos microorganismos habían sido los primeros en habitar la Tierra. Esta idea se debió a que las primeras arqueobacterias que se descubrieron viven en ambientes hostiles, como los que se supone había en el tiempo en que se originaron las primeras células. Pero luego se encontró que también vivían en una gran cantidad de hábitats, como los suelos, los océanos y hasta en el intestino humano.

Existen distintos tipos de arqueobacterias. El primer grupo en ser descrito fue el de las **metanógenas**. Estos microorganismos producen metano* y crecen cuando hay ausencia de oxígeno y abundantes sustancias en descomposición (como en el intestino de ciertos animales o en el fondo de los ríos). Otro grupo emparentado con las metanógenas es el de las **halófilas**, que viven en ambientes salinos. Algunas arqueobacterias son **termófilas**, lo que significa que pueden vivir a temperaturas muy altas, de hasta 80° C.

Actividades

1. Indiquen qué características permiten diferenciar a las eubacterias de las arqueobacterias.

Adquisiciones evolutivas de las eucariotas


Los organismos pertenecientes al dominio Eukarya comparten ciertas características, que debieron estar presentes en su ancestro común. Todos ellos están formados por una o varias células eucariotas, y utilizan su información genética de una manera similar a las arqueobacterias. Dentro de este dominio pueden distinguirse subgrupos o reinos, entre los que pueden mencionarse Plantae, Animalia y Fungi. Cada uno de ellos representa una línea evolutiva diferente dentro de los eucariotas, es decir, cada uno proviene de un ancestro común eucariota distinto. Eukarya incluye también a otros reinos, que son el resultado de la reclasificación del antiguo reino Protista. Esta reclasificación fue necesaria porque los organismos que se ubicaban dentro del reino Protista no derivaban de un único ancestro, y entonces no se lo puede considerar como un taxón válido. Los más de veinte reinos que forman el dominio Eukarya se diferencian, entre otras características, por presentar distintos tipos de células.

Algunos de los organismos eucariotas que antes se clasificaban dentro de Protistas son **autótrofos** debido a que sus células presentan cloroplastos. A este conjunto de seres vivos capaces de hacer fotosíntesis y que no son plantas se los llama **algas**. La mayoría de ellos son microscópicos, pero también hay algunos que alcanzan grandes tamaños, como las algas marinas, que pueden encontrarse en las costas. Hay algas verdes, rojas, marrones y doradas. La gran variedad de colores que pueden presentar se debe a los distintos tipos de pigmentos que contienen sus cloroplastos. Estos cloroplastos también se diferencian por otras características, como la cantidad de membranas que los rodea. ¿Cómo puede explicarse esta gran variedad de cloroplastos? Cada uno de los distintos tipos de cloroplastos se originó en diferentes líneas evolutivas, y es por eso que los distintos tipos de algas provienen de ancestros comunes diferentes. Como consecuencia, los distintos grupos de algas están incluidos dentro de diferentes reinos.

Otros de los organismos eucariotas que antes se clasificaban dentro de Protistas son **heterótrofos**. Algunos de ellos son parásitos y otros son de vida libre, es decir, no viven dentro de ningún otro ser vivo. Así como ocurre con las algas, se los clasifica dentro de diferentes reinos, según las características que presenten sus células. Estos eucariotas microscópicos heterótrofos pueden distinguirse, entre otros rasgos, por el tipo de estructura que poseen para desplazarse. Por ejemplo, los **flagelados** tienen uno o varios flagelos, mientras que los **ciliados** presentan un cuerpo unicelular rodeado de cílios. Ambos son activos nadadores. Otros pueden deformar su cuerpo unicelular y se llaman **amebas**.

Actividades

1. La mayoría de los reinos que pertenecen al dominio Eukarya, ¿son unicelulares o pluricelulares?
2. ¿Qué criterio se utiliza para diferenciar a los reinos del dominio Eukarya?
3. Busquen información sobre el *Trypanosoma cruzi*. Describan en qué enfermedad interviene y cuál es el estado de esa enfermedad en la Argentina.



El dominio Eukarya incluye a más de veinte reinos, entre ellos Animalia, Plantae, Fungi y otros que antes se agrupaban en el reino Protista. Algas, amebas, flagelados, ciliados y tripanosomas son organismos que pertenecen a estos nuevos reinos.




Ulva, también llamada lechuga de mar, es un alga verde de gran tamaño que puede encontrarse en la costa atlántica argentina. Está formada por células que tienen cloroplastos con dos membranas.



Las diatomeas son algas doradas unicelulares, que presentan una pared y cloroplastos con cuatro membranas. Son muy abundantes, tanto en el mar como en los lagos y ríos.

Adquisiciones evolutivas de las plantas



Todas las plantas tienen embrión. En la semilla de poroto, el embrión es todo su contenido, que queda cubierto por una capa protectora llamada tegumento.

Los árboles de nuestra cuadra, las plantitas de las macetas del balcón, los helechos y musgos que crecen en las paredes rotas o en los bordes de los canteros de la calle. Las verduras que comemos todos los días, el algodón con el que está hecha nuestra ropa, el papel en el que escribimos en la escuela. Vivimos rodeados de plantas o de productos obtenidos de ellas, aunque suelen pasar desapercibidas.


Seguramente, la mayoría de ustedes sepá que las plantas son organismos multicelulares con nutrición autótrofa. Sus células poseen por lo tanto cloroplastos, y tienen además una pared celular que les aporta rigidez. Las plantas están emparentadas con un grupo de algas, las algas verdes, las cuales habitan casi exclusivamente en ambientes acuáticos. El ancestro común de todas las plantas debió adquirir entonces nuevas características no presentes en las algas. Estos rasgos les posibilitaron vivir en el ambiente aeroterrestre. Algunas de estas adaptaciones estuvieron relacionadas con la supervivencia en el nuevo hábitat, como el desarrollo de raíces o rizoides*, mediante las cuales obtienen agua y sales del suelo. Otras adaptaciones permitieron asegurar la reproducción. Entre ellas puede mencionarse la protección de las estructuras reproductivas, como los embriones, dentro de órganos que evitan la desecación. ¿Dónde se encuentran los embriones de las plantas? En aquellos vegetales que forman semillas, el embrión está dentro de la semilla.

Las plantas pueden clasificarse en cuatro grandes grupos, según su organización interna y la manera en que se reproducen: briofitas, helechos, gimnospermas y angiospermas. A estos grandes grupos se los llama **divisiones**, y son equivalentes en jerarquía a los phyla de los animales.

Glosario

rizoide: pelo o filamento sencillo que cumple una función semejante a la de las raíces de una planta.

Relaciones evolutivas entre los grandes grupos de plantas.



La división más simple de plantas se llama **briofita**. Incluye a los musgos, fáciles de reconocer por su cuerpo de unos pocos centímetros, formado por pequeñas hojuelas, talluelos y rizoides, y por su color verde intenso. Siempre se encuentran en lugares húmedos ya que precisan que haya agua para que ocurra la fecundación. No tienen un sistema de transporte de sustancias en el interior de su cuerpo, como las plantas más complejas.


Algunos de los ancestros de todas las plantas dieron origen a las briofitas, pero otros adquirieron una nueva característica: un sistema de transporte en el interior de su cuerpo, una importante adaptación al medio aeroterrestre que les dio independencia del medio acuoso. La posibilidad de que las sustancias viajen a mayores distancias permitió que las plantas alcanzaran mayores tamaños.

La línea evolutiva de vegetales con sistema de conducción interno incluye a todas las plantas llamadas **vasculares**, como los helechos. Estos vegetales tienen grandes hojas que producen **esporas**. Estas se dispersan y, al alcanzar un medio adecuado, se genera una nueva planta. Tienen además tallos pequeños, de crecimiento horizontal, que se llaman **rizomas**.


La mayor parte de las plantas vasculares no se reproduce por esporas, sino por **semillas**, otra de las adaptaciones al ambiente aeroterrestre. Las semillas protegen al embrión, además de asegurar la dispersión. Existen dos grandes grupos de plantas que se reproducen por semillas: las gimnospermas y las angiospermas. La mayoría de ellas son árboles que alcanzan grandes tamaños, como las coníferas. La característica que diferencia a las **gimnospermas** de las **angiospermas** es que sus semillas no están protegidas dentro de un fruto. Las angiospermas son las plantas con flor, estructura reproductiva que aumenta las posibilidades de que la reproducción sea exitosa. Además de esto, a partir de la flor se produce el fruto, que protegerá a las semillas que hay en su interior. Esta adquisición clave del ancestro de las angiospermas permitió que estas plantas sean las más abundantes y diversas en la actualidad.

Actividades

1. ¿Cuáles son las características que tienen todas las plantas y que heredaron de su ancestro común?
2. En la imagen del árbol evolutivo de las plantas se han señalado con números las características adquiridas por los ancestros de los distintos grupos de plantas. Por ejemplo, el número 1 representa una característica que adquirió el ancestro de los helechos, las gimnospermas y las angiospermas. Indiquen una característica que podría estar representada por cada número.
3. ¿Qué características de las plantas les permitieron conquistar el ambiente aeroterrestre?



En los musgos pueden reconocerse las hojuelas, el talluelo y los rizoides y, en algunos casos, estructuras reproductivas llamadas esporangios.



En los helechos pueden reconocerse las hojas, el rizoma (tallo) y las raíces. En la cara de abajo de las hojas es posible encontrar conjuntos de esporas.




Los ginkgos son las gimnospermas más primitivas que pueden encontrarse en la actualidad. Habitaban la Tierra en la época de los dinosaurios y, por eso, son considerados fósiles vivientes.

Adquisiciones evolutivas de los hongos

Glosario

elíptico: con forma de elipse, similar a un círculo pero con dos ejes de simetría.

materia orgánica compleja: restos de organismos muertos y sus desechos producidos cuando estaban vivos.




Fotografía de levaduras. Algunas presentan una especie de "chichón", que crecerá hasta formar una nueva levadura.

¿Cuáles son las características que tienen todos los hongos y que debieron estar presentes en su ancestro común? Uno de estos rasgos es su **nutrición heterótrofa absorbtiva**. Esta capacidad de transformar la materia orgánica compleja* en sustancias más simples les confiere el rol de descomponedores. Las sustancias simples que producen quedan disponibles en el ambiente para que sean absorbidas por ellos o por otros seres vivos.

Las células de los hongos tienen **pared celular**, de diferente composición química que la de las plantas. Algunos hongos son unicelulares y otros, multicelulares. Cuando están compuestos por una única célula, se los llama levaduras. Las **levaduras** suelen ser elípticas* o esféricas, y se las puede reconocer fácilmente al microscopio óptico por ser más grandes que las bacterias y porque algunas de ellas presentan una especie de "chichón". Este "chichón" crece hasta formar una nueva levadura, que luego se desprende de la célula que la originó. A este tipo de reproducción asexual se lo llama **gemación**. Algunas levaduras también pueden reproducirse sexualmente.

El cuerpo de los hongos multicelulares recibe el nombre de **micelio**. El micelio está formado por un conjunto de filamentos llamados **hifas**. Cada uno de estos filamentos es a su vez una hilera de células.

Algunos hongos producen una estructura visible con forma de sombrero, llamada **cuerpo fructífero**, que está formada por hifas que se agrupan de manera muy compacta. Otros hongos no forman cuerpos fructíferos, y su micelio puede verse como una especie de "moco" o "algodón"; es el caso de los hongos que se producen cuando los alimentos se pudren.



Actividades

1. Mencionen las características que estaban presentes en el ancestro común del reino Fungi.
2. Definan los siguientes términos: levadura, hifa, micelio, cuerpo fructífero.
3. Los hongos pueden provocar enfermedades y, por otro lado, se utilizan para producir sustancias de interés. Busquen información sobre qué enfermedades son causadas por hongos, y qué tipo de productos se obtienen a partir de ellos.

Los hongos de sombrero, como el champiñón, están formados por un conjunto de hifas agrupadas de manera muy compacta. En el borde del sombrero hay células especializadas en producir esporas sexuales.

¿Por qué aparecen hongos en los alimentos? Esto ocurre porque en el aire hay esporas de hongos, capaces de crecer y producir un micelio cuando encuentran un medio adecuado, como la gran cantidad de materia orgánica que contienen los alimentos. Estas esporas pueden originarse asexualmente (es decir, provenir de una única hifa) o sexualmente (se producen luego de la fertilización entre dos hifas). Los cuerpos fructíferos siempre llevan en su interior esporas de origen sexual, y por eso son estructuras reproductivas.

Grandes adquisiciones evolutivas de los animales


Todos los animales son **eucariotas heterótrofos** que adquieren energía mediante la ingestión de otros organismos. Las células que forman sus cuerpos **carecen de paredes celulares** y la mayoría de ellos **se reproduce sexualmente**. El reino animal ha sido clasificado históricamente en dos grandes grupos: vertebrados e invertebrados. Sin embargo, esta división no responde a un criterio evolutivo, ya que no todos los invertebrados están emparentados. En la actualidad, para clasificar a los animales se utilizan varios criterios que intentan reflejar las **relaciones de parentesco** entre los distintos grupos. Estos criterios que permiten diferenciar a los grandes grupos o phyla de animales están relacionados con la forma y el grado de complejidad de su cuerpo. Podemos nombrar, entre otros criterios, el plan básico del cuerpo y la disposición de sus partes, la presencia o ausencia de cavidades corporales*, la manera en que se forman y cómo se desarrollan desde el óvulo fecundado hasta el animal adulto, y la simetría del cuerpo. Los animales pueden no tener simetría, o tener simetría radial o bilateral. En la **simetría radial**, cualquier eje que pase por el centro del cuerpo lo divide en dos partes semejantes. Por otro lado, la **simetría bilateral** contempla un único plano que provoca la división del cuerpo en dos mitades iguales, derecha e izquierda. En estos últimos también se puede diferenciar una zona ventral (abajo) y otra dorsal (arriba), y un extremo anterior (cabeza) de uno posterior (ano).



Simetría radial y simetría bilateral.

Glosario


cavidad corporal: espacio que se encuentra dentro del cuerpo y que ayuda a proteger, separar y sostener los órganos internos.




Relaciones filogenéticas entre los principales phyla de animales.

Actividades

- Expliquen qué criterios se utilizan para clasificar a los animales y por qué no es correcta la antigua clasificación en invertebrados y vertebrados.



Esponja de mar (phylum Porífera).



Las medusas y los pólipos son representantes del phylum Cnidaria.

Actividades

1. En la imagen del árbol evolutivo de los animales se han señalado con números las características adquiridas por los ancestros de los distintos grupos. Por ejemplo, el número 1 representa una adquisición del ancestro común a todos los animales.
 - ¿Cuál podría haber sido esta adquisición?
 - Indiquen qué adquisición se ha representado en el árbol con los números 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

Los phyla de animales más simples: Porífera, Cnidaria, Platyhelminthes y Nematoda

Los ancestros comunes de todos los animales habrían sido organismos unicelulares que vivían en los océanos y se habrían alimentado de la materia orgánica del ambiente. A medida que fueron pasando millones de años, algunos de ellos se habrían agrupado para formar **colonias** con células internas y externas con diferentes funciones. Algunas de ellas se habrían ocupado de la alimentación y locomoción, mientras que otras se habrían especializado en la reproducción. Con el tiempo, se habrían convertido en **pólips** adheridos al suelo oceánico, como las actuales esponjas, que pertenecen al phylum Porífera. Las **esponjas** tienen cuerpos sin simetría, no tienen tejidos verdaderos y su cuerpo es hueco, formado por canales y cámaras que sirven para el paso del agua. Obtienen su alimento a partir de la filtración de las partículas con nutrientes que hay en el mar.

Con el correr del tiempo, algunos ancestros de las esponjas habrían desarrollado tejidos diferenciados con células especializadas y tentáculos pequeños para llevar el alimento a una boca primitiva. Así se propone que se originaron las **medusas**, integrantes del phylum Cnidaria. Estos animales poseen simetría radial y una cavidad interna en forma de saco donde se digieren los alimentos, llamada **cavidad gastrovascular**. Dentro de este grupo de animales encontramos a los **corales**, que tienen forma de **pólipo**, es decir, un tubo abierto en el extremo superior, con una boca rodeada de tentáculos y cerrado en el extremo inferior, por el cual está sujeto al fondo del mar o a las rocas.

Otro grupo de ancestros de las esponjas, que habría adquirido simetría bilateral, organización del cuerpo en sistemas de órganos ycefalización, fue el que luego dio origen a todos los otros phyla de animales. La **cefalización** es la concentración de los receptores sensoriales en la zona anterior del cuerpo, con lo que se forma así una **cabeza**. Esta **cabeza** funciona como el centro del sistema nervioso central, que es el conjunto de tejidos que se ocupa de capturar y procesar señales o estímulos provenientes del ambiente para que el cuerpo pueda reaccionar frente a ellos.

El más simple de estos phyla es Platyhelminthes. Este grupo incluye **gusanos chatos**, la mayoría de ellos son **parásitos** que viven en los intestinos de sus hospedadores. Poseen un sistema nervioso muy simple, con un órgano similar a un cerebro muy básico. Otro phylum con organización corporal muy sencilla, los **nematodos** (phylum Nematoda), abarca a los **gusanos cilíndricos**, que presentan una cavidad interna. Muchos de ellos son de vida libre, especialmente marinos, mientras que otros son parásitos.



Gusanos redondos, pertenecientes al phylum Nematoda.



La planaria pertenece al phylum Platyhelminthes.

Los phyla de animales con sus cuerpos divididos en segmentos: Mollusca, Annelida y Arthropoda

Un grupo de animales ancestrales con simetría bilateral, sistemas de órganos ycefalización, adquirió una nueva característica: una cavidad corporal interna. A partir de estos ancestros se originaron phyla de animales más complejos. Por un lado, surgieron tres grupos de animales que presentaban su **cuerpo dividido en segmentos**. Uno de estos grupos es el **phylum Mollusca** que abarca a los caracoles, calamares y pulpos, entre otros. En su mayoría viven en aguas marinas, pero algunos habitan en agua dulce y el suelo. Se caracterizan por presentar un cuerpo blando, que en algunos casos está cubierto por un caparazón. Otro phylum de animales segmentados es Annelida. Los **anélidos** son gusanos con un sistema digestivo y circulatorio cerrado, compuesto por vasos sanguíneos. Se encuentran casi exclusivamente en agua dulce, y en un hábitat terrestre y húmedo. El último grupo de animales que surgió en esta rama evolutiva son los que pertenecen al **phylum Arthropoda**, que incluye a los ciempiés, arañas, escorpiones, insectos y crustáceos. Estos animales poseen patas articuladas y un exoesqueleto de quitina* que los hace fuertes y resistentes.



La lombriz es un representante del phylum Annelida.



La estrella de mar es un representante del phylum Echinodermata.

Los phyla de animales deuterostomados

A partir de los ancestros con simetría bilateral, sistema de órganos ycefalización se originó otra línea evolutiva de animales, que no tenían el cuerpo segmentado. Algunos representantes actuales de este tipo de animales son los phyla Echinodermata y Chordata. Todos ellos tienen en común un tipo de desarrollo embrionario especial, en el que el ano se forma en una zona bien definida del embrión y la boca se forma secundariamente. Por tal motivo, este grupo de animales es llamado **deuterostomados** (en griego *deuteros* = segundo y *stoma* = boca).

Las estrellas y los erizos de mar pertenecen al **phylum Echinodermata**. Si bien en la etapa adulta poseen simetría radial, en su estadio larval* presentan simetría bilateral. Su cuerpo consiste en un disco central a partir del cual se desprenden los brazos. Tienen un esqueleto interno formado por placas de calcio.

El **phylum Chordata** incluye a un conjunto de animales marinos, como las papas de mar y los vertebrados. A este último grupo pertenecen los peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Todos ellos presentan una estructura de sostén, en posición dorsal, llamada **notocorda**, que se extiende a lo largo de todo su cuerpo. En algunos grupos persiste durante toda la vida y en los vertebrados es reemplazada por la **columna vertebral**.



Las papas de mar son representantes del phylum Chordata.

Actividades

1. En el árbol filogenético de los animales de la página 111, identifiquen qué adquisiciones evolutivas corresponden a los números 9 a 16. Recuerden que estas características estuvieron presentes en el ancestro común de cada grupo. Por ejemplo, el número 10 corresponde a un rasgo que es compartido por los artrópodos, moluscos y anélidos, mientras que el número 16 es un rasgo exclusivo de los cordados.

Glosario

estadio larval: las larvas son las fases juveniles de los animales con desarrollo indirecto (con metamorfosis), y que tienen formas y funciones diferentes a las de los adultos.

quitina: componente orgánico, duro y resistente, que recubre el cuerpo de ciertos animales.



La biodiversidad es un recurso de importancia ecológica y evolutiva que debemos conservar.

Glosario

calentamiento global: aumento gradual de la temperatura del planeta como consecuencia del efecto invernadero.

desarrollo sostenible: desarrollo económico inspirado por el espíritu del cuidado ambiental.

humedal: ecosistema en territorios inundados o fangosos.

recurso: elemento que necesitamos los seres vivos para poder vivir.

Actividades

1. Respondan las siguientes preguntas.

- ¿Cuál es la importancia económica de la biodiversidad?
- ¿Cuál es la importancia ecológica de la biodiversidad?
- ¿Por qué hay una reducción actual de la biodiversidad?

Conseruación de la biodiversidad

Los ecosistemas, y la biodiversidad que albergan, son el soporte de la vida en la Tierra. Dependemos de ellos, desde el aire que respiramos, la comida que comemos y el agua que bebemos. Los humedales* filtran los contaminantes del agua, las plantas y árboles reducen el calentamiento global* absorbiendo el carbono del aire, y los microorganismos descomponen la materia orgánica y fertilizan el suelo, para proveer los alimentos. La biodiversidad “ayuda” a polinizar las flores y cultivos, y también provee medicinas para nuestro bienestar. Se utilizan hasta 20 mil especies distintas para producir todo tipo de medicamentos, incluidos productos contra determinados tipos de cáncer.

La biodiversidad también determina las interacciones entre los seres vivos, las cuales son extremadamente complejas. El ecosistema no puede ser considerado como la sumatoria de las especies presentes, sino como el resultado de las **interacciones** entre ellas, y de estas con el ambiente. Ningún organismo vivo es una entidad independiente, por lo tanto es difícil de prever y evaluar la consecuencia y el costo de la desaparición de una especie. Por lo tanto, la conservación de la biodiversidad sería un elemento esencial para el **desarrollo sostenible***.

¿Por qué la biodiversidad se está reduciendo?

Actualmente, se calcula que la biodiversidad está sufriendo una veloz reducción, como consecuencia de una elevada tasa de **extinción de especies**. Esta situación estaría relacionada con el accionar del ser humano, y se la atribuye a la contaminación del aire, el agua y el suelo, y a la conversión de hábitats naturales en tierras de agricultura, la ganadería intensiva y la urbanización. Asimismo, las decisiones que toma el ser humano con respecto al uso de los recursos naturales parecen basarse en consideraciones económicas, políticas, sociales y culturales, pero principalmente determinadas por el mercado.

La diferencia entre los **recursos*** naturales y otros recursos económicos es que los naturales no pueden ser renovados inmediatamente, y en algunos casos no pueden ser renovados jamás. Por lo tanto, la cosecha de estos recursos debería ser un balance consciente entre el beneficio presente y los costos futuros. Los **espacios protegidos** son un aspecto clave de los programas de conservación, en especial para los hábitats vulnerables. La **educación** y las campañas de divulgación contribuyen a acercar la información y las conclusiones científicas a la sociedad en su conjunto. Como consecuencia, una ciudadanía bien informada aprecia mejor la conservación de la biodiversidad, lo cual facilita la puesta en marcha de medidas de conservación.

Para conocer más

Curtis, H., Barnes, S., Schnek, A. y A. Massarini, Curtis Biología, Madrid, Editorial Médica Panamericana, 2008.
Lanteri, A. y M. Cigliano, Sistemática Biológica: fundamentos teóricos y ejercitaciones, Buenos Aires,

Editorial de la Universidad de la Plata, 2005.
Madigan, M., Martinko, J. y J. Parker, Brock. Biología de los Microorganismos, Madrid, Prentice Hall Iberia, 1999.

Wilkins, Borges y las clasificaciones

“El idioma analítico* de John Wilkins” es un ensayo breve de Jorge Luis Borges, publicado en el año 1952 en su libro *Otras inquisiciones*. En este entretenido e incluso delirante texto de tan solo tres páginas, el escritor presenta una serie de clasificaciones completamente arbitrarias. La primera de ellas, propuesta por John Wilkins en 1668 y recopilada por Borges, divide al universo en cuarenta categorías o géneros, subdividibles luego en diferencias, subdividibles a su vez en especies. El escritor argentino inventa en este ensayo otras dos clasificaciones, tan ambiguas, redundantes y deficientes como la de John Wilkins. Una de ellas es la descrita en la ficticia enciclopedia china *El emporio celestial de conocimientos benévolos*. En este supuesto libro, los animales se clasifican en las siguientes categorías: pertenecientes al emperador, embalsamados, amaestrados, lechones, sirenas, fabulosos, perros sueltos, incluidos en esta clasificación, que tiemblan como enojados, innumerables, dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, etcétera, que acaban de romper un jarro y que de lejos parecen moscas. Finalmente menciona la clasificación del universo según el supuesto Instituto Bibliográfico de Bruselas en 1.000 subdivisiones, de las cuales la 262 corresponde al Papa, la 282 a la Iglesia Católica Romana y la 263 al Día del Señor, entre otras.

Borges termina su ensayo de la siguiente manera: “He registrado las arbitrariedades de Wilkins, del desconocido (o apócrifo*) enciclopedista chino y del Instituto Bibliográfico de Bruselas; notoriamente no hay clasificación del universo que no sea arbitraria y conjetal*. La razón es muy simple: no sabemos qué cosa es el universo [...] La imposibilidad de penetrar el esquema divino del universo no puede, sin embargo, disuadirnos de planear esquemas humanos, aunque nos conste que estos son provisarios. El idioma analítico de Wilkins no es el menos admirable de esos esquemas”. En otras palabras, el escritor argentino concluye que todas las clasificaciones del universo son arbitrarias y basadas en muchas suposiciones ya que conocemos muy poco de este. Pero que este desconocimiento no debe desalentar a que elaboremos clasificaciones, aunque sepamos que son provisorias.

Jorge Luis Borges, *Otras inquisiciones*, Buenos Aires, Sur, 1952.



Jorge Luis Borges (1899-1986). Escritor argentino. Candidato al Premio Nobel de Literatura durante casi 30 años, fue una de las figuras más importantes del habla hispana y de la literatura del siglo xx. Entre sus muchísimas obras, que incluyen poemas, cuentos y ensayos, pueden mencionarse *Fervor de Buenos Aires, Ficciones y El libro de los seres imaginarios*.

Glosario

- apócrifo:** que no es de la época o del autor a quien se le atribuye.
- conjetal:** basado en suposiciones.
- idioma analítico:** tipo de idioma en el que las relaciones gramaticales (como el plural o el tiempo verbal) se indican con palabras sueltas.

Actividades

- Indiquen cuál fue el criterio que se utilizó en cada una de las tres clasificaciones presentadas por Borges en su ensayo.
- ¿Tendrán algún tipo de utilidad estos tipos de clasificaciones? Expliquen.
- ¿Por qué Borges concluye que todas las clasificaciones son arbitrarias y provisorias?
- Según lo que estudiaron en este capítulo, ¿también es arbitraria y provisoria la clasificación de los seres vivos? Justifiquen.
- John Wilkins fue un religioso que vivió entre los años 1614 y 1672. El esquema de clasificación recopilado por Borges es parte de un idioma universal que Wilkins propone en su obra *Un ensayo sobre una escritura real y un lenguaje filosófico*. Investiguen qué otras ideas tuvo este religioso.

1. Completen la tabla para clasificar los siguientes organismos.

Organismo	Dominio	Reino	Phylum/División
Elefante			
Bacteria del yogur		—	—
Ceibo (árbol nacional que produce flores)			
Pulpo			
Alga roja		—	—
Levadura			—
Mosca			
Ameba		—	—
Esponja marina			
Pino			
Estrella de mar			
Procarionta que vive a 80 °C		—	—
Musgo			
Medusa			
Hongo de sombrero			—
Araña			

2. Construyan un árbol filogenético en el que se muestren las relaciones de parentesco entre los siguientes organismos que clasificaron en la tabla anterior:

araña  musgo  estrella de mar  mosca
hongo de sombrero  elefante  pino

3. Corrijan los errores ortográficos del siguiente texto.

“El ser humano pertenece a la especie *Homo sapiens*. Nuestra especie se agrupa dentro del género *Homo*, en el que también se incluyen otras especies extintas como *homo erectus* y *Homo Habilis*. A su vez, pueden agruparse con otros organismos también extintos en la familia *Hominidae*”.

4. Indiquen si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). En el último caso, corrijanlas para que sean verdaderas.

- a. El criterio que se utiliza actualmente para clasificar la biodiversidad toma en cuenta las características que presentan los cuerpos de los organismos. 
b. Los científicos proponen que la biodiversidad debe clasificarse en cinco reinos. 

c. En la actualidad, los invertebrados son uno de los grandes grupos que se toman en cuenta para realizar la clasificación de la biodiversidad. 

d. Los grandes grupos en que se clasifica la biodiversidad pueden reconocerse mediante las adquisiciones evolutivas que heredaron de su ancestro común. 

e. La mayor cantidad de organismos que habita el planeta es multicelular. 

5. Durante el siglo xx se ha observado una pérdida cada vez más acelerada de la biodiversidad. Las estimaciones sobre las proporciones de extinción son variadas: entre muy pocas y hasta 200 especies por día. Pero todos los científicos reconocen que la proporción de pérdida de especies es mayor que en cualquier otra época de la historia humana. Entre las plantas y los animales, se estima que se encuentran amenazadas aproximadamente un 12,5% de las especies conocidas para cada grupo. Teniendo en cuenta el árbol general de los seres vivos, ¿consideran a las plantas y animales como los grupos de mayor riesgo? En caso negativo, ¿qué tipo de organismos consideran que corren mayor riesgo de extinción? Justifiquen.



Reproducción

5



Contenidos

- > Importancia de la reproducción
- > Reproducción asexual
- > Reproducción sexual y variabilidad
- > Reproducción sexual en plantas y animales
- > Estrategias reproductivas

Cuando la mayoría de las personas piensan en la reproducción, suelen asociarla con el nacimiento de un bebé, con una madre o una gatita embarazadas, con el cuidado de las crías o con la búsqueda de pareja. Todas estas ideas están relacionadas con el grupo de animales al cual pertenecemos, los mamíferos. Pero los mamíferos no son los únicos seres vivos que se reproducen. Imaginemos que un día despertamos y que solo existe en la Tierra un individuo de cada especie, es decir un solo león, una sola rosa, un único champiñón. Sería un mundo en el que muchas de estas especies persistirían únicamente hasta la muerte del único individuo que las representa. Por suerte, en nuestro planeta, cada especie lucha por su supervivencia dejando descendientes y transmitiendo sus genes. ¿Existen seres vivos que no necesitan de otros para reproducirse? ¿Siempre es necesario contar con un macho y una hembra para garantizar la reproducción? ¿Es cierto que todos los animales se reproducen de la misma manera? ¿Qué estrategias usan las plantas para asegurar su posteridad?

EN ESTE CAPÍTULO...

Se analiza la función de reproducción como mecanismo que asegura la continuidad de las especies en el tiempo. A su vez, se explican los distintos modos en los que los seres vivos pueden reproducirse, interpretando que estos son el resultado de procesos evolutivos.

Contenido digital adicional

www.tintaf.com.ar/

NBIO1C5



Importancia de la reproducción



Cientos de ballenas invierten un gran esfuerzo en llegar todos los años a las costas de Península Valdés para parir sus crías en aguas tranquilas y seguras.



El cerezo es un árbol que utiliza todas las reservas del año anterior para producir una gran cantidad de flores.



El salmón rosado es una especie de salmones del norte del océano Pacífico.

Seguramente habrán visto en algún documental, publicidad o libro, el increíble plumaje que tienen los pavos reales macho y que utilizan para cortejar a las hembras. O habrán oído acerca de los intensivos cuidados que muchos mamíferos y aves dan a sus crías, como ocurre en nuestra especie. Tanto la producción de un plumaje vistoso, la búsqueda de alimentos para las crías o la gestación de un nuevo ser vivo dentro de otro son actividades para las que los animales necesitan consumir muchos recursos. Pero los animales no son los únicos seres vivos que destinan un gran esfuerzo para asegurar la continuidad de la especie. Las plantas, por ejemplo, desarrollan grandes cantidades de flores, que son sus órganos reproductivos. Para producir estas flores y los nutrientes que se almacenan en los frutos que se generan a partir de ellas, muchas angiospermas utilizan casi todos los productos que fabricaron previamente por fotosíntesis.

¿Por qué los seres vivos invierten tantos recursos en la reproducción? Esta capacidad que tiene todo individuo de originar a otros individuos semejantes a sí mismo no es fundamental para su propia supervivencia, pero sí para la de la especie. La importancia de la **reproducción** es que permite asegurar una de las características más salientes de las especies: su continuidad a lo largo del tiempo. Aquellos individuos que son más exitosos según la selección natural, son los que logran dejar una mayor cantidad de descendencia. Sería imposible pensar en la evolución de los seres vivos sin considerar su reproducción.

La forma en que los seres vivos **se relacionan con otros** y utilizan los **recursos del ambiente** que los rodea, también está estrechamente relacionada con su reproducción. Imaginemos una población de conejos que habita en una pradera. Si el pasto que tienen disponible para alimentarse fuera escaso por una helada, algunos conejos no podrían terminar de desarrollarse y la cantidad de crías de la población disminuiría respecto de los años anteriores. Esto probablemente perjudicaría a la población de zorros que se alimenta de estos conejos y, a su vez, a su capacidad de dejar descendencia. En esta situación de pocos recursos alimentarios, una población de conejos que produzca más cantidad de crías, pero de menor tamaño, podría ser tal vez más exitosa respecto de otra que deje pocas crías pero de mayor tamaño.

El desafío de asegurar la continuidad de la especie ha encontrado una gran cantidad de soluciones posibles a lo largo de la historia de la vida en la Tierra. Es por eso que hoy en día podemos reconocer una gran variedad de estrategias, estructuras y comportamientos reproductivos. Sin embargo, todas tienen el mismo objetivo, y es por eso que existen también similitudes en la reproducción de los seres vivos.

Actividades

1. Elaboren una definición de reproducción que incluya el concepto de continuidad de la vida.
2. Los salmones que viven en el norte del océano Pacífico solo desovan (liberan huevos al agua) una vez, y mueren luego de reproducirse. ¿Cómo pueden explicar que estos peces inviertan todos sus recursos en este proceso?
3. ¿Cuál es la importancia de la reproducción con relación a la evolución de los seres vivos?

La continuidad de las especies y sus ciclos de vida

El **ciclo de vida** de un ser vivo constituye todos los eventos que ocurren en su vida desde que nace hasta que origina un nuevo individuo, que repetirá el mismo ciclo. La reproducción es uno de los eventos más importantes de los ciclos de vida, ya que es imprescindible para que estos se completen.


¿Qué ocurre durante la reproducción que permite asegurar que un perro siempre origine a otro perro y no a un lobo o una nueva especie? El material genético que se transmite de los progenitores a los descendientes es el responsable de mantener las características de las especies en el tiempo. La **reproducción** es el proceso por el cual el material genético pasa de una generación a la siguiente, garantizando la continuidad de las especies.

Tipos de reproducción


Los descendientes pueden tener exactamente el mismo material genético que sus progenitores, o poseer una combinación nueva de material genético de cada uno de ellos. En el primer caso, la reproducción es **asexual**, y las nuevas generaciones serán exactamente iguales a las que las preceden. En el segundo caso, los descendientes serán parecidos, pero no exactamente iguales, como ocurre en los seres humanos. Este tipo de reproducción se llama **sexual**, ya que en este proceso intervienen dos sexos distintos.

En la reproducción sexual, el nuevo individuo se forma a partir de la unión de dos células sexuales, llamadas **gametas**. En el ser humano y la mayoría de los animales, el óvulo es la gameta femenina y el espermatozoide, la masculina. En algunos seres vivos, los distintos tipos de gametas son producidos por individuos de distintos sexos: la hembra produce los óvulos y el macho, los espermatozoides. Pero en otros organismos, llamados **hermafroditas**, un único individuo puede producir los dos tipos de gametas, como en la lombriz solitaria.

Todos los microorganismos se reproducen asexualmente, al igual que algunos organismos multicelulares, como insectos o plantas. Hay organismos que solo se reproducen asexualmente, como las bacterias, mientras que otros únicamente lo hacen con intervención de dos sexos, como los mamíferos. Algunos seres vivos pueden hacerlo de las dos maneras, por ejemplo las abejas y las algas.



En la reproducción asexual, una célula se divide para originar una (o varias) iguales a sí misma.




El ciclo de vida de las gallinas se inicia cuando la hembra pone los huevos que produjo luego de aparearse con el gallo. Después de 21 días de incubación, el polluelo sale del huevo. El polluelo crece, se convierte en adulto, busca pareja y se reproduce, cerrando así el ciclo.




Actividades

1. ¿Qué ocurre con el material genético durante la reproducción?
2. Definan los siguientes términos: ciclo de vida, reproducción sexual, reproducción asexual, gameta, hermafrodita.
3. Expliquen por qué es incorrecto afirmar que la diferencia entre la reproducción sexual y la asexual es que en la primera participan dos individuos y en la segunda, uno.



Glosario

citoesqueleto: es un entramado tridimensional de proteínas que provee soporte interno en las células.



Reproducción de la estrella de mar por fragmentación.

La reproducción asexual

Cuando los organismos se reproducen asexualmente, un único progenitor se divide y da origen a nuevos individuos idénticos a él.

La reproducción asexual en procariotas

El modo de reproducción de las bacterias es la **fisión binaria o bipartición**. A partir de una célula madre se originan dos células hijas, aproximadamente iguales en tamaño y con la misma información genética. Cada célula hija recibe una copia de la molécula de ADN circular de la célula madre. Para llevar a cabo este proceso, la célula madre previamente debió aumentar su tamaño y duplicar su material genético. Algunas bacterias son responsables de producir enfermedades infecciosas y son causantes de grandes epidemias ya que al reproducirse por este mecanismo tan simple, que ocurre de manera rápida, les permite alcanzar grandes poblaciones en poco tiempo.

La reproducción asexual en microorganismos eucariotas

Los organismos eucariotas se reproducen asexualmente mediante la división de sus células por medio de la **mitosis**. Durante la división celular, el núcleo de la célula madre se divide y origina dos núcleos hijos con la misma información genética; luego se divide el citoplasma, lo que genera dos células hijas. En todo este proceso hay una activa participación del **citoesqueleto***, que se encarga de “separar” el material que recibe cada célula hija. La mitosis representa la manera más simple que tienen los eucariotas para generar nuevos individuos, y es el mecanismo por el cual se reproducen la mayor parte de los microorganismos eucariotas. En algunos de ellos, la división del citoplasma es desigual, y se forma una célula hija más pequeña, llamada yema, que dará origen a un nuevo individuo. Este tipo especial de reproducción asexual se llama **gemación**.

La reproducción asexual en animales

La gemación es también la forma de reproducción asexual de algunos animales invertebrados que viven fijos a sustratos y que no tienen la capacidad de moverse, como las esponjas y los corales. En este caso, los nuevos individuos se generan a partir de yemas multicelulares que crecen en el cuerpo del progenitor. Los nuevos individuos pueden separarse de este último o quedarse unidos, como en el caso de los corales. Cabe aclarar que estos animales también se reproducen sexualmente pero, al reproducirse por gemación, se asegura el crecimiento de su población.

Las poblaciones de algunos invertebrados se encuentran dispersas y el encuentro entre los individuos resulta difícil y, por ende, la reproducción sexual se reduce a pocos eventos. En estos casos, estos animales se reproducen asexualmente por **fragmentación**. Para ello, generan fragmentos de su cuerpo que tienen la capacidad de regenerarse y formar un nuevo individuo. Este es el caso de algunos gusanos planos, como la planaria, algunos anélidos y las estrellas de mar.

La reproducción asexual en plantas

Las plantas presentan varios tipos de reproducción asexual, que en conjunto reciben el nombre de **multiplicación vegetativa**. En todos los casos, una parte de la planta, (raíz, tallo u hojas) contiene yemas* de las que brotarán nuevas plantas.

► **Rizomas**: son tallos subterráneos que crecen de forma horizontal y contienen varias yemas de las cuales brotan nuevas plantas. Por ejemplo, los lirios.

► **Tubérculos**: son tallos subterráneos que contienen yemas y almacenan sustancias de reserva que les permiten brotar luego de una época de reposo. Un ejemplo es la planta de la papa.

► **Estolones**: son tallos que crecen pegados al suelo, como si fueran arrastrándose, y que cada cierta distancia emiten raíces y originan nuevas plantas. Por ejemplo, las plantas de frutilla.

► **Bulbos**: son tallos subterráneos cubiertos por hojas carnosas que almacenan sustancias de reserva para poder desarrollarse luego de la etapa de reposo. Un ejemplo es la planta de cebolla.

► **Raíces tuberosas**: son raíces engrosadas que contienen sustancias de reserva y generan un tallo que da origen a una nueva planta. Las plantas de batata y zanahoria son dos ejemplos de este tipo de multiplicación vegetativa.


► **Gajo o esqueje**: es la fragmentación accidental o intencional de alguna parte de la planta que, al tocar tierra, es capaz de enraizar y originar una nueva planta. Por ejemplo, el potus.

► **Propágulos**: son brotes que se generan en las hojas de algunas plantas, de los que crecen plantas nuevas y que luego se separarán de la planta madre. Por ejemplo, los musgos.

La esporulación

Las **esporas** son células que germinan y generan un nuevo individuo sin fusionarse con otras células. Muchos microorganismos procariotas y eucariotas, así como los hongos, musgos y helechos, se reproducen por esporas. Pueden provenir de un único progenitor, por lo que son asexuales, o pueden producirse luego de que haya ocurrido la unión de gametas. En este último caso se habla de esporas sexuales. En general, tienen gruesas paredes, por lo que pueden sobrevivir hasta que las condiciones sean adecuadas para la germinación.

La esporulación puede ser un tipo de reproducción cuando genera un crecimiento poblacional, pero también puede ser un **mecanismo de resistencia** frente a cambios en el ambiente. Por ejemplo, algunas bacterias producen esporas cuando detectan que las condiciones ambientales son adversas.



La esporulación asexual es un medio de propagación y crecimiento de la población.



Multiplicación vegetativa por medio de rizomas.

Glosario

yema: brote de una parte de la planta a partir del cual se desarrollan raíces, tallos y hojas, o de donde se generan nuevas ramas, hojas y flores.

Actividades

1. Respondan las siguientes preguntas.

a. ¿Qué relación encuentran entre el modo de reproducción de las bacterias y las epidemias de enfermedades infecciosas?

b. ¿Cómo se reproducen asexualmente los microorganismos?

c. ¿Qué son las esporas? ¿Qué tipos de esporas existen? ¿Qué objetivo tiene la producción de esporas para las bacterias? ¿Y para las algas, hongos, musgos y helechos?

d. ¿Qué diferencia encuentran entre un rizoma, un tubérculo, un estolón y un bulbo?


e. ¿Qué son una raíz tuberosa, un gajo y un propágulo?

f. ¿Cómo logran mantener la población los seres vivos que viven sujetos a un sustrato o cuyas poblaciones son dispersas? Den ejemplos.

La reproducción sexual

Principales eventos en la reproducción sexual en los organismos en los que la cigota desarrolla un embrión.

Tanto los seres humanos, como la mayoría de las plantas y los animales, y algunos microorganismos eucariotas, se reproducen sexualmente. El proceso de unión de las gametas recibe el nombre de **fecundación**, y la nueva célula producto de esta unión se llama **cigota**. Esta cigota se divide hasta convertirse en un nuevo organismo, que es diferente de sus progenitores, pero comparte muchas características con estos.




El ciclo de vida del ser humano es un buen ejemplo para entender el origen de la variabilidad durante la reproducción sexual.

El origen de las diferencias entre progenitores y descendientes

¿Por qué los descendientes no son exactamente iguales a sus progenitores cuando se originan por reproducción sexual? Esto se debe a que los nuevos individuos poseen una nueva combinación de material genético. En el caso de los seres humanos, recibimos la mitad del material genético de cada uno de nuestros padres. Es por eso que nuestros rasgos, como el color de los ojos o la forma de la nariz, son una nueva combinación de los rasgos de ellos. Sin embargo, a pesar de que nuestros hermanos tienen los mismos progenitores, tampoco son exactamente iguales a nosotros.

¿Cuál es la razón por la cual los descendientes de los mismos progenitores originados por reproducción sexual no son exactamente iguales? La respuesta está en el tipo de división celular por el cual se forman las gametas: la **meiosis**. Las células hijas que se originan por meiosis no son iguales a la célula madre. Una de las razones es porque contienen la mitad de su información genética. Por ejemplo, en el ser humano, las células madre de óvulos y espermatozoides tienen 46 cromosomas, al igual que todas las células no reproductivas que forman el cuerpo. Los óvulos y espermatozoides que se originan por meiosis a partir de estas células madre tienen 23 cromosomas. De esta manera, todos los óvulos que forme una mujer a lo largo de su vida tendrán una selección al azar de la mitad de su información genética, y es por eso que serán ligeramente diferentes entre ellos. Como todos los óvulos de nuestras madres y todos los espermatozoides de nuestros padres tienen pequeñas diferencias, sus hijos somos parecidos pero no exactamente iguales.



Diferencias en las gametas y en la fecundación

Los seres vivos que se reproducen sexualmente pueden tener distintos tipos de gametas. Por ejemplo, tanto en los seres humanos como en las plantas, las gametas femenina y masculina son distintas. En estos organismos, la gameta femenina es de mayor tamaño e inmóvil, mientras que la masculina, más pequeña y móvil. En algunos microorganismos eucariotas, como ciertas algas, no es posible diferenciar una gameta masculina y otra femenina, y por eso se las llama “más” y “menos”, para indicar que provienen de diferentes progenitores.

La unión de las gametas puede suceder en el interior del cuerpo de uno de los progenitores o en el medio externo. En el primer caso se habla de **fecundación interna**, como ocurre en el ser humano y en las plantas. En el segundo, la fecundación es **externa**, y es muy común en organismos que habitan en el medio acuático, como los peces y las algas.


Otra de las variantes posibles en la reproducción sexual es si las gametas que se unirán se forman en individuos distintos, como ocurre en el ser humano, o en un único individuo. Ejemplos de este último caso son la lombriz solitaria o los caracoles. Estos animales **hermafroditas** se pueden diferenciar a su vez por el origen de las gametas que se unen. En el caso de la lombriz solitaria, la gameta femenina y la masculina que se unirán proceden del mismo individuo, y se dice que hay **autofecundación**. En cambio en los caracoles, a pesar de ser hermafroditas, hacen falta dos individuos para que ocurra la fecundación. En este caso, la gameta masculina de cada uno de ellos fecunda a la femenina del otro, y por este motivo se dice que tienen **fecundación cruzada**.

Diferencias en el desarrollo de la cigota

La cigota formada luego de la fecundación puede seguir distintos caminos para originar el nuevo individuo. En algunos seres vivos, como ciertas algas, la cigota es una **estructura de resistencia** que, cuando las condiciones son adecuadas, se divide y forma células que serán los nuevos individuos. En los organismos multicelulares, la cigota se divide para formar dos células, que a su vez se dividen para formar cuatro. Estas células continúan dividiéndose hasta formar un **embrión**, que es una estructura multicelular en la que pueden diferenciarse tejidos.

El significado evolutivo de las diferencias en la reproducción sexual

Los seres vivos que se reproducen sexualmente no solo presentan variantes en cuanto a la forma de las gametas, el modo en que se encuentran y el proceso por el cual la cigota origina al nuevo individuo. También pueden diferenciarse en otras características, como la presencia de estrategias para cuidar a los descendientes o para asegurar su dispersión. Por ejemplo, la mayoría de los mamíferos proporcionan un intensivo cuidado a sus crías, pero esto no ocurre en las plantas. Todas estas variantes en el modo en que los seres vivos se reproducen sexualmente son distintas soluciones al desafío de la continuidad de la especie, que han sido exitosas en diferentes condiciones ambientales.



Las gametas de *Chlamydomonas*, un alga verde microscópica, son iguales. Ambas tienen dos flagelos.



La planta diente de león produce semillas que son transportadas por el viento como estrategia para asegurar la dispersión de los nuevos individuos.

Actividades

1. ¿Qué tienen en común todos los organismos que se reproducen sexualmente?
2. Hagan una lista de las variantes en la reproducción sexual que se mencionan en el texto. Indiquen para cada una las opciones posibles.
3. ¿Por qué ningún ser humano es exactamente igual a otro, a excepción de los gemelos?

La reproducción sexual en las plantas con flor

Ciclo floral	Piezas florales que lo componen
Corola	Pétalos
Cáliz	Sépalos
Androceo	Estambres
Gineceo	Carpelos


Ciclos florales y piezas que los componen.

Las **angiospermas** son el grupo de plantas más abundante en la actualidad, y por eso dedicaremos nuestra atención a estudiar algunos de los aspectos más importantes de su reproducción sexual.

La flor: el órgano reproductivo de las plantas angiospermas

Las flores son los órganos de las plantas angiospermas en donde se producen las gametas masculina y femenina, y donde ocurre la fecundación. Se considera que las piezas que forman las flores, como los pétalos, son hojas especializadas en la reproducción y reciben el nombre de **piezas florales**. Se insertan sobre el **receptáculo**, que es la parte superior del **pedúnculo** o eje que une el tallo a la flor. El conjunto de cada tipo de piezas florales se llama **ciclo floral**. Por ejemplo, el conjunto de pétalos forma un ciclo floral llamado **corola**. Muchas flores tienen corolas de colores llamativos, que atraen a los insectos. El ciclo floral que se encuentra por fuera de la corola se llama **cáliz**, y las piezas florales que lo forman, **sépalos**. En la mayoría de las flores, los sépalos son de color verde y más pequeños que los pétalos.

Tanto el cáliz como la corola son ciclos florales estériles, cuya función es proteger a los otros dos ciclos florales fértiles: el androceo y el gineceo. El **androceo** es el ciclo floral masculino, y está compuesto por los **estambres**. Dentro de cada uno pueden diferenciarse dos regiones: la antera y el **filamento** que la sostiene. Las **anteras** se encuentran en la zona superior, son más gruesas y de color amarillo en muchas flores debido a que en ellas se encuentra el polen. Los **granos de polen** son estructuras microscópicas que en conjunto tienen aspecto de polvo. Dentro de su gruesa pared contienen la gameta masculina. El ciclo floral femenino o **gineceo** tiene forma de botella, y está formado por varias piezas florales que se unen, llamadas **carpelos**. En ellos pueden diferenciarse tres regiones: la zona superior, o **estigma**, el cuello de la botella, que se llama **estilo** y la base, donde se encuentran los óvulos, y se denomina **ovario**. Dentro de los óvulos se ubica la gameta femenina. Algunas flores presentan los cuatro ciclos florales, como la rosa china, pero en otras puede estar ausente alguno.



Esquema de una flor en el que se señalan las piezas florales que la componen, el receptáculo y el pedúnculo que la sostiene.

La polinización

¿Cómo hace la gameta masculina de las plantas, contenida en el grano de polen, para llegar hasta la gameta femenina, contenida dentro del óvulo? Este es un proceso complejo, ya que los granos de polen no se desplazan por sí mismos, como los espermatozoides. Si bien muchas angiospermas tienen flores con los dos sexos (hermafroditas) o flores masculinas y femeninas dentro de la misma planta, es común que haya mecanismos para evitar la autofecundación. Por ejemplo, en la misma planta, las anteras pueden madurar antes que los óvulos. Es por esto que en casi todas las plantas, los granos de polen deben viajar hasta el gineceo de otras flores de la misma especie para que luego tenga lugar la fecundación. Este transporte de los granos de polen desde las anteras hasta el estigma recibe el nombre de **polinización**.

Existen distintos agentes externos a las flores que aseguran el transporte de los granos de polen. Estos **agentes polinizadores** pueden ser abióticos como el agua y el viento, o bióticos, como los animales. Las características de las flores están muy fuertemente asociadas al tipo de agente polinizador que asegura su fecundación. Por ejemplo, aquellas angiospermas cuyos granos de polen son transportados por las abejas, contienen néctar, son de color amarillo, violeta o azul, y tienen una superficie donde el animal puede posarse y un aroma que las atrae. El néctar y el polen son la recompensa que las abejas obtienen al visitar las distintas flores. Durante estas visitas, su lomo se “mancha” con granos de polen, y allí es trasladado a otras flores. El color rojo, que no es diferenciado por las abejas, sí es atractivo para las aves, como los colibríes. Las flores que visitan las aves, además de ser en general rojas, poseen un tamaño mayor que las que frecuentan las abejas, cuelgan hacia abajo y carecen de perfume.


Las flores de muchos árboles y pastos son poco vistosas, pequeñas y muy numerosas. Sus anteras y estigmas suelen ser de gran tamaño y sobresalir por fuera del resto de las piezas florales. Este tipo de flores es polinizado por el viento. Así, la exposición de los órganos sexuales en una gran cantidad de flores permite asegurar que el viento arrastre el polen desde las anteras hasta los estigmas.

Esta aparente coincidencia entre la forma de las flores y su tipo de polinización no es una casualidad, sino el resultado de procesos evolutivos. Las plantas con flores y sus polinizadores han influenciado su evolución mutuamente, es decir, han **coevolucionado**. Por ejemplo, el desarrollo de “pistas de aterrizaje” en ciertas flores podría haber favorecido a una determinada población de abejas que aprovechara este recurso para obtener néctar. A su vez, esta población de abejas podría haber preferido a las flores violetas por sobre las anaranjadas, y así haber favorecido a esta primera variante. Las especies que coevolucionan suelen ser muy dependientes. Esto ocurre con muchas angiospermas y sus polinizadores. Por ejemplo, las abejas dependen de las flores para subsistir y, a su vez, estas plantas dependen de la acción de las abejas para poder reproducirse.

Colibrí polinizando flores de coralillo (*Hamelia patens*) de color rojo y tubulares.

Curiosidades ►

Una colmena con 60.000 abejas puede llegar a tener unas 25.000 recolectoras de polen. Esto permite hacernos una idea de la importancia que tiene esta actividad para la subsistencia de la colmena.



Anteras amarillas y estigmas plumosos violetas sobresaliente de cada una de las pequeñas y verdes flores de una especie de pasto.



Abeja polinizando una flor de color amarillo y con pétalos que funcionan como superficie de apoyo.



Actividades experimentales

Características de las flores y su relación con los polinizadores

La presencia o ausencia de los cuatro ciclos florales y la cantidad de piezas que los forman son características que distinguen a las flores. También es importante si las piezas florales se encuentran soldadas o sueltas, particularidades del ovario que se observan con lupa (como la cantidad de óvulos que contiene), o la simetría (pueden ser asimétricas, o tener simetría radial o bilateral). Por otro lado, ciertas características de las flores, como su color, tamaño o perfume, nos permiten deducir cuál es su posible agente polinizador. El objetivo de esta actividad experimental es analizar las distintas piezas florales que componen a las flores y otras características que estén relacionadas con su polinización.

Necesitan:

- ▶ flores
- ▶ trincheta
- ▶ pinzas de punta fina o agujas
- ▶ lupa
- ▶ hojas lisas para dibujar (tamaño A4 u oficio)
- ▶ lápiz negro

Paso 1. Preparen su hoja para hacer el informe de la experiencia. Para esto, escriban el título y el objetivo y copien las tablas. En ellas volcarán la información obtenida en cada paso.

Paso 2. Observen qué tipo de simetría tiene la flor, su tamaño y si presenta perfume o no.

Paso 3. Identifiquen y cuenten los sépalos y pétalos.

Observen su color, y si están sueltos o soldados.

Paso 4. Identifiquen y cuenten los estambres.

Distingan dentro de cada estambre la antera y el filamento. Las anteras, ¿son pequeñas o grandes respecto de las otras piezas florales?

Paso 5. Separen un estambre y sacúdanlo suavemente sobre una hoja de papel para obtener granos de polen. Obsérvenlos con la lupa.

Paso 6. Identifiquen el gineceo, y diferencien el estigma, el estilo y el ovario. Observen si el estigma es más grande o pequeño que las anteras, si es coloreado o tiene algún tipo de sustancia pegajosa.

Paso 7. Separen el gineceo y realicen un corte longitudinal utilizando la trincheta. Observen con la lupa e intenten distinguir los óvulos.

Paso 8. Realicen esquemas en los que se muestren las piezas florales que observaron. Rotulen cada uno de los ciclos florales, las piezas que los componen, y las secciones que identificaron en los estambres y en el gineceo. Si pudieron observar los granos de polen y los óvulos, realicen también un esquema de estas estructuras.

Paso 9. Analicen qué tipo de agente polinizador podría tener esta flor, basándose en las características que pudieron observar. Incluyan esta explicación en su informe.

Piezas florales	¿Están presentes?	Cantidad en la flor	¿Están soldadas o sueltas?	Características (color, tamaño)
Pétalos				
Sépalos				
Estambres				
Carpelos				

Características generales de la flor	
Tamaño	
Simetría	
Perfume	


La formación de las semillas y los frutos

Una vez que el grano de polen llega al estigma, comienza a producir el **tubo polínico**. Esta prolongación del grano de polen en forma de tubo crece en el interior del estilo hasta alcanzar el ovario. Cuando entra en contacto con un óvulo, descarga en su interior la gameta masculina. Así, la gameta masculina fecunda a la femenina que se encuentra dentro del óvulo.

Luego de que ocurre la fecundación, comienza a formarse la **semilla** a partir del óvulo. La cigota que quedó contenida dentro del óvulo se divide y origina el embrión. Los tegumentos* del óvulo se convierten en los tegumentos que cubren la semilla, y las otras células que estaban en su interior, en las sustancias de reserva. Todas las semillas tienen tres componentes: el **embrión**, que generará la nueva planta cuando germe, los **tegumentos** que lo protegen y las **sustancias de reserva** que lo alimentarán hasta que pueda comenzar a fotosintetizar. Algunas semillas, como la del poroto, pueden contener las sustancias de reserva dentro de las hojas del embrión o **cotiledones**.

Al mismo tiempo que el óvulo se va transformando en la semilla, las paredes del ovario comienzan a engrosarse hasta que se convierten en el **fruto**. Los pétalos, sépalos y estambres se marchitan y caen. El fruto queda unido a la planta por medio del pedúnculo floral, a través del cual recibe nutrientes para completar su desarrollo. A veces es posible reconocer restos de los estigmas en el extremo opuesto al pedúnculo.

Dentro de la pared del fruto, llamada **pericarpo**, se encuentran protegidas las semillas. Los frutos pueden dividirse en dos grandes grupos, de acuerdo con la consistencia del pericarpo. Los frutos **secos**, como en las legumbres, el girasol o el jacarandá, tienen un pericarpo leñoso o membranoso, y contienen poca agua. En cambio en los **carnosos**, como la naranja, la manzana o el tomate, es más grueso y húmedo. A su vez, en el pericarpo de los frutos carnosos se pueden diferenciar tres capas o zonas. La externa se denomina **exocarpo**, la intermedia **mesocarpo** y la interna **endocarpo**. Algunos frutos carnosos presentan una única semilla, que está protegida por un endocarpo leñoso muy duro. Esta estructura es la que comúnmente se llama **carozo**.




Formación del tubo polínico.

Glosario


tegumento: tejido que cubre ciertos órganos de las plantas, en especial, los óvulos y las semillas.

Actividades

1. Respondan las siguientes preguntas.
 - a. ¿Cómo llega la gameta masculina a la femenina en las plantas?
 - b. ¿Dónde ocurre la fecundación?
 - c. ¿Qué estructuras típicas de las angiospermas se forman después de la fecundación a partir de los óvulos y de las paredes del ovario?
 - d. ¿Cuáles son los tres componentes de una semilla y cuál es la función de cada uno?
 - e. ¿Qué es el pericarpo y cuál es su función?
 - f. ¿Qué tipo de fruto es la nuez? ¿Y la banana? Justifiquen.



Corte transversal de la naranja, en el que pueden distinguirse un exocarpo membranoso, un mesocarpo esponjoso (que forma la cáscara) y un endocarpo jugoso.



Corte longitudinal de un fruto de girasol.

Dispersión y germinación de la semilla

Glosario

vida latente: detención temporal del ciclo de vida de algunas especies caracterizadas por una notable disminución del metabolismo.

Las semillas contienen en su interior el embrión, que originará una nueva planta cuando las condiciones externas sean favorables. Las semillas no germinan inmediatamente, sino que son formas de vida latente*, como las esporas de los microorganismos. Este “tiempo de espera” no solo resulta ventajoso para asegurar que la nueva generación se desarrolle en un ambiente propicio para sobrevivir, sino que también permite la dispersión.

La **dispersión de las semillas** y de los frutos que las contienen favorece la conquista de nuevos ambientes. El desarrollo de las nuevas plantas en zonas alejadas de sus progenitores evita la competencia por la luz y los nutrientes y, de este modo, aumenta también su probabilidad de supervivencia.

Actividades experimentales

Observación de frutos y semillas

El objetivo de esta actividad experimental es reconocer los componentes de los frutos y las semillas, y clasificar distintos tipos de frutos de acuerdo con la consistencia del pericarpo.

Necesitan:

- ▶ una fruta con muchas semillas (como la naranja o el tomate)
- ▶ una fruta con carozo (como la ciruela)
- ▶ semillas de girasol
- ▶ porotos
- ▶ vaso con agua
- ▶ bandeja de plástico
- ▶ trincheta
- ▶ pinzas de punta fina o agujas
- ▶ lupa
- ▶ hojas lisas para dibujar
- ▶ lápiz negro

Sugerencias: elijan tres o cuatro tipos de frutos distintos, y tengan al menos dos ejemplares de cada uno.

Paso 1. Coloquen los porotos en el agua dentro del vaso. Preparen su hoja para hacer el informe de la experiencia, escribiendo el título y el objetivo.

Paso 2. Selecciónen un fruto para comenzar. Reconozcan el pericarpo y de qué tipo de fruto se trata (seco o carnoso). Si es un fruto carnoso, realicen un corte transversal y reconozcan el exocarpo, el mesocarpo y el endocarpo. Si es un

fruto seco, traten de romper el pericarpo e identificar las semillas. Observen si el fruto contiene una semilla o muchas.

Paso 3. Realicen un esquema del fruto en el que señalen el pericarpo, sus capas, si es un fruto carnoso, las semillas y algún resto de las piezas florales. Aclaren en el esquema qué fruto están dibujando, cómo se clasifica y otra información adicional, como la cantidad de semillas.

Paso 4. Repitan el procedimiento con los otros dos frutos.

Paso 5. Realicen un corte longitudinal de la semilla de poroto. Reconozcan los tegumentos y el embrión. Dentro del embrión, identifiquen los cotiledones, y los futuros tallo y raíz.

Paso 6. Realicen un esquema del corte longitudinal de la semilla de poroto. Señalen las estructuras que reconocieron.



La falta de abejas afectará la producción de alimentos a nivel mundial

Uno de los grupos activistas a favor del medio ambiente más importante en los Estados Unidos, llamado *Natural Resources Defense Council* (NRDC, en español sería traducido como el Consejo por la Defensa de los Recursos Naturales) fundado en 1970 y con más de 1,4 millones de miembros, asegura que la escasez de abejas afectará la producción mundial de alimentos. A mí también me sorprendió ese dato pero, ¿por qué las abejas (*Apis mellifera*) son fundamentales en este caso?

La Argentina es uno de los países que más miel producen en el mundo, junto con Estados Unidos, China y México. La mayoría de la producción nacional se exporta. Es evidente que las abejas son necesarias para producir miel, pero lo que más llama la atención es cómo este insecto es clave para la producción de otros alimentos.

Los pesticidas* revolucionaron la agricultura durante décadas y,

junto con los avances biotecnológicos*, incrementaron de manera exponencial la producción de alimentos a nivel mundial. Pero los pesticidas también están provocando un problema dramático en el ecosistema al causar la desaparición de abejas. El efecto negativo de estos compuestos químicos fue publicado en varios estudios científicos recientes. Además de los pesticidas, el calentamiento global, las alteraciones en el hábitat y los parásitos colaboran en la falta de abejas a nivel mundial.

Las abejas no solo son insectos que producen miel, sino que también son responsables de la polinización cruzada (transporte del polen de una planta a otra, posibilitando la fertilización de dichas plantas) del 30% de los cultivos mundiales, que incluyen almendras, brócoli, cebolla, cítricos (limón, lima, naranja), palta y zanahoria, entre otros.



Las abejas son agentes polinizadores de plantas de importancia económica.

Estos insectos, además de tener un rol biológico/natural en la producción de alimentos, según un informe del NRDC, generan más de US\$15 billones de dólares por año en los Estados Unidos gracias a la polinización cruzada en estos cultivos.

Se estima que en los Estados Unidos desapareció un tercio del total de abejas. Aunque parezca una exageración, este es un problema serio, y en algunos países ya están trabajando para solucionarlo en el corto y mediano plazo.

Diario Clarín, 30/05/2015. (Adaptación).


Actividades

1. Luego de leer el artículo, resuelvan las siguientes consignas.
 - a. ¿Qué plantas de importancia económica polinizan las abejas?
 - b. ¿Qué factores están provocando una disminución del tamaño de las poblaciones de abejas?
 - c. ¿Por qué esta disminución es un problema serio para el ser humano?
 - d. ¿Cuál piensan que es la importancia de este problema para nuestro país? Justifiquen.
 - e. Propongan algún tipo de acción que podría tomarse para evitar la disminución del tamaño de las poblaciones de abejas.

Glosario

- biotecnología:** uso de organismos vivos o partes de ellos para la producción de bienes y servicios útiles para el ser humano.
- pesticida:** sustancia química empleada por el ser humano para controlar o eliminar algunos seres vivos que perjudican los cultivos.

Reproducción sexual en animales



Despliegue del plumaje como parte del cortejo en pavos reales.

Glosario

espermatóforo: estructura en forma de "bolsa" formada por el macho, que contiene y protege los espermatozoides, y puede ser depositada en el suelo o transferida a la hembra.

órgano copulador: es el órgano externo de un individuo masculino que se ha especializado para entregar el esperma durante la cópula.

oviducto: conducto que une los ovarios con el exterior del cuerpo.

Algunos animales, como esponjas, corales, anélidos, gusanos chatos y estrellas de mar pueden reproducirse asexualmente, pero también lo hacen sexualmente. En los demás animales, solo la reproducción sexual garantiza la supervivencia y continuidad de la especie.

Encuentro de gametas: fecundación interna y externa

Las gametas femeninas y masculinas que forman los animales durante la reproducción poseen ciertas características que las hacen distintivas. La gameta femenina, el **óvulo**, es de mayor tamaño, ya que guarda sustancias de reserva que servirán para alimentar al embrión, y no posee movimiento. Las gametas masculinas, los **espermatozoides**, en cambio, son de menor tamaño y se mueven muy rápido. Los espermatozoides nadan para llegar al óvulo y, por lo general, se producen muchos espermatozoides para que aumenten las chances de encuentro entre ellas.

Los animales pueden liberar sus gametas al agua y que la fecundación ocurra fuera del cuerpo de la hembra o pueden ser liberadas dentro de ella. Los animales acuáticos, como los anfibios y peces, tienen **fecundación externa**, ya que el encuentro de sus gametas se produce en el agua. Este tipo de seres vivos libera una gran cantidad de gametas para garantizar que ocurra la fecundación. Por otro lado, los animales aeroterrrestres, como muchos de los reptiles, las aves y los mamíferos, tienen **fecundación interna**, ya que la unión de las gametas ocurre dentro del cuerpo de la hembra. Para ello, los espermatozoides deben ingresar por un oviducto* hasta llegar al ovario, donde se encuentran los óvulos. Para facilitar que los espermatozoides lleguen al óvulo, muchos de los machos poseen un órgano copulador* que inyecta los espermatozoides dentro del oviducto. Otros poseen espermatóforos* que los introducen directamente en el oviducto de la hembra, como es el caso de muchos invertebrados, entre ellos el calamar.

Cortejo y apareamiento

La reproducción sexual con fecundación interna involucra el **apareamiento** o encuentro sexual entre los individuos de una misma especie. El apareamiento es la unión de la hembra y el macho, que culmina en la cópula. La **cópula** es el contacto directo entre sus órganos sexuales para procrear un nuevo individuo. La mayoría de los animales inician sus relaciones de apareamiento durante ciertos momentos, llamados "celo", en los que las hembras están predispuestas para la cópula. Durante este período comienzan una serie de rituales complejos por parte de los machos que involucran un lenguaje de gestos, movimientos, danzas, hinchaón del cuerpo, despliegue de plumas o sonidos potentes, entre otros. Por ejemplo, el cortejo en los elefantes comienza con una pelea y termina en un abrazo, los sapos cantan, los pavos reales despliegan sus coloridos plumajes y se iluminan los vientres en algunos peces macho con colores vistosos. A estos rituales se los conoce como **cortejo** y su finalidad es que los participantes se reconozcan y evalúen la conveniencia de aparearse el uno con el otro.

Actividades

1. ¿Cómo son las gametas en los animales? ¿Por qué es necesario producir mayor cantidad de gametas masculinas?
2. ¿Qué tipos de fecundación existen? ¿Qué relación encuentran entre el tipo de fecundación y el hábitat de los animales?

Dimorfismo sexual y selección sexual

En algunas especies de animales es difícil reconocer a simple vista a los individuos de distinto sexo. En otras, los machos y las hembras tienen **dimorfismo sexual**, es decir, se distinguen por poseer características físicas diferentes, por ejemplo, su tamaño, el color de su plumaje, el tamaño de la melena, o la presencia de crestas o cuernos, entre otras. Existe dimorfismo sexual entre el gallo y la gallina, el toro y la vaca, el hombre y la mujer, y entre muchas otras especies de animales, y es el resultado de una **selección sexual** o lucha entre los miembros de un sexo (por lo general, los machos) por la conquista de la hembra. Durante la elección de la pareja, la hembra selecciona activamente a su pareja prefiriendo a los individuos que tienen más desarrolladas ciertas características, como plumajes vistosos, grandes cuernos, o que desarrollan cantos y bailes atractivos. En muchos casos, estos atributos con fines sexuales no resultan adaptativos ya que aumentan su exposición ante los depredadores, y es por esta razón que Darwin le dio el nombre de selección sexual.



El león y la leona son un ejemplo de una especie con dimorfismo sexual.

Protección y nutrición del embrión: huevos y placenta

Una vez producida la fecundación, la célula huevo o cigota, gracias a las reservas nutritivas presentes en la gameta femenina y a través de sucesivas divisiones celulares, forma el embrión. Para desarrollarse, el embrión necesita nutrientes y protección. Los animales con fecundación externa, como la mayoría de los anfibios y peces, protegen al embrión dentro de **huevos**. A este tipo de animales se los conoce como **ovulíparos**. En la mayoría de los reptiles y aves, que poseen fecundación interna, la hembra (una vez fecundada) deposita los huevos en un nido. Los huevos poseen todos los nutrientes necesarios para que se desarrolle el embrión. Este tipo de animales son llamados **ovíparos**. Algunos animales, como los tiburones, alacranes y serpientes, conocidos como **ovovivíparos**, protegen el huevo dentro del cuerpo de la madre hasta que complete su desarrollo. En la mayoría de los mamíferos, que son **vivíparos**, los embriones se desarrollan dentro del cuerpo de la madre. En el caso de los **placentarios**, el embrión se desarrolla dentro del útero materno, allí el embrión se comunica con su madre a través de la placenta. A partir de esta le llegan los nutrientes al embrión mediante el cordón umbilical*. En otros mamíferos, llamados **marsupiales**, como el canguro o la comadreja, el embrión comienza su desarrollo en el útero materno y completa gran parte del crecimiento sujeto a las glándulas mamarias del interior de la bolsa marsupial o marsupio en el abdomen de la madre.



En los mamíferos, el embrión se alimenta de los nutrientes presentes en la sangre materna a través de la placenta.

Glosario

cordón umbilical: conducto flexible que une la placenta de la madre con el ombligo del embrión.

Actividades

1. ¿Qué son la selección sexual y el dimorfismo sexual? ¿Qué provoca en los machos? Den ejemplos.
2. ¿Cómo protegen a sus embriones los animales ovulíparos y los ovíparos? ¿Y los ovovivíparos y los vivíparos?



Desarrollo indirecto en los anfibios.

Glosario

larva: embrión de los animales con desarrollo indirecto que se encuentra en la primera etapa de su desarrollo.

tamorfosis. Casi todos los invertebrados y algunos anfibios pasan por una etapa de su ciclo de vida en forma de larva. La larva no solo tiene un aspecto muy diferente al del animal adulto, sino que también ocupa hábitats totalmente distintos. Además, casi todas las larvas se alimentan de organismos diferentes a los que comerán como adultos. Por ejemplo, las larvas acuáticas de los anfibios, los renacuajos, son principalmente herbívoras, pero el sapo adulto, que es aeroterrestre, se alimenta de insectos. Muchos insectos pasan la mayor parte de su vida como larvas mientras que los adultos solo viven unos pocos días, que aprovechan para reproducirse y casi no se alimentan.

Desarrollos directo e indirecto

Los reptiles, aves y mamíferos nacen como "adultos en miniatura" en un proceso llamado **desarrollo directo**. Sin embargo, para las demás especies animales, el desarrollo indirecto es lo más común. En el **desarrollo indirecto**, el animal juvenil sale del huevo en forma de larva* y luego de una transformación llamada **metamorfosis** se convierte en un animal adulto. La transformación de una oruga en mariposa o la de un renacuajo en sapo son ejemplos de me-



Los mamíferos invierten mucho tiempo y energía en el cuidado de sus crías.

Cuidado de las crías

El **cuidado parental** es la manera en que los animales protegen a sus crías. Es una inversión de tiempo, energía y recursos por parte de uno o ambos progenitores a su descendencia a fin de garantizar su supervivencia. La gran mayoría de los invertebrados, algunos anfibios y los reptiles no cuidan a sus crías y los huevos se desarrollan por sí solos. Sin embargo, existen excepciones como ocurre en algunas especies de ranas, en las que el macho cuida los huevos y cuando los renacuajos nacen, los transporta en su espalda. Los cocodrilos, por ejemplo, transportan a sus crías dentro de su boca para protegerlos de los depredadores. Las aves y los mamíferos, por otra parte, hacen grandes esfuerzos para incrementar las posibilidades de supervivencia de sus crías, protegiéndolas de los depredadores, la falta de alimento, la deshidratación y otra serie de peligros.

En los casos en los que no existe cuidado parental, es necesario que el número de crías que se producen sea mayor para asegurar que al menos algunas sobrevivan. Esto se debe a que, al no estar protegidas ni alimentadas, la mayoría muere al poco tiempo de vida. En las especies de animales en las que existe cuidado parental, el número de crías es menor ya que se invierte mucha energía en su cuidado y las chances de que sobrevivan son mayores.

Actividades

1. ¿Qué diferencias encuentran entre el desarrollo directo y el indirecto?
2. ¿Qué diferencias hay entre la larva y el adulto?
3. ¿Cómo se llama el proceso por el cual las larvas sufren cambios importantes en su forma corporal para

- transformarse en adultos? Den un ejemplo.
4. ¿Qué es el cuidado parental y cuál es su finalidad?
5. ¿Qué relación encuentran entre la cantidad de descendencia que dejan los animales que no cuidan a sus crías y los que sí lo hacen? ¿Por qué?

Actividades experimentales



Metamorfosis de anfibios

Los renacuajos son las larvas de las ranas y sapos, un grupo de anfibios que incluye aproximadamente 6.500 especies distintas. Viven exclusivamente en el medio acuático y poseen características diferentes a los adultos, que también pueden habitar en los ambientes aeroterrrestres. Su metamorfosis puede ser corta, menor a un mes en ranas del desierto, o requerir varios años, como es el caso del sapo toro. Durante este tiempo, los animales crecen y sufren grandes transformaciones, que incluyen la desaparición de las branquias, la aparición de las extremidades anteriores y posteriores y, al final, la desaparición de la cola. El objetivo de esta actividad experimental es registrar el proceso de metamorfosis de las ranas o los sapos.

Necesitan:

- ▶ renacuajos o huevos de ranas o sapos
- ▶ una pecera
- ▶ agua declorada
- ▶ piedras
- ▶ arena
- ▶ alimento para los renacuajos

Los renacuajos o los huevos pueden ser comprados en acuarios o ser recolectados en ambientes naturales. Pueden utilizar como alimento lechuga hervida, escamas para alimentar peces o algún otro que les sugieran en el comercio especializado. Asegúrense de que el alimento esté cortado en fragmentos pequeños. Para obtener agua declorada, dejen reposando agua de la canilla en un recipiente durante uno o dos días a la luz. También puede utilizarse el agua de donde se trajeron los renacuajos o agua de lluvia.

Paso 1. Busquen información sobre la especie que van a observar. Averigüen especialmente si requiere algún tipo de cuidado en particular, por ejemplo, cierta temperatura mínima, o cuánto tiempo aproximado debería durar su metamorfosis.

Paso 2. Preparen el hábitat para los renacuajos. Llenen la pecera hasta las tres cuartas partes de su volumen con agua. Coloquen arena limpia en el fondo de la pecera y las piedras formando una



Los renacuajos se pueden encontrar en charcos poco profundos, pantanos o cuerpos de agua estancados, como piletas. Sobre todo en primavera, que es la época de apareamiento.

montaña que sobresalga del agua en un extremo (servirán de piso para los adultos desarrollados). Si es posible, ubiquen la pecera en un lugar con una temperatura de entre 15 y 20 °C.

Paso 3. Transfieran los renacuajos o huevos a la pecera (cada renacuajo necesitará aproximadamente 4 litros de agua). Cada dos o tres días alimenten a los renacuajos y limpien la pecera, sacando los restos de alimentos anteriores. Si el agua está turbia u olorosa, reemplacen entre el 30 al 50% con nueva agua declorada.

Paso 4. Registren todos los cambios que observen cada vez que alimenten a los renacuajos. Para esto, anoten en un cuaderno o planilla el tamaño, la presencia de patas delanteras y traseras, cola, branquias, etcétera. Consideren como día "0" a aquel en el que se inició el experimento, y numeren en forma consecutiva los siguientes días. Tomen fotografías de estos cambios.

Paso 5. Una vez que la metamorfosis se haya completado, devuelvan los adultos a su ambiente natural.

Paso 6. Elaboren un informe en el que se muestren todos los datos recolectados de manera sintética. Incluyan una introducción en la que se repasen las principales características de la reproducción de este grupo de organismos.

Por primera vez nacen tres llamas de embriones refrigerados

Los embriones de llamas no resisten el proceso de criopreservación (almacenamiento a muy bajas temperaturas para poder ser utilizados cuando se requieran). Es por esto que la reproducción de esta especie solo era posible hasta ahora con embriones frescos, es decir, recién obtenidos. Ahora, gracias al trabajo de los técnicos del INTA Abra Pampa, Jujuy y Balcarce, Buenos Aires, tres llamas nacieron de embriones conservados en una heladera durante 24 horas.

Juan Aller, especialista del INTA Balcarce y uno de los técnicos involucrados en el desarrollo, junto con Marcos Ábalos y Francisco Acuña del INTA Abra Pampa destacó el logro por tratarse de la “primera vez en que, mediante un ensayo que consistió en refrigerar los embriones durante 24 horas en una heladera a una temperatura de 5 °C, se obtuvieron tres crías con éxito”.

“Hasta este momento señaló Aller solo se habían transferido embriones en fresco, es decir que una vez obtenidos eran inmediatamente transferidos a las hembras receptoras, y no congelados”.

De acuerdo con el especialista de Balcarce, en otras especies domésticas, como las vacas o las ovejas, es común el uso de técnicas de **reproducción asistida** porque permiten aumentar la capacidad de reproducirse de los ejemplares que son más interesantes para la producción. La reproducción asistida incluye un conjunto de métodos biomédicos que facilitan o sustituyen los procesos naturales que se dan durante la reproducción. Las técnicas más utilizadas en las especies ganaderas son la inseminación artificial, la superovulación y la transferencia de embriones. La



Cría de llamas con embriones refrigerados en Jujuy.

inseminación artificial consiste en el depósito de los espermatozoides del macho en la hembra mediante instrumental especializado. En la **superovulación** se estimula la producción de una gran cantidad de óvulos mediante la ingesta de las hembras de sustancias especiales para este fin. Finalmente, la **transferencia de embriones** consiste en la introducción de embriones en el útero de la hembra que se originaron previamente fuera de su cuerpo.

Para el caso de las llamas, las técnicas más usadas son la superovulación y la transferencia embrionaria en fresco. Así, se obtienen en promedio de dos a tres embriones por cada llama superovulada. Estos embriones se transfieren a otras tres hembras en condiciones de llevar adelante la gestación. “Esto demandaba tratamientos inmediatos o en espacios geográficos limitados a los que se podía arribar en menos de 6 horas manteniendo los embriones a temperatura ambiente”, indicó Aller.

Diario Clarín, 24/04/2015. (Adaptación).

Actividades

1. La crioconservación de embriones es una técnica de fertilización asistida. ¿Para qué se aplican estas metodologías en los animales de interés comercial, como las vacas o las llamas?
2. ¿Qué aspectos de la cría de llamas permitirá mejorar el trabajo de los técnicos del INTA?
3. Investiguen cuáles son las ventajas de cada una de las técnicas de fertilización asistida mencionadas que permiten aumentar la producción animal.

Las ventajas adaptativas de cada tipo de reproducción

En la reproducción asexual, las células hijas son idénticas a la célula madre ya que el material genético de una pasa a las otras sin modificaciones. Esto ocurre por los mecanismos de **fisión binaria** (en organismos procariotas) o de **mitosis** (en organismos eucariotas). Estos tipos de división celular son simples y pueden completarse en poco tiempo. Es por esto que la reproducción asexual es un proceso por el cual se puede originar una gran cantidad de descendientes en un breve intervalo de tiempo. Algunas bacterias pueden generar otras iguales en 20 minutos, mientras que hay levaduras que pueden hacerlo en unas pocas horas.



Escherichia coli es una eubacteria que, en las condiciones adecuadas, puede generar otras bacterias idénticas en 20 minutos.

El tiempo requerido para originar células sexuales es más elevado. La producción de un espermatozoide humano, por ejemplo, tarda aproximadamente 90 días. Esto se debe a que el tipo de división celular que ocurre durante la reproducción sexual, la meiosis, es más complejo que la mitosis. ¿Cuál será la ventaja de este tipo de división celular más costoso? Las células hijas que se originan por meiosis no son iguales a la célula madre, es decir, este mecanismo de división celular genera **variabilidad**.

La variabilidad en las características de los individuos que se reproducen sexualmente no solo está dada por la meiosis, sino también por la unión de gametas que provienen de distintos progenitores. El encuentro de estos progenitores es otra tarea que implica un gran gasto de energía y recursos para muchas especies. La selección sexual en los animales o la producción de flores con vistosos colores y néctar que atraen a los polinizadores en las plantas, son algunos ejemplos de las costosas estrategias que tienen los seres vivos para garantizar la fecundación.

¿Por qué los seres vivos que se reproducen sexualmente destinarán tanta energía y recursos a cambio de que sus descendientes presenten algunos cambios respecto de los progenitores? La variabilidad en los individuos de una población es fundamental para asegurar la continuidad de las especies en los siempre cambiantes ambientes naturales. Al existir organismos diferentes en una población, se incrementa la probabilidad de que parte de la población sobreviva cuando ocurren cambios en el ambiente. Si todos los individuos fueran iguales, cualquier modificación ambiental que afectara la supervivencia eliminaría a la población completa.

Actividades

1. ¿Qué tipo de división celular está implicado en la reproducción sexual? ¿Y en la asexual?

2. Completén el siguiente párrafo con el tipo de reproducción (sexual o asexual) que corresponda.

La ventaja adaptativa que proporciona la reproducción a las especies es que permite obtener una gran cantidad de descendientes en tiempos cortos. En cambio, la reproducción implica tiempos más largos y mayores costos, pero genera variabilidad en las poblaciones.

3. Algunos animales, como las estrellas de mar, pueden reproducirse tanto sexual como asexualmente.

a. ¿En qué condición piensan que ocurrirá cada tipo de reproducción?

b. ¿Cuál de los dos tipos de reproducción piensan que es más ventajoso para asegurar la continuidad de estos animales? Justifiquen.



Los individuos de la mariposa del abedul (*Biston betularia*), que se reproducen sexualmente, pueden presentar diferencias en su aspecto. La variante más oscura fue la única en sobrevivir al aumentar la contaminación ambiental en Inglaterra a finales del siglo XVIII.



Los musgos son un ejemplo de estrategas r.



El roble es un ejemplo de estrategas K.

Estrategias reproductivas r y K

Los seres vivos que habitan en ambientes cambiantes, como un charco que se seca o una roca desnuda, tienen un modo de reproducción, desarrollo y tiempo de vida diferentes de aquellos que viven en ambientes relativamente estables, como las selvas, bosques y lagos. Por ejemplo, las ranas que habitan en charcos pequeños tienen tiempos de metamorfosis cortos, mientras que en las ranas que viven en cuerpos de agua más estables, como las lagunas, este proceso demora mucho más. Estos tipos de com-

portamiento, reproducción y desarrollo llevados a cabo por las poblaciones de individuos, que están fuertemente relacionados con el ambiente en el que viven, reciben el nombre de **estrategias reproductivas**.

Aquellos seres vivos que habitan en ambientes que perduran poco tiempo son llamados **estrategas r**. Estos organismos suelen ser pequeños y alcanzan la madurez en poco tiempo. Crecen rápido y tienen una vida corta, en la que dejan muchas crías a las que dedican poca o ninguna energía. Tienden a ser oportunistas*, con una gran capacidad de dispersarse invadiendo nuevos ambientes, adaptándose a estos con facilidad y ocupándolos con rapidez. En este grupo se encuentran las plantas anuales* que crecen, se reproducen y mueren, la mayoría de los insectos, las tortugas, los sapos y los conejos.

Los **estrategas K**, por otra parte, están mejor adaptados a los ambientes estables, crecen más lentamente, son más grandes, tardan en llegar a la madurez, tienden a vivir durante un tiempo mayor, poseen períodos reproductivos más largos y generalmente más de uno durante su ciclo de vida. Tienen pocas crías, a las que les dedican tiempo y energía. Por lo general no invaden nuevos ambientes y tienen una menor capacidad de dispersión dado que al vivir en ambientes estables, no se justifica el riesgo de abandonarlo en busca de otro ambiente. Entre los estrategas K se encuentran las plantas perennes* y la mayor parte de los mamíferos.

El papel que cumplen los estrategas r en los ecosistemas es colonizarlos en las primeras etapas de su desarrollo. Por ejemplo, en un bosque quemado, las primeras especies que aparecen suelen ser estrategas r. Estas crecen rápidamente y llegan a formar grandes poblaciones pero luego son desplazadas por especies cuya estrategia es K. Estas últimas presentan un crecimiento poblacional más lento, sin embargo su habilidad competitiva es mucho mayor.

Actividades

1. Confeccionen un cuadro comparativo entre las estrategias reproductivas r y K que incluya los siguientes ítems: tipo de ambiente que habitan, velocidad de crecimiento, tamaño corporal, duración del ciclo de vida, cantidad de períodos reproductivos, cantidad de crías, cuidado parental, capacidad de colonización de nuevos ambientes, formación de estructuras de dispersión, ejemplos de seres vivos que presenten cada estrategia reproductiva.
2. ¿Qué papel cumplen los estrategas r en los ecosistemas? ¿Y los estrategas K?

Para conocer más

Begon, M. y J. L. Harper, *Ecología. De los individuos a los ecosistemas*, Barcelona, Editorial Omega, 2000.

Curtis, H., Barnes, S., Schnek, A. y A. Massarini, *Curtis*.

Biología, Madrid, Editorial Médica Panamericana, 2008.

Valla, J. J., *Botánica. Morfología de las Plantas Superiores*, Buenos Aires, Editorial Hemisferio Sur, 2015.

Orquídeas pintadas en óleo y en láminas giclée

Las orquídeas son una familia de plantas con flor que incluye aproximadamente 25.000 especies. Estas plantas se distinguen por la complejidad de sus flores, que tienen simetría bilateral y uno de sus pétalos internos muy desarrollado. Este pétalo especial puede tener áreas brillantes, crestas y otras protuberancias* que sirven como guías para los polinizadores. Las formas, colores y fragancias fascinantes de las orquídeas son el resultado de su coevolución con los animales polinizadores. Tal es la belleza de estas flores, que han sido apreciadas y cultivadas por los seres humanos desde la Antigüedad. Luego de la conquista de América, los ejemplares traídos del nuevo continente representaron la cumbre de la belleza exótica en Europa. Y han sido históricamente veneradas y cultivadas en Japón.

Tan especiales son las flores de las orquídeas que han inspirado a numerosos artistas, particularmente a aquellos dedicados a una rama de la pintura, llamada *naturaleza muerta**. Entre ellos podemos mencionar a Brian Davis, nacido en California en 1946. Este experto en retratar flores, entre ellas orquídeas, realiza sus obras inspirándose en fotografías que él mismo toma. Debido a que las flores se marchitan muy rápido y lleva varias semanas completar una pintura, Brian toma varias fotos de cada flor y luego pinta sus cuadros haciendo una composición de las imágenes que adquirió. Sus obras incluyen lienzos pintados al óleo y también **láminas giclée**, que son un tipo de impresión artística desde una fuente digitalizada utilizando una impresora de chorro de tinta. *Cymbidiums enamoradas* es una de las obras de Brian Davis, en la que se emplea este tipo de tecnología.

Cymbidium es uno de los géneros de orquídeas más populares del mundo debido a sus bellas flores, que pueden sobrevivir a bajas temperaturas. Estas plantas se han cultivado desde hace miles de años, especialmente en la antigua China. Florecen en el invierno, cuando pocas otras orquídeas lo hacen.

Actividades

1. ¿Cómo se puede explicar evolutivamente la belleza de las orquídeas?
2. ¿En qué países han sido históricamente cultivadas estas flores?
3. ¿Qué son las láminas giclée? ¿Por qué una lámina giclée producida por Brian Davis no es una simple fotografía?
4. Mencionen un género popular de orquídea y expliquen la razón de su popularidad. Busquen imágenes de las especies de este género.
5. Investiguen qué otros artistas plásticos retratan orquídeas actualmente.



Brian Davis, *Cymbidiums in love*, lámina giclée, 21,5 x 43 cm, La Mantia Gallery, Nueva York, Estados Unidos.



Brian Davis, *White and Magenta Orchids*, óleo sobre lienzo, 20 x 30 cm, Galerie Severn, Los Ángeles, Estados Unidos.

Glosario

naturaleza muerta: tipo de pinturas en las que se representa animales, flores y otros objetos, que pueden ser naturales (frutas, comida, plantas, etc.) o hechos por el ser humano (utensilios de cocina o de mesa, libros, monedas, pipas, etc.) en un espacio determinado.

protuberancia: elevación o bulto redondeado que sobresale de una superficie.

Actividades finales

1. Completan el siguiente cuadro en el que se comparan la reproducción sexual y la asexual.

Característica	Reproducción sexual	Reproducción asexual
Cantidad de organismos interviniéntes.		
¿Hay participación de gametas?		
¿Son iguales los hijos a los padres?		
Tipo de división celular implicado.		
Ventaja adaptativa.		

2. Para cada una de las situaciones que se presentan a continuación, indiquen qué tipo de reproducción sería más ventajosa y justifiquen su elección.

- a. Una población de algas que vive en un lago en el que hay cambios en la concentración de nutrientes disueltos en las distintas estaciones del año.
- b. Una especie de pasto que llegó a un nuevo ambiente en el que hay un suelo rico en nutrientes vegetales, abundancia de luz y ninguna otra planta que compita por los recursos.

3. Completan el siguiente cuadro sobre las características generales de la reproducción de las plantas con flor (angiospermas) y los animales.

Característica reproductiva	Plantas con flor	Animales
Gameta femenina		
Gameta masculina con movilidad propia		
Tipo de estrategias para el encuentro de las gametas		
Tipo de fecundación		
Estructura que protege al embrión		
Nutrición del embrión en el desarrollo		
Tipo de desarrollo		
Estrategias para el cuidado de los nuevos individuos		
Estrategias para la dispersión de los nuevos individuos		

- a. ¿Qué similitudes encuentran en la reproducción sexual de los animales respecto de las plantas?

- b. ¿Cuáles podrían ser las causas de las diferencias entre la reproducción sexual de animales y plantas que completaron en el cuadro?

4. Expliquen la siguiente afirmación: “Los increíbles colores y formas que pueden tener algunas flores forman parte de las estrategias que las angiospermas han adquirido a lo largo de su historia evolutiva para asegurar su reproducción”.

5. Observen las siguientes imágenes y respondan.

- a. ¿Cuál es el macho y cuál es la hembra?
- b. ¿Cuáles son las diferencias entre los machos y las hembras?
- c. ¿Por qué los machos tienen esas características?



Reproducción humana

6



Contenidos

- > Pubertad y adolescencia
- > Reproducción humana
- > Ciclo menstrual
- > Reproducción de otros mamíferos y vertebrados
- > Ciclo estral
- > Sexualidad responsable
- > Enfermedades de transmisión sexual
- > Tecnología reproductiva

El pasaje de la niñez a la adultez se denomina adolescencia. Esta es una etapa de transición en la cual, además de tener que habituarse a las modificaciones del cuerpo, hay cambios psicológicos que llevan a tener una relación distinta con los adultos, sobre todo con los padres. Durante los años de la adolescencia, el individuo busca construir su identidad adulta. Por ejemplo, hay que habituarse a las nuevas miradas y formas de relacionarse con los compañeros del sexo opuesto, a eventos como fiestas y bailes, a nueva indumentaria, interminables charlas y chateos, acercamientos y enojos, confesiones, carcajadas en grupo y angustias en solitario.

EN ESTE CAPÍTULO...

Se explican los cambios que ocurren en el cuerpo durante la pubertad, y su relación con la maduración sexual y la perpetuación de la especie. Además, se describe cómo los sistemas nervioso y endocrino interactúan y regulan el sistema reproductor. Asimismo, se explica la importancia de una sexualidad responsable, para evitar enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados.

Contenido digital adicional

www.tintaf.com.ar/

NBIO1C6



El subrayado

La técnica del subrayado ayuda a estar atento y activo durante la lectura para seleccionar las palabras y frases clave.



Uno de los cambios físicos durante la adolescencia es la aparición del vello facial en los varones.

Actividades

1. Elaboren una lista de actividades típicas de la niñez, y otra con actividades típicas de un adolescente.
2. Elijan y escriban tres palabras que representen el cambio de la niñez a la adolescencia.

Pubertad y adolescencia

El período de transición entre la infancia y la adultez se denomina **adolescencia**. Esta etapa se caracteriza por una serie de cambios físicos y psíquicos, y se extiende desde los 11 años hasta aproximadamente los 20 años, cuando se inicia la etapa adulta.

Se distinguen dos momentos de la adolescencia.

- **La pubertad:** período en el que ocurren cambios físicos y funcionales.
- **La adolescencia propiamente dicha:** período de desarrollo de la personalidad, caracterizado por un proceso de transición a la etapa adulta.

Los cambios de la pubertad no ocurren exactamente a la misma edad en todos los niños. Puede haber diferencias, sin que esto signifique una anormalidad.

En los varones, la pubertad suele comenzar entre los 12 y los 14 años. En esa etapa, el **pene** comienza su crecimiento y los **testículos** empiezan a funcionar como productores de **espermatozoides** y de hormonas sexuales. Las **hormonas sexuales** son sustancias producidas por ciertas glándulas que estimulan la aparición de características físicas, también llamadas **caracteres sexuales secundarios masculinos**: crece vello en el pubis, el rostro, las axilas, las piernas y el pecho; la voz se hace más grave; aumenta la masa muscular; y pueden aparecer barritos, acné, etcétera. Además, es común que durante el sueño, el varón elimine involuntariamente pequeñas cantidades de semen. Este fenómeno se denomina **polución nocturna** y es característico del comienzo de la pubertad.

En las niñas, la pubertad suele comenzar entre los 10 y los 12 años. En esta etapa, los **ovarios** comienzan a funcionar como órganos productores y liberadores de **ovocitos** (habitualmente llamados **óvulos**) y hormonas sexuales. También se caracteriza por la **menarca** o **primera menstruación**. Las hormonas sexuales estimulan la aparición de los **caracteres sexuales secundarios femeninos**: los pechos se agrandan, crece vello en el pubis y las axilas, se ensanchan las caderas y se afina la cintura, y también pueden aparecer barritos o acné.

Pero no solo los cambios físicos caracterizan esta etapa. Las **emociones** y la **afectividad** también forman parte de la adolescencia. Durante la adolescencia, los jóvenes buscan su identidad, comienzan a comprender que han dejado la niñez, se preocupan por su futuro y empiezan a involucrarse más con la sociedad en la que viven.

La **sexualidad** de una persona se construye a partir de su condición de varón o de mujer, de su edad, de las costumbres, normas y valores de la sociedad en la que vive, además de su capacidad de percibir y expresar emociones. Es decir, la sexualidad está conformada por la integración de los aspectos biológicos, psicológicos, sociales y culturales de cada persona. Su **genitalidad**, en cambio, está determinada por sus órganos y hormonas sexuales.

En las páginas siguientes se describirá la variación de la anatomía de los adolescentes, y se explicarán los procesos biológicos que llevan a tal modificación.

Sistema reproductor femenino

El sistema reproductor femenino está compuesto por un conjunto de estructuras externas y un grupo de órganos internos.

Los **ovarios**, que tienen un tamaño similar al de una almendra, producen los óvulos o células sexuales femeninas. También producen dos hormonas que intervienen en el desarrollo de las características sexuales secundarias femeninas: el **estrógeno** y la **progesterona**. Cada ovario se relaciona estrechamente con un conducto denominado **trompa de Falopio**, que conduce el óvulo al útero. Las trompas están revestidas por células que poseen cílios*, que con su movimiento ayudan en el transporte del óvulo. Si durante el trayecto por las trompas el óvulo se encuentra con un espermatozoide, se produce la **fecundación**, es decir, la unión entre una célula sexual femenina y una masculina.

El **útero** es un órgano hueco, de paredes gruesas, elásticas y musculares. Su interior está recubierto por un tejido con abundantes vasos sanguíneos, llamado **endometrio**. En su parte inferior se encuentra el cuello del útero, que se comunica con la vagina. En el útero se desarrolla el bebé durante el embarazo.

La **vagina** participa en varios procesos: allí se introduce el pene y se deposita el semen durante el acto sexual; conduce la menstruación al exterior y es el canal natural de parto.

En la vagina se encuentra la **flora vaginal**, que son un conjunto de bacterias que viven allí de manera natural y sin causar daño. Cumple un rol protector, al evitar el aumento de la cantidad de otras bacterias que pueden ser perjudiciales.

Una membrana llamada **himen** cubre total o parcialmente el orificio vaginal, y se rompe durante las primeras relaciones sexuales o durante algún ejercicio físico intenso.

Fuera de la cavidad abdominal, y cubriendo el orificio vaginal, se encuentran unos pliegues de piel llamados **labios menores**. Estos, a su vez, están protegidos por otros más gruesos, denominados **labios mayores**, en los que al comienzo de la pubertad aparece vello. Protegido por estas estructuras se encuentra el **clítoris**, un órgano muy sensible con una estructura muy similar a la del pene. La estimulación del clítoris provoca un aumento de las secreciones que lubrican la vagina, lo que facilita el ingreso del pene.


El conjunto de estructuras externas se llama **vulva**.

Glosario

cílios: organoides celulares que realizan movimientos ondulantes y rítmicos.


Sorprendente ►

Cuando nacen, las mujeres poseen unos dos millones de ovocitos, algunos de los cuales mueren. Las adolescentes tienen unos 400 mil ovocitos, muchos de los cuales serán liberados cada mes hasta la menopausia (aproximadamente entre los 50 y 60 años), momento en el cual ya no se produce la maduración de los ovocitos.



Sistema reproductor masculino

El sistema reproductor masculino está compuesto por un conjunto de órganos, unos externos y otros internos.



Millones de espermatozoides se liberan en cada eyaculación.


Los **testículos** son dos órganos que se encuentran dentro de un repliegue de piel llamado **escroto**, localizado fuera de la cavidad abdominal. Esta ubicación mantiene los espermatozoides a una temperatura menor que la corporal. Por encima de esta temperatura, la producción y la supervivencia de los espermatozoides se encuentra amenazada.

Los testículos cumplen dos funciones: producir espermatozoides o células sexuales masculinas, y fabricar testosterona, la hormona masculina.

Dentro de los testículos hay una innumerable cantidad de tubos largos y muy delgados, los **túbulos seminíferos**, en los que se producen los espermatozoides. Una vez originados, los espermatozoides aún inmaduros se depositan en el **epidídimo**, un tubo colector plegado que se ubica a ambos lados de los testículos. Allí, los espermatozoides completan su maduración.

La **testosterona** interviene en la aparición de las características sexuales secundarias en los varones. Esta hormona es producida por las **células de Leydig**, ubicadas entre los túbulos seminíferos.

Una vez maduros, los espermatozoides salen de los testículos y transitan por los **conductos deferentes**. En estos conductos vuelcan sus secreciones la próstata, las vesículas seminales y las glándulas de Cowper o bulbouretrales. Dichas secreciones conforman el fluido denominado **semen**, en el cual los espermatozoides se desplazan con su cola o flagelo. Las **vesículas seminales** fabrican un líquido rico en un hidrato de carbono, la fructosa, que les sirve de alimento a los espermatozoides durante su recorrido. La **próstata** produce secreciones que mejoran las condiciones de movilidad, supervivencia y transporte de los espermatozoides. Las **glándulas de Cowper** son dos y se encuentran a ambos lados de la uretra. Secretan un líquido alcalino que neutraliza la acidez de la uretra y lubrica el pene durante el acto sexual.



Vista sagital del interior de la pelvis masculina.

Vista frontal del sistema reproductor masculino.

Los espermatozoides, junto con el semen, luego de pasar por los conductos deferentes, son liberados hacia el exterior a través de la **uretra**. Este conducto se encuentra dentro del órgano copulador o pene, y está compartido con el sistema excretor, porque también conduce la orina desde la **vejiga** hacia el exterior. El proceso de liberación de semen a través de la uretra se denomina **eyaculación**.

El **pene** facilita el ingreso del semen en el aparato reproductor femenino. Está constituido por dos **cuerpos cavernosos**, tejido que posee espacios que ante un estímulo nervioso se llenan de sangre y producen el aumento de tamaño del pene y su rigidez. Este cambio se llama **erección**. También posee un **cuerpo esponjoso**, por donde pasa la uretra. En su extremo se encuentra el **glande**, que es la porción más sensible de este órgano. El glande está protegido por un pliegue de piel llamado **prepucio**.

Las definiciones

Conviene subrayar en el texto las definiciones de las palabras clave para determinar su significado exacto.

La higiene y la prevención de enfermedades

La **zona genital femenina** es una región muy sensible del cuerpo, y debido a los pliegues que posee es propicia a la proliferación de microorganismos e infecciones. Para evitar inconvenientes se recomienda no usar ropa ajustada, preferir la ropa interior de algodón, utilizar jabones con pH ácido porque el medio vaginal tiene esa condición, y al limpiarse con el papel higiénico siempre debe hacerse de adelante hacia atrás, para no contaminar la región vaginal.

En los **varones**, desde que el niño nace, es conveniente que los padres corran hacia atrás el prepucio, y laven el glande con agua y jabón. Esta higiene debe continuarse en cada baño durante toda la vida del hombre. De lo contrario, la abertura y la piel del prepucio pueden volverse menos elásticas y dificultar su deslizamiento hacia atrás. En consecuencia, es posible que se acumule una secreción llamada **esmegma**, producida por la mucosa de esa zona. La acumulación de esta secreción puede causar **fimosis**, es decir, impedir el deslizamiento del prepucio.

Curiosidades ►

La circuncisión es una práctica que se realiza en gran parte del mundo. Consiste en cortar una región del prepucio. En algunos casos forma parte de una tradición religiosa, mientras que en otros, de una cuestión de higiene. La Organización Mundial de la Salud (OMS) sostiene que el 30% de los hombres en el mundo están circuncidados.

Actividades

1. Con la información de estas páginas, escriban las características sexuales secundarias que se producen durante la pubertad y que permiten diferenciar a varones de mujeres.
2. Copien y completen, en la carpeta, el siguiente cuadro.

	Sistema reproductor masculino	Sistema reproductor femenino
Células sexuales		
Órgano productor de células sexuales		
Órganos reproductores externos		
Órganos reproductores internos		
Función de cada uno de los órganos reproductores		

George Nicholas Papanicolaou

George Papanicolaou nació el 13 de mayo de 1883 en Kymi, Grecia. (...) En 1898 comenzó los estudios de Medicina en la Universidad de Atenas y en 1910 se marchó a Estados Unidos. (...). En 1920 empezó a trabajar con flujo vaginal humano. Tres años después, pudo aislar células cancerosas, entonces se centró en el tema buscando sistemáticamente este tipo de células. Aunque el hallazgo ya se había realizado con anterioridad, lo interesante de Papanicolaou es que supo buscar una técnica para conservar las células con una fijación y tinción* adecuadas.

Glosario

biopsia: muestra de tejido tomada de un ser vivo, con fines diagnósticos.

citología: parte de la Biología que estudia la célula.

neoplasia: multiplicación o crecimiento anormal de células de un tejido del organismo.

tinción: acción y efecto de teñir.

(...) Este hallazgo permitiría detectar el cáncer antes de poder palparlo u observarlo directamente. (...) En el Hospital de Nueva York se sometió a todas las mujeres del servicio de ginecología a una citología* exfoliativa. Se trataba de una prueba sencilla, no dolorosa. Mediante una espátula se obtenían células del fondo de la vagina y del ectocérvix. Con un pequeño cepillo redondeado se tomaban células del interior del cuello y se procedía después al estudio citológico.

Los resultados fueron contundentes: el uso rutinario de esta técnica permitía diagnosticar un buen número de casos de neoplasia* uterina asintomática que no eran visibles por el ojo y que solo podían demostrarse por biopsia*. Los resultados se dieron a conocer en el American Journal of Obstetrics and Gynecology, en agosto de 1941, en el artículo titulado "The diagnostic value vaginal smears in carcinoma of the uterus". Se señalaba que el método hallado tenía gran eficacia; era sencillo, económico, podía utilizarse masivamente y permitía detectar el cáncer en sus inicios o en la etapa preinvasiva. (...)



George N. Papanicolaou (1883-1962).

Papanicolaou ocupó el puesto de director del Instituto de Investigación de Cáncer, en Miami. Murió de un infarto de miocardio el 19 de febrero de 1962.

El test de Papanicolaou o "Pap test" es una de los aportes más importantes de la medicina preventiva en el siglo xx. Sigue siendo la prueba más adecuada y empleada para el diagnóstico de lesiones precursoras de cáncer de cuello uterino. Aunque no es infalible, este test detecta el 95% de cánceres cervicales y, lo que es más importante, los detecta en un estado en el que todavía no se ven a simple vista. Por lo tanto, pueden ser tratados y, casi siempre, curados.

Fuente: José L. Fresquet,

Instituto de Historia de la Ciencia y Documentación (CSIC-Universidad de Valencia), marzo, 2005. (Adaptación).

Actividades

1. Averigüen qué controles ginecológicos deben hacerse las mujeres, desde qué edad y cada cuánto tiempo.

2. ¿Qué permite detectar el test de Papanicolaou?

Ciclo menstrual

Cuando se inicia la pubertad, las hormonas comienzan a actuar sobre el útero y los ovarios, lo que desencadena una serie de procesos involucrados en la reproducción.

El **ciclo menstrual** es una sucesión de eventos que ocurren en el sistema reproductor, controlados por hormonas que se desarrollan mensualmente en el organismo femenino. Estos procesos se relacionan con la liberación de los óvulos y la preparación de la pared interna del útero, el endometrio, ante un posible embarazo.

El ciclo menstrual tiene una duración promedio de 28 días, pero son muy comunes las variaciones en cada una de las mujeres.

La **glándula hipófisis**, ubicada en la base del cráneo, produce y libera dos hormonas que intervienen en la reproducción humana. Una de ellas es la hormona **FSH o foliculostimulante**, que llega a los ovarios a través de la sangre y provoca en ellos la maduración de los óvulos. Los óvulos, y un grupo de células que lo rodean, maduran dentro de **folículos ováricos o de Graaf**. Los folículos crecen hasta que solo uno de ellos madura. Mientras tanto, el folículo produce y libera estrógeno, una hormona que estimula el desarrollo del endometrio en el útero.

La otra hormona es la **LH o luteinizante**, la cual desencadena la **ovulación**, es decir, la salida del óvulo hacia la trompa de Falopio. Este evento sucede alrededor del día 14 del ciclo.

Una vez liberada la célula sexual, los restos del folículo (cuerpo lúteo) producen la hormona progesterona, que mantiene el endometrio para un eventual embarazo.


El óvulo es transportado por las trompas de Falopio y, si no hay fecundación, es eliminado. El endometrio se desprende de la pared del útero unos 14 días después. La sangre con restos de tejidos y células muertas que se expulsa durante aproximadamente 5 días, se denomina **menstruación**. El ciclo se repite todos los meses.

Los esquemas gráficos

Pueden usar los esquemas gráficos para repasar un tema: tapen el texto y expliquen lo que saben de las partes que marca el esquema en la imagen.

Actividades

1. ¿Cuáles son las hormonas que libera la glándula hipófisis y que intervienen en la reproducción humana? ¿Cuál es la función de cada una de ellas?
2. Diferencien ovulación de menstruación.



Ciclo menstrual.

Fecundación


Curiosidades►

En ciertas ocasiones, una mujer puede liberar más de un óvulo durante su ciclo menstrual. Cuando se liberan dos óvulos, y cada uno es fecundado por un espermatozoide, se forman dos huevos o cigotas que darán origen a **mellizos**.

Los **gemelos idénticos** se originan a partir de una sola cigota, producto de la unión de un óvulo y un espermatozoide. La célula huevo o cigota comienza a reproducirse y, en cierto momento, las células hijas se separan y dan lugar a dos embriones.

Mientras el óvulo se encuentra alojado en el interior de una de las trompas de Falopio, los espermatozoides se desplazan hacia él. Sin embargo, las células sexuales masculinas pueden encontrarse con muchos obstáculos que dificultan la **fecundación**. Por ejemplo, muchos espermatozoides mueren debido a la temperatura elevada de los órganos reproductores femeninos y a la acidez de las secreciones vaginales. Solo unos pocos llegan hasta el óvulo y, una vez que lo alcanzan, es posible que esta célula sexual femenina ya no se encuentre apta para la fecundación. En caso contrario, solo un espermatozoide logra introducir su material genético dentro del óvulo. Una vez que esto sucede, en la célula sexual femenina ocurre una reacción que impide el ingreso de otros espermatozoides.

Aunque los obstáculos son muchos, la inmensa cantidad de espermatozoides eleva la probabilidad de que varios de ellos lleguen al óvulo y lo fecunden.



Embarazo

El **embarazo** es el tiempo que tarda un bebé en desarrollarse dentro del útero de la madre. Comienza con la fecundación, sigue con la gestación y termina con el parto. Esta etapa dura aproximadamente nueve meses, y en ella se produce una gran cantidad de cambios en el feto y en la madre.


La fecundación, la unión del óvulo y el espermatozoide, se produce en las trompas de Falopio y da lugar a la **célula huevo** o **cigota**. Apenas se origina esta célula, comienza a dividirse primero en dos células, luego en cuatro, luego en ocho y así sucesivamente. Mientras tanto, va descendiendo hasta llegar al útero, esto tarda una semana. Hasta ese momento, las células que forman el **embrión** se alimentan de las sustancias nutritivas que posee el óvulo. En este punto, el embrión comienza la **implantación**. Un grupo específico de células que forman el embrión son las encargadas de romper el tejido del endometrio y penetrar entre sus células. En este momento se desarrollan dos membranas que recubren el embrión. Una membrana es el **amnios**, que contiene el llamado **líquido amniótico**. El embrión flota en este líquido, compuesto en su mayor porcentaje por agua. Su función es proteger al embrión amortiguando golpes. Otra membrana es el **corion**, que recubre al amnios. El corion desarrolla ramificaciones dentro del endometrio, lo que origina la **placenta**. A través de esta estructura se comunica el cuerpo de la madre con el del embrión: el bebé recibe nutrientes y oxígeno del cuerpo de la madre, y también elimina los desechos, como el dióxido de carbono. El **cordón umbilical** conecta el embrión con la placenta.

Durante los primeros dos meses se originan todos los órganos del embrión. A partir del tercer mes de gestación, el embrión pasa a llamarse **feto**. En esta etapa se ponen en funcionamiento los sistemas de órganos y el feto crece de tamaño y de peso, hasta que se cumplen los nueve meses que dura aproximadamente la gestación y se produce el parto.

Durante el **parto**, el bebé y la placenta salen al exterior. Es un proceso que puede durar varias horas y en el que se distinguen tres etapas. La primera es la **dilatación** del cuello del útero. El útero es un órgano muscular que tiene la capacidad de contraerse, las contracciones comienzan a sentirse y la cabeza del bebé empieza a empujar el cuello del útero. La segunda etapa es el **parto**, es decir, la salida del bebé. Las contracciones son intensas para permitir la expulsión del bebé. La última etapa es el **alumbramiento**, en la que se produce la expulsión de la placenta.

Actividades

1. Escriban, con sus palabras, un texto breve sobre el embarazo. Incluyan los siguientes conceptos: fecundación, implantación, cigota, placenta, corion, embarazo, amnios, parto.
2. ¿Cuáles son las etapas del parto? ¿Qué sucede en cada una de ellas?
3. Busquen información en enciclopedias o Internet y respondan las siguientes preguntas.
 - a. ¿Por qué son importantes los cuidados maternos, especialmente durante los primeros meses de embarazo?
 - b. ¿Qué controles debe realizarse una embarazada?
 - c. ¿En qué circunstancias se efectúa una cesárea?
 - d. ¿Qué controles se les realizan a los recién nacidos?
 - e. ¿Cuáles son los beneficios de la lactancia materna?



Sumate a la campaña para prevenir el embarazo adolescente “Hablar es prevenir”

Esta es una campaña cuyo objetivo es concientizar acerca del problema del embarazo adolescente en nuestro país y de la necesidad de educar e informar a niñas, niños y adolescentes para prevenirlo. Es un proyecto impulsado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en el marco del Día Internacional de la Niña, que se celebra el 11 de octubre.

Este día reconoce los derechos y desafíos únicos a los que se enfrentan las niñas y adolescentes en todo el mundo, e invita a que la sociedad se una para destacar, conversar y discutir el tema para así avanzar en la mejora de sus oportunidades y derechos.

Millones de niñas y adolescentes ven sus proyectos de vida truncados y su potencial perdido por la falta de educación, la violencia y el embarazo cuando aún son muy jóvenes. El embarazo adolescente es un fenómeno preocupante a nivel mundial, y especialmente en América Latina y el Caribe, donde al menos una de cada cinco mujeres tiene su primer hijo antes de cumplir los 18 años. La tasa de adolescentes embarazadas en América Latina y el Caribe solo es superada por África y es mucho mayor que el promedio mundial. (...)

¿Qué pasa en la Argentina?

Es un fenómeno preocupante: hay en la actualidad 3,5 millones de niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años, que conforman casi el 9% de la población total. La cantidad de nacimientos por año es de 700.000, y el 16% proviene de madres adolescentes de entre 15 y 19 años (en algunas provincias equivale al 25%) y más de 3.000 son de niñas de 10 a 13 años. Esto significa que al menos una de cada seis mujeres tiene su primer hijo antes de cumplir los 19 años. Es decir, que 322 nacimientos por día en el país son de madres adolescentes.

El 69% de esas mujeres adolescentes no planearon ese embarazo.

El embarazo adolescente implica mayor riesgo de salud, menos desarrollo y menos competitividad económica. Por eso, prevenirlos generaría más beneficios para las niñas y adolescentes (más educación, salud, retraso de la maternidad, y mayores ingresos), más beneficios para sus familias (mejores empleos, capacidad de ahorro, mejor situación económica familiar) y más beneficios para nuestro país (aumento del PBI, mejor salud, más participación ciudadana).

“Hablar es prevenir”

(...) UNFPA trabaja en la Argentina desde hace 11 años promoviendo el derecho de cada mujer, cada hombre y cada niño a disfrutar de una vida saludable, con igualdad de oportunidades para todos. Para ello colabora en la formulación de políticas y programas velando porque cada embarazo sea deseado, cada parto se realice en condiciones de seguridad y cada joven alcance su pleno desarrollo.

Hoy en la Argentina
1 de cada 6 nacimientos
corresponde a una
mamá adolescente

HABLÁ DEL TEMA CON TUS HIJOS.

Hablamos con nuestros hijos sobre qué quieren estudiar, de sus planes laborales, de sus próximas vacaciones. Habló de este tema también. Un embarazo no planificado puede cambiarle su proyecto original de vida. Conversá con tus hijos para que estén informados y logren todo lo que siempre soñaron.

Entrá ahora en unfpa.org.ar y encontrarás orientación para hablar del tema con tus hijos, HOY.



UNFPA Trabajando por las niñas y adolescentes en la Argentina



unfpa.org.ar

Campaña nacional “Hablar es prevenir”.

Fuente: entremujeres.clarin.com/genero/embarazo-adolescente-UNFPA-familia-campana_0_1226877371. 9/10/2014. (Adaptación).

Actividades

1. Armen grupos de cuatro integrantes y elaboren afiches sobre el embarazo adolescente, para dar

a conocer los datos del texto a los alumnos de su escuela. Pueden agregar imágenes.



Tecnología reproductiva

Hay parejas que a pesar de intentar tener hijos durante mucho tiempo, no lo consiguen. Las causas pueden ser de tipo **anatómicas**, es decir, algún problema en la estructura de los órganos reproductores, o **fisiológicas**, es decir, inconvenientes en algún proceso involucrado en la reproducción, o incluso varias causas combinadas. El trastorno puede tenerlo un solo integrante de la pareja o los dos. Conviene consultar al médico especialista en fertilidad para comenzar a realizar estudios y saber cuál o cuáles son los problemas para concebir un embarazo. De esta forma, se puede iniciar el tratamiento más indicado para cada caso.

Las **técnicas de fertilización asistida** son un conjunto de procedimientos que tienen como objetivo aumentar las posibilidades de un embarazo.

Hay tratamientos sencillos, como la **estimulación ovárica**, en el cual se pretende conseguir que en los ovarios maduren más óvulos en la ovulación. Otro tratamiento es la **inseminación artificial**. En este caso, se obtiene el semen del varón, se lo analiza y se introduce a los seleccionados en el útero de la mujer. El semen puede provenir de un donante.

Existen tratamientos más complejos, como la **fecundación in vitro** (FIV). *In vitro* viene del latín y significa “en vidrio”, porque la fecundación por medio de esta técnica se realiza en el laboratorio. Luego, el óvulo fecundado es trasladado al útero para que se implante.

Cuando los óvulos no llegan a las trompas de Falopio por alguna anormalidad en ellas o cuando la calidad de los espermatozoides no es buena, se extraen las células sexuales del hombre y de la mujer, y se introducen directamente en las trompas de Falopio para que se produzca la fecundación de manera natural. Esta técnica se llama **transferencia intratubaria de gametas** (GIFT).

Si la cantidad de espermatozoides es muy baja existe otra técnica más compleja, llamada **inyección intracitoplasmática de espermatozoides** (ICSI). Consiste en la introducción de un espermatozoide seleccionado en un óvulo. Luego de producida la fecundación, se esperan cinco días y se implanta el embrión en el útero de la mujer.

Por medio de estas técnicas se pueden producir embarazos múltiples ya que, en general, se transfieren varios embriones para garantizar que al menos uno complete su desarrollo.

Actividades

1. En nuestro país, la Ley N° 26.862 de Reproducción médica asistida (también conocida como Ley de fertilización asistida) fue sancionada el 5 de junio de 2013.
 - a. Averigüen cuál es el objetivo de la ley, qué técnicas de reproducción médica asistida incluye y qué centros de salud realizan estas técnicas (hospitales públicos, clínicas privadas o todos).
 - b. ¿Por qué les parece que es importante que haya una ley que regule la fertilización asistida?



Se necesitan instrumentos y equipos específicos para realizar técnicas de fertilización asistida.



El método ICSI consiste en la introducción de un espermatozoide seleccionado en un óvulo.

Curiosidades

Algunos tratamientos pueden afectar los órganos productores de las gametas o a las gametas mismas. En esos casos se puede recurrir a la **criopreservación**: se conservan los óvulos o los espermatozoides a 200 °C bajo cero por el tiempo que el paciente lo requiera.

“El éxito de un trasplante de útero es que la mujer consiga dar a luz”

El médico pionero en este tipo de intervenciones ha recibido numerosas peticiones de mujeres que quieren ser madre.

El ginecólogo sueco Mats Brännström muestra orgulloso una fotografía que prueba el avance médico que protagonizó el pasado septiembre: madre, hijo y donante sonríen a la cámara como prueba de la primera vez que una mujer que recibió un trasplante de útero tuvo un bebé. Este caso ha sido el primero, pero no el único. “Otros dos embarazos han llegado a buen término”, dice Brännström en un despacho de la clínica Salud de la Mujer Dexeus de Barcelona, el mismo día que recogió un premio de esta institución sanitaria.

El médico, profesor de la Universidad de Gotemburgo, rememora por qué puso en marcha su proyecto de investigación. “Fue en Australia, en 1998, con una paciente que había sufrido un cáncer cervical y hubo que extirparle el útero. Ella me dijo que por qué no le hacía un trasplante, que su madre se lo podría donar... En realidad, yo nunca había pensado sobre eso y en ese momento me pareció una locura”, relata. Pero poco le duró la duda. Al año siguiente, su equipo empezó a investigar con animales. Se planteaba así realizar el primer trasplante temporal —tras el embarazo, el órgano se extirpa—, no exento de polémica. Para muchos, por la relación entre riesgo y beneficio que suponía el trasplante, la intervención no valía la pena. “Durante cinco años hemos trabajado y publicado bastante sobre el tema ético, pero no solo los médicos, sino también los enfermeros y los pacientes”, reconoce el ginecólogo.

El equipo de Brännström tardó 12 años en perfeccionar la técnica y atreverse a practicarla en humanos. La idea era trasplantar el útero a mujeres que, pese a tener los ovarios intactos, carecían del órgano para gestar al bebé. Luego, se le transferiría una gameta fecundada.



Mats Brännström, ginecólogo y cirujano neonatal.

Nueve mujeres fueron trasplantadas con éxito. Pero todavía no se podía hablar realmente de éxito. “La primera victoria es la cirugía, luego que la mujer tenga la menstruación con normalidad y después el embarazo... Pero la definición del éxito del trasplante de útero es que la mujer consiga dar a luz”, sentencia.

Dos mujeres sufrieron rechazos y hubo varios abortos. Hasta ahora, tres de las jóvenes han conseguido llevar el embarazo a buen puerto y una cuarta está encinta de 18 semanas. “Podemos decir que ha habido tres trasplantes de útero exitosos en el mundo”, ríe el ginecólogo.

Él y su equipo hacen seguimiento a las madres, hijos y donantes que han participado en su proyecto. “Hay que asegurar que no les pase nada dentro de 15 años. Todavía no sabemos qué riesgos pueden tener a largo plazo, pero no solo riesgos médicos, sino también psicológicos, por lo que el seguimiento de los pacientes es necesario”. (...)

Fuente: elpais.com/elpais/2015/03/01/ciencia/1425227492_564668.html. 16/04/2015. (Adaptación)

Actividades

- Expliquen por qué el especialista realiza la siguiente afirmación:
“La primera victoria es la cirugía, luego que la mujer

tenga la menstruación con normalidad y después el embarazo... Pero la definición del éxito del trasplante de útero es que la mujer consiga dar a luz”.

Escultura en la prehistoria. Venus paleolíticas

En el período Paleolítico Superior se encontraron las famosas estatuillas llamadas **venus paleolíticas**, que estaban talladas en piedra, marfil o huesos, con detalles estilizados, y que representaban el culto a la fertilidad.

La escultura prehistórica también es conocida como arte mobiliar, que se caracteriza por estas estatuillas pequeñas (venus paleolíticas) talladas en bulto y muy expresivas, hechas en piedra y marfil, cuyo tamaño oscila entre 5 y 25 cm, donde la figura femenina es representada, exagerando el volumen de aquellas partes del cuerpo relacionadas con la maternidad, resaltando los rasgos del embarazo, como: los senos, las caderas, los glúteos y el vientre. En la prehistoria se consideraron símbolos de la fecundidad y fueron encontradas en muchas partes de Europa, principalmente en Francia.

La famosa “Venus de Willendorf” (Austria) constituye uno de los primeros ejemplos escultóricos del mundo. Esculpida en piedra caliza, tiene aproximadamente 11,5 cm de altura, data de 30000–25000 a.C. y se encuentra en el Museo de Historia Natural de Viena. Presenta un cuerpo de anatomía exagerada, resalta las partes relacionadas con el sexo, la cabeza se muestra con un tocado complicado y estilizado, no tiene el rostro, los brazos son tan pequeños que descansan sobre los senos y los pies son pequeños. Es la única que tiene rezagos de pintura.

De igual forma, también se destaca la “Venus de Laussel” (Francia), descubierta por el doctor Lalanne, en la región de la Dordoña Francesa, en el año 1911. Actualmente, se encuentra en el museo de Saint Germain en Laye (Francia). Es una estatuilla tallada en un bloque de piedra caliza y representa a una femenina desnuda, que en la mano derecha sostiene un cuerno de bisonte; su descubridor la describe como “la mujer del cuerno”. La obra tiene una altura de 46 cm, la cabeza no tiene rostro, tiene cuello alargado, brotan los senos largos, el vientre es acentuado y proporcionado, el brazo derecho cae con naturalidad junto al tronco; todo se ve pulido, excepto la cabeza.

(...) Todas las estatuillas encontradas muestran acentuaciones de los rasgos sexuales. Por entonces, en el Paleolítico, la mujer era considerada como un ser misterioso, cuyo objetivo era propagar la especie.

Fuente: www.dearteycultura.com/escultura-en-la-prehistoria-venus-paleoliticas/#.VS_M5tyG9I4. 10/10/2012. (Adaptación).



Venus de Willendorf (Austria).





Venus de Laussel (Francia).

Actividades

- Lean el texto y respondan las siguientes preguntas.
 - ¿Qué representaban las venus del Paleolítico?
 - ¿Qué partes del cuerpo se destacaban en estas estatuillas? ¿Por qué?
- Busquen información sobre la “Venus de Lespugue” y la “Venus de Brasempouy”. Anoten las características de esas estatuillas e indiquen de qué lugar proceden. Peguen imágenes.

Elegir ser padres



En la vasectomía se ligan los conductos deferentes.



En la ligadura de trompas se ligan las trompas de Falopio.

Una pareja puede planificar cómo y cuándo tener un hijo. Existen varios **métodos y técnicas anticonceptivas** que permiten la prevención del embarazo. Cada uno de estos métodos posee ventajas y desventajas.

La elección de un método anticonceptivo depende de varios factores, como la edad, las relaciones entre los componentes de la pareja, sus principios éticos y religiosos, la indicación médica, la eficacia de los métodos y la posibilidad de acceder a ellos.

Los métodos anticonceptivos pueden impedir un embarazo no deseado en forma permanente o temporal.

Métodos permanentes

Los métodos permanentes o de esterilización evitan que las células sexuales se encuentren y, por eso, tienen una efectividad de casi el 100%. Pero, estos métodos no sirven para prevenir enfermedades de transmisión sexual (ETS).

En el caso del hombre, la **vasectomía** es una intervención quirúrgica en la cual se cortan o se ligan los conductos deferentes, y se impide así la salida de los espermatozoides.

En la mujer, consiste en una operación llamada **ligadura de trompas**, en la que se cortan o se atan las trompas de Falopio. Esta intervención impide que los espermatozoides puedan llegar al óvulo debido a la interrupción de su recorrido. En ambas situaciones, las gametas mueren y son fagocitadas por otras células. Estos métodos son irreversibles.

Métodos temporales

Los métodos temporales pueden impedir la fecundación, la ovulación o la implantación del huevo.

En el primer caso, algunos métodos anticonceptivos actúan como barreras que evitan la llegada de los espermatozoides al óvulo. Son métodos artificiales, porque se utilizan elementos ajenos al cuerpo. Uno de ellos es el **diafragma**, un dispositivo que la mujer se coloca en la parte superior de la vagina, donde se une al cuello del útero. Si bien es reutilizable, una de sus desventajas es que el diafragma puede moverse y dejar pasar los espermatozoides. Por eso se complementa su efectividad con cremas o espumas espermicidas, que funcionan como barreras químicas ante los espermatozoides. Otra desventaja es que no impide el contagio de ETS. Se debe consultar con el médico para que lo recete según las características de cada mujer. Después de la relación sexual, la mujer debe mantener el diafragma en su posición durante alrededor de 6 horas.

El **preservativo masculino** es un capuchón de látex descartable que se coloca sobre el pene para impedir que los espermatozoides entren en la vagina.

El **preservativo femenino** es una bolsa de látex con dos anillos, que recubre las paredes y el fondo de la vagina para impedir el ingreso de los espermatozoides en el cuello del útero. Estos métodos son los únicos efectivos para impedir el contagio de ETS, ya que evitan el contacto directo entre el pene y la vagina.



Preservativo masculino.



Preservativo femenino.

Un método temporal muy utilizado es el **dispositivo intrauterino** (DIU). Hay dos tipos principales de DIU, los que son de plástico, en forma de T, que envuelven un alambre de cobre, y aquellos basados en hormonas que funcionan por la liberación de progesterona (SIU). Su forma y su tamaño dependen de las características del útero de cada mujer. Para su colocación y extracción, la mujer debe concurrir al médico ginecólogo, quien evaluará si el método es el adecuado para la paciente. La liberación de partículas de cobre u hormonas cambia el medio uterino e impide que los espermatozoides lleguen al óvulo. También modifica las paredes del útero, por lo cual podría impedir la implantación del embrión en el caso que se produzca la fecundación.



Dispositivo intrauterino (DIU).


Según el tipo de DIU, puede tener una duración de entre 3 y 10 años. Es importante concurrir al ginecólogo cada seis u ocho meses para verificar que el DIU siga bien colocado. Ambos son muy efectivos como anticonceptivos, pero no previenen ETS.

Entre los métodos que impiden la fecundación, existen otros tres que son naturales, porque no utilizan objetos o sustancias artificiales. Uno de ellos es el **coitus interruptus**, que consiste en la eyaculación fuera de la vagina. Como método anticonceptivo es muy poco efectivo. Tampoco es efectiva la **ducha vaginal**, que consiste en un lavado posterior al ingreso del semen en la vagina.

Otro método de escasa efectividad es el **control del ritmo**, que está íntimamente relacionado con el control hormonal del ciclo menstrual. A partir del día 14 del ciclo, el óvulo se encontraría listo para ser fecundado. Si una mujer no quiere quedar embarazada, podría evitar las relaciones sexuales a partir del día 10 del ciclo y hasta el día 16. Este rango se relaciona con el tiempo de vida de los espermatozoides dentro del sistema reproductor femenino (de 24 a 72 horas). Muchos son los factores que alteran el período de las mujeres. El estrés, alguna enfermedad o la dieta pueden modificar el día de ovulación. Los métodos naturales son poco eficientes para el control de natalidad y no previenen ETS.

Entre los métodos que impiden la ovulación, se encuentran las **pastillas anticonceptivas**. Estas pastillas contienen hormonas femeninas. Se toma una pastilla por día durante 21 días, luego se descansa una semana, en la cual se produce la menstruación. Dado que actualmente hay muchos tipos de píldoras, conviene que el médico recete la más adecuada en cada caso, ya que los organismos tienen diferencias metabólicas. Si bien tienen una efectividad del 99%, no impiden el contagio de ETS.


La **píldora del día después** es otro método temporal, que impide la implantación y es solo de emergencia, no es apropiada como método anticonceptivo de uso regular. Su uso frecuente puede ocasionar irregularidad menstrual, problemas cardíacos, ACV, etcétera. Esta pastilla contiene hormonas que modifican la pared uterina e impiden la implantación del huevo. Se utilizan para prevenir los embarazos no deseados, desde las primeras horas y hasta los 3 a 5 días después de haber tenido relaciones sexuales sin protección. Su eficacia en la reducción del riesgo de un embarazo es, según la OMS, del 52 al 94%, y resulta más eficaz cuanto antes se tome apenas ocurrida la relación sexual.




Pastillas anticonceptivas.




El parche anticonceptivo libera hormonas, al igual que las pastillas anticonceptivas, pero en este caso van directamente al torrente sanguíneo. Tiene una semana de duración.



La bacteria *Treponema pallidum* es del tipo espiroqueta. Posee forma espiralada



La bacteria *Neisseria gonorrhoeae* es del tipo coco. Tiene forma redonda; en este caso es un diplococo, ya que se agrupan de a dos.



Virus del papiloma humano.

Enfermedades de transmisión sexual

Las **enfermedades de transmisión sexual** (ETS) son un conjunto de patologías producidas por diversos organismos o virus transmitidos principalmente durante el acto sexual. Si bien las vías de contagio pueden ser por contacto oral-genital o rectal, la mayoría de las ETS pueden transmitirse por otras vías. Con menor frecuencia, algunas de estas enfermedades pueden contagiarse por el uso de prendas íntimas ajenas, toallas, sábanas, el inodoro y el bidet. Actualmente, la prevención a través del **uso adecuado del preservativo** y el **diagnóstico temprano** constituyen las principales técnicas para disminuir la probabilidad de contagio y controlar la mayoría de estas enfermedades.

Gonorrea o blenorragia

La **gonorrea** o **blenorragia** es provocada por la bacteria *Neisseria gonorrhoeae*. Se puede contagiar por contacto con la boca, la vagina, el pene o el ano. Los primeros síntomas de esta enfermedad son la salida de un pus amarillo-verdoso por la uretra o la vagina, y un dolor o ardor producido al orinar, o al eyacular en el hombre. Si no se trata, puede producir infertilidad, infecciones en la cavidad abdominal y parto prematuro, entre otros trastornos.

Sífilis

La **sífilis** es producida por la bacteria *Treponema pallidum*. El primer síntoma es el “chancro sifilítico”, muy contagioso, que es una úlcera del tamaño de una lenteja, generalmente indolora en el pene, o en la vulva o la vagina. También pueden presentarse en el interior de las mejillas, la faringe y el ano. En ciertas ocasiones no se presenta el chancro, como en el contagio por vía sanguínea.

Si la enfermedad no es tratada, se desarrolla la segunda etapa. Aproximadamente a los 60 días de la aparición del chancre aparecen, entre otros síntomas, erupciones parecidas a las del sarampión, altamente contagiosas, y fiebre. En la etapa final (después de unos 3 a 15 años), la sífilis altera el sistema nervioso, el corazón y numerosos órganos, e incluso provoca la muerte.

Papiloma humano

Los **virus del papiloma humano** (VPH) conforman un grupo de más de 80 tipos de virus. Existen alrededor de 30 tipos que se transmiten a través del contacto sexual, y producen verrugas o papilomas que aparecen en los genitales, alrededor de estos o en el ano. Algunas variedades de estos virus pueden provocar cáncer del cuello de útero. Por eso, las mujeres deben realizarse periódicamente exámenes ginecológicos, como el Pap-nicolaou. Las verrugas genitales visibles pueden destruirse con diferentes técnicas, aunque no curan la enfermedad. Además del uso del preservativo, existe la vacuna contra el VPH para prevenir esta enfermedad.

INVESTIGACIÓN DE CIENTÍFICOS CANADIENSES Y DE ESTADOS UNIDOS

La sífilis viajó de América a Europa en los barcos de Colón

Lo afirman a partir del mayor análisis genético de la bacteria que la produce.

De su primer viaje a América, parece que Cristóbal Colón y sus hombres volvieron con algo más que el descubrimiento de un nuevo continente, nuevas especias y un sinfín de aventuras que contar. También regresaron con la sífilis, una enfermedad de transmisión sexual (...) que se extendió a todo el mundo. Lo asegura una investigación que comparó genéticamente 26 cepas de la bacteria que causa esta y otras infecciones.

¿Ingresó la tripulación de Colón este patógeno en la Europa Renacentista después de contraerla en América o tiene la sífilis un origen mucho más antiguo en el Viejo Continente? Esta es la pregunta que durante mucho tiempo se ha planteado la comunidad científica y a la que ha tratado de dar respuesta un equipo de investigadores de Estados Unidos y Canadá. Su trabajo, publicado en PLoS Neglected Tropical Diseases, constituye

el mayor análisis genético de la familia de la bacteria *Treponema* (la responsable de la infección) y apoya el origen colombino de la sífilis.

La primera epidemia conocida de sífilis se produjo en 1495, cuando Carlos VIII sitiaba Nápoles. Ya de regreso en su país, los mercenarios extranjeros que prestaban servicio en las tropas del rey de Francia difundieron la enfermedad. La aparición de esta epidemia, apenas tres años después del descubrimiento de América, dio lugar a la hipótesis de una enfermedad traída del Nuevo Mundo por los marinos al servicio del rey de España, ya que se describieron casos de sífilis entre ellos. Otras teorías sugirieron lo inverso al plantear que antes de 1495, la sífilis pudo confundirse en Europa con otras enfermedades.

La sífilis es una infección de transmisión sexual originada

por una bacteria, el *Treponema pallidum*. En zonas tropicales, ciertas subespecies son responsables de enfermedades de la piel de transmisión no sexual: el pian*, la pinta* o el bejel*. Transmitido por contacto cutáneo en la infancia, el pian causa estragos en América, África y Oceanía.

(...) Katherine Harper y sus colegas concluyeron que el pian es una enfermedad antigua, al contrario de la sífilis, que habría aparecido en época mucho más reciente. De todas las cepas no venéreas estudiadas, las más próximas a las responsables de la sífilis son las del pian en América. El equipaje de Cristóbal Colón habría llevado el agente infeccioso o al menos una subespecie del treponema responsable del pian, que luego habría evolucionado hacia la forma del *Treponema pallidum*, en condiciones ambientales diferentes de las de la América tropical.

Fuente: edant.clarin.com/diario/2008/01/16/sociedad/s-02901. (Adaptación).

Actividades

1. ¿Qué condiciones piensan que fueron las que propiciaron la expansión tan rápida de la sífilis a partir del descubrimiento de América?
2. A lo largo de la historia, la sífilis produjo estragos en la humanidad. En los siglos XVI y XVII el 15% de la población mundial la poseía y no había ningún tratamiento para paliarla. Hasta el día de hoy, el porcentaje de infectados es muy elevado. Averigüen cuáles son los métodos de detección de la sífilis.

Glosario

- bejel:** enfermedad crónica de la piel y otros tejidos, causada por una bacteria.
- pian:** enfermedad contagiosa, caracterizada por la erupción en la cara, las manos, los pies y las regiones genitales de unas protuberancias blancas o rojas, susceptibles a ulcerarse.
- pinta:** enfermedad tropical infecciosa que afecta la piel y es causada por una bacteria.

VIH/sida

El **sida** es una enfermedad cuya sigla significa síndrome* de inmunodeficiencia adquirida, porque sus síntomas revelan una disminución del sistema de defensa (inmune) del organismo. Esta enfermedad se contrae por la infección con el **virus de inmunodeficiencia humana** (VIH).

Este virus se reproduce dentro de un tipo de linfocitos (células de defensa) y los destruye. También afecta otros componentes del sistema inmunitario. De este modo, debilita las defensas del organismo. En consecuencia, la persona infectada puede, además, contraer otras enfermedades llamadas "oportunistas" o "marcadoras", como la neumonía y/o el desarrollo de ciertos tipos de cáncer. Estas enfermedades difícilmente aparecen en personas cuyo sistema inmunológico está sano.

El VIH se transmite a través del contacto directo de los fluidos vaginales y/o el semen de personas portadoras, al producirse heridas microscópicas en las mucosas de los genitales o el ano durante las relaciones sexuales sin preservativo. También se contrae a través de sangre infectada, mediante el intercambio de jeringas, máquinas de afeitar, etcétera, o por transfusiones de sangre no controladas. Otra forma de transmisión puede ser de madre a hijo/a, durante el embarazo, el parto o por la leche materna. La persona infectada por el VIH atraviesa un período asintomático, que puede durar meses o varios años, hasta que se manifiestan los síntomas y los signos característicos del sida, a los que suelen sumarse los que provocan las enfermedades oportunistas.

El virus no se transmite por besar o abrazar a una persona, o a través de insectos. Tampoco por compartir baños, camas, la pileta o elementos de la vajilla.

Actualmente, no existe una cura ni una vacuna contra el sida. La dificultad para fabricarlas radica en la alta velocidad de mutación del material genético del virus. En efecto, se han encontrado en una misma persona cepas distintas del VIH.

El diagnóstico de la enfermedad consiste en pruebas que detectan la presencia de anticuerpos* frente al virus. Esto permite iniciar oportunamente tratamientos mediante varias drogas combinadas, que impiden el avance y la reproducción del virus en el organismo. De esta forma, se prolonga el período asintomático y mejora la calidad de vida de los enfermos.

En la actualidad, el único medio para prevenir el contagio del VIH por vía sexual es el uso correcto del preservativo durante todo el acto sexual.

El contagio por vía sanguínea puede prevenirse a través del uso de materiales estériles y descartables. Estas condiciones se deben exigir al personal de salud que utilice elementos punzantes o cortantes, o en prácticas de tatuajes o perforaciones (*piercing*). También, las transfusiones sanguíneas deben estar estrictamente controladas para evitar múltiples contagios. El contagio de madre a hijo se evita realizando los controles prenatales correspondientes.



El uso del preservativo durante las relaciones sexuales es la única manera de prevenir las ETS.

Glosario

anticuerpo: proteína fabricada y eliminada por los linfocitos para combatir una infección que afecta al organismo.

síndrome: conjunto de síntomas y signos que aparecen combinados como manifestación de una enfermedad o alteración hereditaria.

Actividades

1. Busquen información sobre las siguientes ETS: hepatitis B, tricomoniasis, candidiasis, herpes genital y clamidia. Luego, elaboren un cuadro en el que incluyan: el agente que transmite la enfermedad (nombre del virus o la bacteria), el modo en que se transmite, los síntomas, el tratamiento y las medidas de prevención de cada una de esas ETS.

Salud reproductiva en los adolescentes

La Organización Mundial de la Salud define a la **salud reproductiva** como el estado de bienestar físico, mental y social relacionado con el sistema reproductivo. En muchos países, la salud reproductiva está considerada como un derecho.

Desde el año 2003, en la Argentina existe la Ley N° 25.673, Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Los objetivos que plantea este programa son los siguientes:

- ▶ Alcanzar para la población el nivel más elevado de salud sexual y procreación responsable con el fin de que pueda adoptar decisiones libres de discriminación, coacciones o violencia.
- ▶ Disminuir la mortalidad materno-infantil.
- ▶ Prevenir embarazos no deseados.
- ▶ Promover la salud sexual de los adolescentes.
- ▶ Contribuir a la prevención y detección temprana de ETS, de VIH/sida, y patologías genitales y mamarias.
- ▶ Garantizar a toda la población el acceso a la información, orientación, métodos y prestaciones de servicios referidos a la salud sexual y procreación responsable.
- ▶ Potenciar la participación femenina en la toma de decisiones relativas a su salud sexual y procreación responsable.

Estas acciones son muy importantes en la **prevención de embarazos no deseados** y **contagios de las ETS**, y en la **planificación familiar responsable**.

Actualmente, hay estudios que dicen que los adolescentes comienzan su vida sexual a una edad temprana. Por eso, conviene que los adolescentes, antes de iniciar su vida sexual, se informen y elijan un método anticonceptivo adecuado para evitar embarazos no deseados y el contagio de ETS.

Actividades

1. En grupos, confeccionen una encuesta de no más de cinco preguntas para realizar a los alumnos de su escuela (10 alumnos), con el objetivo de saber qué piensan sobre el embarazo adolescente, el uso del preservativo, y qué conocen sobre las ETS y sobre el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable.

- a. Vuelquen los resultados de la encuesta en un gráfico de barras.
- b. Analicen los resultados y escriban las conclusiones acerca de los resultados obtenidos.
- c. Realicen una puesta en común para compartir las diferentes conclusiones y debatir sobre el tema.

Para conocer más

Clayman, C., *Embarazo y parto*, León, Everest, 1993.
García Barrios, A., Frenk, J., *Triptofanito, la sexualidad y reproducción humana*, México, Joaquín Mortiz, 2014.

Tesone, M., *Reproducción humana*, Buenos Aires, Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, 2005.



1. Construyan una línea de tiempo de 28 días en la que indiquen los eventos que se producen durante un ciclo menstrual.

2. Utilicen la información presentada en el capítulo para elaborar un cuadro comparativo entre el ciclo menstrual y el ciclo estral.

3. Coloquen el número que corresponda al lado de cada órgano para indicar el camino que realiza un espermatozoide desde los testículos, donde es producido, hasta encontrarse con el óvulo.

a. Útero.

b. Uretra.

c. Conductos deferentes.

d. Trompas de Falopio.

e. Vagina.

4. Analicen la siguiente situación y respondan.

El día 10 de este mes, Ana comenzó su última menstruación.

a. ¿Cuándo será la próxima menstruación?

b. ¿Cuándo será la ovulación aproximadamente?

c. ¿Durante qué días debería tomar precauciones para evitar un embarazo?

5. Indiquen el método anticonceptivo más adecuado para cada situación.

a. Una pareja lleva varios años juntos, es formal y consolidada.

b. Una pareja quiere utilizar un método que además de prevenir el embarazo, evite el contagio de las ETS.

c. Una mujer quiere utilizar con su pareja un método anticonceptivo que sea cómodo, duradero y que requiera solamente controles médicos cada tanto.

6. Escriban si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). Justifiquen sus respuestas.

a. La sexualidad se define como el sexo que posee cada persona.

b. La testosterona es la hormona que regula el ciclo menstrual.

c. Semen es sinónimo de espermatozoides.

d. Los conductos deferentes transportan al semen hasta la uretra.

e. Dentro del ovario madura un óvulo por mes.

f. Todos los mamíferos son vivíparos.

g. Durante el ciclo estral, la hembra se encuentra receptiva al macho.

h. El preservativo es el único método que previene las ETS.

i. El VIH/sida se contagia por sangre, por relaciones sexuales sin protección y de madre a hijo durante el embarazo, el parto y la lactancia.

j. Se puede utilizar cualquier método anticonceptivo sin necesidad de consultar con el médico.

7. ¿En qué se diferencian la inseminación artificial, la FIV, la GIFT y la ICSI?

8. Escriban el nombre del órgano que corresponde a cada función.

a. Se prepara todos los meses para alojar al posible embrión.

b. Deposita los espermatozoides en la vagina.

c. Secreta un líquido que nutre los espermatozoides.

d. Producen hormonas femeninas.

e. Su líquido neutraliza la acidez de la uretra.


f. Órganos donde se produce la fecundación.

g. Producen espermatozoides y testosterona.


h. Conducto que elimina el semen al exterior.

i. Es el canal de parto natural.

9. Coloquen los nombres de los órganos de los sistemas reproductores masculino y femenino según corresponda.



Sistema reproductor femenino.



Sistema reproductor masculino.

► Índice alfabético

absorbotróficos	13	complejos de macromoléculas	8	gametas	17, 91, 93, 94, 95, 96, 102, 107,
adaptaciones	25, 46, 50, 58,	comunidades	9		121, 124
	65, 66, 80, 81	constante	15, 24, 48	gemación	82, 92
alimentación	84	criterios de clasificación biológica	18	generación espontánea	30, 31, 32,
almidón	10, 26, 27, 28, 37	cuerpo fructífero	82		33, 34
aminoácidos	28, 36, 39, 55	desarrollo embrionario	55, 85	gimnospermas	80, 81
ancestro común	53, 54, 55, 56,	diseño experimental	33	herencia	16, 60, 63
	57, 59, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 82, 84	divisiones	17, 42, 56, 73, 80, 103	hermafroditas	91, 95, 97
anfibios	55, 85, 102, 103, 104, 105	dominios	19, 76, 77	hidratos de carbono	8, 28, 41
angiospermas	80, 81, 90, 96, 97	ecósfera	9	hipótesis	30, 31, 32, 33, 34,
animales	9, 11, 13, 14, 15,	ecosistema	9, 71, 86, 101		51, 53, 56, 57, 60, 72, 127
	16, 18, 20, 21, 25, 29, 42, 46, 47, 48, 49, 50,	embarazo	113, 117, 119,	hojas	9, 13, 16, 19, 29, 33,
	51, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 66, 71, 72, 73,		120, 121, 122, 123, 124, 125, 128		46, 49, 66, 81, 93, 96, 98, 99, 100
	74, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 84, 85, 87, 90,	energía	12, 13, 24, 26, 35, 36, 37, 41, 83,	holotróficos	13
	91, 92, 94, 95, 97, 102, 103, 104, 105, 107,		104, 107, 108	homeostasis	15, 24
	109, 122	energía química	26	homologías	55, 74
árbol filogenético	19, 59, 74, 75, 76, 77	especie	12, 16, 17, 18, 25, 46,	hongos	13, 20, 42, 46, 71, 76, 82, 93
átomo	8, 10, 11, 26, 28, 36, 41		51, 52, 53, 54, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 64, 65,	hormonas	113, 117, 118, 125, 130
autótrofos quimiosintéticos	41		67, 73, 82, 86, 90, 91, 95, 97, 102, 103, 105,	hormonas sexuales	112, 118
biodiversidad	18, 20, 46,		106, 123	individuo	9, 14, 25, 90, 91, 92,
	47, 65, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 86	esporas	32, 44, 81, 82, 93, 100		93, 95, 102
biomoléculas	8, 10, 11, 26, 27,	estímulo	14, 115	irritabilidad	25, 40
	28, 36, 37	estrategias reproductivas	108	lípidos	8, 28, 37, 38, 78
briofitas	80, 81	eucariota	11, 13, 76, 77, 79	macromoléculas	8
caldo nutritivo	34	evolución biológica	17, 66, 67,	materia	8, 10, 11, 12, 13,
caracteres adquiridos	49	eyaculación	114, 115, 125		24, 30, 31, 32, 35, 41, 82, 84, 86
célula	8, 9, 11, 12, 13,	fecundación	16, 81, 94, 95, 96,	material genético	9, 11, 12, 29, 40, 42,
	17, 24, 29, 37, 40, 76, 82, 91, 92, 94,		97, 99, 102, 103, 107, 113, 117, 118, 119,		57, 62, 63, 66, 78, 91, 92, 94, 107, 118, 128
	103, 107, 113, 116, 117, 118, 119		121, 124, 125,	meiosis	17, 94, 107
célula procariota	11	fijismo	47, 48, 50, 51	membrana plasmática	8, 11
ciclo menstrual	117, 118, 125	filogenética	19	menstruación	112, 113, 117,
ciclo vital	10, 16	filogenia	18, 19, 59, 74, 76		118, 122, 125
clorofila	13, 78	fisión binaria	92, 107	metabolismo	19, 20,
cloroplastos	79, 80	flor	16, 63, 81, 96, 97, 98, 109		24, 37, 40, 78, 100
coacervados	36, 37, 38, 40	fósil	50, 54, 57, 58	metamorfosis	85, 104, 105, 108
colonias	11, 84	fragmentación	92, 93	métodos anticonceptivos	124
columna vertebral	85	fruto	16, 81, 99, 100	micelio	82

micrones	11	reproducción	11, 12, 16, 20, 25,
mitosis	92, 94, 107		29, 40, 59, 62, 80, 81, 82, 84, 90, 91, 92, 93,
modelo	26, 27, 28, 39, 47		94, 95, 96, 102, 105, 106, 107, 108, 117,
molécula orgánica	26		121, 128
monómero	28, 37	reproducción asexual	82, 91, 92, 93, 107
monosacáridos	36	reproducción sexual	25, 91, 92, 94,
multiplicación vegetativa	93		95, 96, 102, 107
mutaciones	17	salud	115, 120, 122, 129
nutrición	11, 12, 13, 24, 41, 76, 78, 80, 82, 103	selección artificial	60
organismos autótrofos fotosintéticos	41	semilla	16, 80, 99, 100
organismos de nutrición autótrofa	13	sensibilidad	14
organismos de nutrición heterótrofa	13	simetría	14, 83, 84, 95, 98, 109
órganos	9, 11, 15, 16, 21, 49, 80, 83, 84, 85, 90, 96, 97, 99, 102, 112, 113, 114, 118, 119, 121, 126	sistema de clasificación	47, 56, 71, 72, 73, 74, 76
parásitos	13, 79, 84, 101	sistema de órganos	9, 85
pared celular	11, 19, 78, 80, 82	sistema reproductor femenino	113, 125
placenta	103, 119	sistema reproductor masculino	114
plantas	9, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 24, 25, 30, 33, 42, 46, 47, 48, 51, 53, 56, 60, 62, 66, 71, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 86, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 107, 108, 109	tallo	18, 81, 93, 96, 100
plantas vasculares	9, 80, 81	taxonomía	72, 77
pluricelulares	8, 9, 11	técnicas de fertilización asistida	106, 121
población	9, 53, 60, 61, 62, 66, 90, 92, 93, 97, 107, 120, 127, 129	tejidos	9, 11, 84, 95, 117
polímero	28, 37, 78	teoría quimiosintética	32, 36, 37, 38
polinización	97, 98, 101	Tierra primitiva	35, 39
procariota	11, 13, 76, 77	transformismo	51
productores	112, 121	transpiración	24
propiedades emergentes	8	unicelulares	8, 9, 11,
proteínas	8, 28, 29, 36, 37, 38, 40, 55, 92		24, 42, 49, 79, 82, 84
probiontes	36, 37	uniformista	48
pubertad	112, 113, 117	variabilidad genética	20, 62
relación	12, 14, 41, 52, 98, 122, 124, 125	variables	33, 60